



КонсультантПлюс

Приказ Минтруда России от 27.08.2019 N 585н
"О классификациях и критериях,
используемых при осуществлении
медико-социальной экспертизы граждан
федеральными государственными
учреждениями медико-социальной
экспертизы"
(Зарегистрировано в Минюсте России
18.11.2019 N 56528)

Документ предоставлен **КонсультантПлюс**

www.consultant.ru

Дата сохранения: 25.11.2019

Зарегистрировано в Минюсте России 18 ноября 2019 г. N 56528

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 27 августа 2019 г. N 585н

О КЛАССИФИКАЦИЯХ И КРИТЕРИЯХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГРАЖДАН ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

В соответствии с [подпунктом 5.2.105](#) Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 2013, N 22, ст. 2809; N 36, ст. 4578; N 37, ст. 4703; N 45, ст. 5822; N 46, ст. 5952; 2014, N 21, ст. 2710; N 26, ст. 3577; N 29, ст. 4160; N 32, ст. 4499; N 36, ст. 4868; 2015, N 2, ст. 491; N 6, ст. 963; N 16, ст. 2384; 2016, N 2, ст. 325; N 4, ст. 534; N 23, ст. 3322; N 28, ст. 4741; N 29, ст. 4812; N 43, ст. 6038; N 47, ст. 6659; 2017, N 1, ст. 187; N 7, ст. 1093; N 17, ст. 2581; N 22, ст. 3149; N 28, ст. 4167; 2018, N 10, ст. 1494; N 24, ст. 3530; N 36, ст. 5634; N 46, ст. 7052; N 49, ст. 7600; N 53, ст. 8678; 2019, N 1, ст. 31; N 5, ст. 408; N 21, ст. 2563), приказываю:

1. Утвердить классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы согласно [приложению](#).

2. Признать утратившими силу:

[приказ](#) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. N 1024н "О классификациях и критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 января 2016 г., регистрационный N 40650);

[приказ](#) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 июля 2016 г. N 346н "О внесении изменений в классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 декабря 2015 г. N 1024н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2016 г., регистрационный N 43018).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Министр
М.А.ТОПИЛИН

Приложение
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 27 августа 2019 г. N 585н

КЛАССИФИКАЦИИ И КРИТЕРИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГРАЖДАН ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

I. Общие положения

1. Классификации, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, определяют основные виды стойких расстройств функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и степени их выраженности, а также основные категории жизнедеятельности человека и степени выраженности ограничений этих категорий.

2. Критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, определяют основания установления групп инвалидности (категории "ребенок-инвалид").

II. Классификации основных видов стойких расстройств функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, и степени их выраженности

3. К основным видам стойких расстройств функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, относятся:

а) нарушения психических функций (сознания, ориентации, интеллекта, личностных особенностей, волевых и побудительных функций, внимания, памяти, психомоторных функций, эмоций, восприятия, мышления, познавательных функций высокого уровня, умственных функций речи, последовательных сложных движений);

б) нарушения языковых и речевых функций (устной (ринолалия, дизартрия, заикание, алалия, афазия); письменной (дисграфия, дислексия), вербальной и невербальной речи; нарушение голосообразования);

в) нарушения сенсорных функций (зрения; слуха; обоняния; осязания; тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности; вестибулярной функции; боль);

г) нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций (движения головы, туловища, конечностей, в том числе костей, суставов, мышц; статики, координации движений);

д) нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем;

е) нарушения, обусловленные физическим внешним уродством (деформации лица, головы, туловища, конечностей, приводящие к внешнему уродству; аномальные отверстия пищеварительного, мочевыделительного, дыхательного трактов; нарушение размеров тела).

4. Степень выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, оценивается в процентах и устанавливается в диапазоне от 10 до 100, с шагом в 10 процентов.

5. Выделяются 4 степени выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами:

I степень - стойкие незначительные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 10 до 30 процентов;

II степень - стойкие умеренные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 40 до 60 процентов;

III степень - стойкие выраженные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 70 до 80 процентов;

IV степень - стойкие значительно выраженные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 90 до 100 процентов.

Степень выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, устанавливается в соответствии с количественными системами оценки, предусмотренными [приложениями N 1 и 2](#) к настоящим классификациям и критериям.

Если [приложениями N 1 и 2](#) к настоящим классификациям и критериям не предусмотрена количественная оценка степени выраженности стойких нарушений той или иной функции организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, имеющимися у освидетельствуемого лица, то степень выраженности стойких нарушений функций организма человека в процентном выражении устанавливается федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы в соответствии с [абзацами третьим - шестым](#) настоящего пункта исходя из клинико-функциональной характеристики заболеваний, последствий травм или дефектов, обусловивших вышеуказанные нарушения, характера и тяжести осложнений, стадии, течения и прогноза патологического процесса.

При наличии нескольких стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, отдельно оценивается и устанавливается степень выраженности каждого из таких нарушений в процентах. Сначала устанавливается максимально выраженное в процентах нарушение той или иной функции организма человека, после чего определяется наличие (отсутствие) влияния всех других имеющихся стойких нарушений функций организма человека на максимально выраженное нарушение функции организма человека. При

наличии указанного влияния суммарная оценка степени нарушения функции организма человека в процентном выражении может быть выше максимально выраженного нарушения функций организма, но не более чем на 10 процентов.

III. Классификации основных категорий жизнедеятельности человека и степени выраженности ограничений этих категорий

6. К основным категориям жизнедеятельности человека относятся:

- а) способность к самообслуживанию;
- б) способность к самостоятельному передвижению;
- в) способность к ориентации;
- г) способность к общению;
- д) способность контролировать свое поведение;
- е) способность к обучению;
- ж) способность к трудовой деятельности.

7. Выделяются 3 степени выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности человека, предусмотренной [пунктом 6](#) настоящих классификаций и критериев:

а) способность к самообслуживанию - способность человека самостоятельно осуществлять основные физиологические потребности, выполнять повседневную бытовую деятельность, в том числе использовать навыки личной гигиены:

1 степень - способность к самообслуживанию при более длительном затрачивании времени, дробности его выполнения, сокращении объема с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

2 степень - способность к самообслуживанию с регулярной частичной помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

3 степень - неспособность к самообслуживанию, нуждаемость в постоянной посторонней помощи и уходе, полная зависимость от других лиц;

б) способность к самостоятельному передвижению - способность самостоятельно перемещаться в пространстве, сохранять равновесие тела при передвижении, в покое и при перемене положения тела, пользоваться общественным транспортом:

1 степень - способность к самостоятельному передвижению при более длительном затрачивании времени, дробности выполнения и сокращении расстояния с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

2 степень - способность к самостоятельному передвижению с регулярной частичной помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

3 степень - неспособность к самостоятельному передвижению и нуждаемость в постоянной помощи других лиц;

в) способность к ориентации - способность к адекватному восприятию личности и окружающей обстановки, оценке ситуации, к определению времени и места нахождения:

1 степень - способность к ориентации только в привычной ситуации самостоятельно и (или) с помощью вспомогательных технических средств;

2 степень - способность к ориентации с регулярной частичной помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

3 степень - неспособность к ориентации (дезориентация) и нуждаемость в постоянной помощи и (или) надзоре других лиц;

г) способность к общению - способность к установлению контактов между людьми путем восприятия, переработки, хранения, воспроизведения и передачи информации:

1 степень - способность к общению со снижением темпа и объема получения и передачи информации, использование при необходимости вспомогательных технических средств, при изолированном поражении органа слуха - способность к общению с использованием невербальных способов общения и услуг по сурдопереводу;

2 степень - способность к общению при регулярной частичной помощи других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических средств;

3 степень - неспособность к общению и нуждаемость в постоянной помощи других лиц;

д) способность контролировать свое поведение - способность к осознанию себя и адекватному поведению с учетом социально-правовых и морально-этических норм:

1 степень - периодически возникающее ограничение способности контролировать свое поведение в сложных жизненных ситуациях и (или) постоянное затруднение выполнения ролевых функций, затрагивающих отдельные сферы жизни, с возможностью частичной самокоррекции;

2 степень - постоянное снижение критики к своему поведению и окружающей обстановке с возможностью частичной коррекции только при регулярной помощи других лиц;

3 степень - неспособность контролировать свое поведение, невозможность его коррекции, нуждаемость в постоянной помощи (надзоре) других лиц;

е) способность к обучению - способность к целенаправленному процессу организации деятельности по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности (в том числе профессионального, социального, культурного, бытового характера), развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию мотивации получения образования в течение всей жизни:

1 степень - способность к обучению и получению образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с созданием специальных условий (при необходимости) для получения образования

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучение с применением (при необходимости) специальных технических средств обучения, определяемая с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии;

2 степень - способность к обучению и получению образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с созданием специальных условий для получения образования только по адаптированным образовательным программам при необходимости обучение на дому и/или с использованием дистанционных образовательных технологий с применением (при необходимости) специальных технических средств обучения, определяемая с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии;

3 степень - способность к обучению только элементарным навыкам и умениям (профессиональным, социальным, культурным, бытовым), в том числе правилам выполнения только элементарных целенаправленных действий в привычной бытовой сфере, или ограниченные возможности способности к такому обучению в связи с имеющимися значительно выраженными нарушениями функций организма, определяемые с учетом заключения психолого-медико-педагогической комиссии;

ж) способность к трудовой деятельности - способность осуществлять трудовую деятельность в соответствии с требованиями к содержанию, объему, качеству и условиям выполнения работы:

1 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в обычных условиях труда при снижении квалификации, тяжести, напряженности и (или) уменьшении объема работы, неспособность продолжать работу по основной профессии (должности, специальности) при сохранении возможности в обычных условиях труда выполнять трудовую деятельность более низкой квалификации;

2 степень - способность к выполнению трудовой деятельности в специально созданных условиях с использованием вспомогательных технических средств;

3 степень - способность к выполнению элементарной трудовой деятельности со значительной помощью других лиц или невозможность (противопоказанность) ее осуществления в связи с имеющимися значительно выраженными нарушениями функций организма.

8. Степень выраженности ограничения основных категорий жизнедеятельности человека определяется исходя из оценки их отклонения от нормы, соответствующей определенному периоду (возрасту) биологического развития человека.

IV. Критерий для установления инвалидности

9. Критерием для установления инвалидности лицу в возрасте 18 лет и старше является нарушение здоровья со II и более выраженной степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 2 или 3 степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или 1 степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях, определяющих необходимость его социальной защиты.

Критерием для установления инвалидности лицу в возрасте до 18 лет является нарушение

здоровья со II и более выраженной степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности, определяющих необходимость социальной защиты ребенка.

V. Критерии для установления групп инвалидности

10. Критерии для установления групп инвалидности применяются после установления гражданину инвалидности в соответствии с критерием для установления инвалидности, предусмотренным [пунктом 9](#) настоящих классификаций и критериев.

11. Критерием для установления первой группы инвалидности является нарушение здоровья человека с IV степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от 90 до 100 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.

12. Критерием для установления второй группы инвалидности является нарушение здоровья человека с III степенью выраженности стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 70 до 80 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.

13. Критерием для установления третьей группы инвалидности является нарушение здоровья человека со II степенью выраженности стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 40 до 60 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами.

14. Категория "ребенок-инвалид" устанавливается при наличии у ребенка II, III либо IV степени выраженности стойких нарушений функций организма (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами.

Приложение N 1
к классификациям и критериям,
используемым при осуществлении
медико-социальной экспертизы
федеральными государственными
учреждениями медико-социальной
экспертизы, утвержденным приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 27 августа 2019 г. N 585н

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ СТОЙКИХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ 18 ЛЕТ И СТАРШЕ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТРАВМ ИЛИ ДЕФЕКТАМИ (В ПРОЦЕНТАХ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ СТОЙКИХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ

ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА)

Сокращения слов, используемых в настоящем приложении:

АКТГ - адренокортикотропный гормон;

АХЭП - антихолинэстеразные препараты;

ВК - врачебная комиссия;

ДН - дыхательная недостаточность;

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт;

ИМТ - индекс массы тела;

ЛПИ - лодыжечно-плечевой индекс;

МБТ - микобактерии туберкулеза;

МДС - миелодиспластические синдромы;

МКФ - Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья;

МСЭ - медико-социальная экспертиза;

НФС - нарушение функции суставов;

ПИТРС - препараты, изменяющие течение рассеянного склероза;

ПНД - психоневрологический диспансер;

ПТФБ - посттромбофлебитическая болезнь;

СКФ - скорость клубочковой фильтрации;

СТГ - соматотропный гормон;

ТМО - твердая мозговая оболочка;

ФК - функциональный класс;

ФКУ - фенилкетонурия;

ХБП - хроническая болезнь почек;

ХАН - хроническая артериальная недостаточность;

ХЛВН - хроническая легочно-венозная недостаточность;

ХЛН - хроническая легочная недостаточность;

ХДН - хроническая дыхательная недостаточность;

ХСН - хроническая сердечная недостаточность;

ЦНС - центральная нервная система.

| N п/п | Классы болезней (по МКБ-10) | Блоки болезней (по МКБ-10) | Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия | Рубрика МКБ-10 (код) | Виды стойких расстройств функций организма человека. Рубрика МКФ | Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами | Количественная оценка (%) |
|--|---|----------------------------|---|----------------------|--|--|---------------------------|
| 1 | Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (класс I) | | | A00 - B99 | | | |
| Примечание к пункту 1 . Количественная оценка степени нарушений функции организма граждан в возрасте 18 лет и старше (дыхательной, других органов и систем организма) при туберкулезе различной локализации зависит от клинической формы заболевания, рентгенологической стадии, периода и фазы процесса, наличия (отсутствия) выделения микобактерии туберкулеза (МБТ+ или МБТ- соответственно), течения заболевания (осложненного и неосложненного), характера и вида осложнений (в том числе от проводимой химиотерапии), а также от эффективности проводимого лечения и формирования резистентности к нему (наличие множественной или широкой лекарственной устойчивости). | | | | | | | |
| 1.1 | | | Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически | A15 A16 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|---|---------|
| 1.1.1 | | | | | Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 440 - 449, В 410 - 429 | Незначительные нарушения функции дыхательной системы при эффективном окончании основного курса лечения, в периоде потери активности (рубцевание, обызвествление) без признаков бактериовыделения (МБТ-), без остаточных. Отсутствие ДН или наличие ДН 1 степени | 10 - 30 |
| 1.1.2 | | | | | Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 440 - 449, В 410 - 429 | Умеренные нарушения функции дыхательной системы при отсутствии положительной клинико-рентгенологической динамики на фоне химиотерапии; при сохранении бактериовыделения (МБТ+) в периоде потери активности; и/или при наличии остаточных изменений после излеченного туберкулеза органов дыхания (локальный пневмофиброз, | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|----------|
| | | | | | фиброзно-очаговые изменения) с ДН II степени, преходящей или постоянной легочной гипертензией (ХСН 0 или ХСН I стадии). Наличие МБТ+ 6 и более месяцев | |
| 1.1.3 | | | | Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 440 - 449, В 410 - 429 | Выраженные нарушения функции дыхательной системы при неэффективности химиотерапии; при сохранении бактериовыделения (МБТ+) в периоде потери активности; и/или при наличии остаточных изменений после излеченного туберкулеза (пневмосклероз, цирроз, бронхоэктазы). Наличие ДН II, III степени и ХСН IIА стадии | 70 - 80 |
| 1.1.4 | | | | Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы пищеварительной | Значительно выраженные нарушения функций организма вследствие наличия тяжелых полиорганных | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|---------------------------|--|--|---------|
| | | | | | системы; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 450, В 530 - 539 | осложнений (амилоидоз, декомпенсированное хроническое легочное сердце, полисерозиты, кахексия и так далее). Наличие ДН III степени и ХСН ПБ или III стадии | |
| 1.2 | | | Туберкулез нервной системы Туберкулез других органов Милиарный (диссеминированный, генерализованный) туберкулез легких | A17 A18 A19 | | | |
| 1.2.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной | Незначительные нарушения функций организма вследствие проявлений туберкулеза различной локализации в периоде потери активности (рубцевание, обызвествление; МБТ-); при эффективном окончании основного курса лечения. Отсутствие | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | дыхательной недостаточности или наличие ДН I степени | |
| 1.2.2 | | | | | Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, | Умеренные нарушения функций организма вследствие проявлений туберкулеза различной локализации (МБТ+ или МБТ-) и /или осложнений. Наличие ДН II степени, преходящая или постоянная легочная гипертензия (ХСН 0 или ХСН I стадии) | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | | |
| 1.2.3 | | | | | Нарушения психических, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В | Выраженные нарушения функций организма вследствие проявлений туберкулеза различной локализации (МБТ+ или МБТ-) и/или осложнений. Проявления множественной или широкой лекарственной устойчивости к микобактериям туберкулеза при наличии ДН II, III степени, ХСН IIА стадии | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---|---|----------|
| | | | | | 140 - 189, В 198, В 199, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | | |
| 1.2.4 | | | | | Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, систем, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 410 - 429, В 440 - 449, | Значительно выраженные нарушения функций организма вследствие проявлений туберкулеза различной локализации с полиорганными осложнениями (амилоидоз, полисерозиты, декомпенсированное хроническое легочное сердце, кахексия и прочее); Наличие ДН III степени и ХСН ПБ или III стадии | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|-------------------------|------------|---|---|---------|
| | | | | | В 510 - 539, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | | |
| 1.3 | | | Последствия туберкулеза | В90 | | | |
| 1.3.1 | | | | | Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 210 - 299, В 710 - 789, 798, В 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | Незначительные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений последствий и излеченного туберкулеза различной локализации и неуточненного туберкулеза. При отсутствии дыхательной недостаточности либо наличии ДН 1 степени | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---|--|---------|
| 1.3.2 | | | | | Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 210 - 299, В 710 - 789, 798, В 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | Умеренные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной локализации и неуточненного туберкулеза. Наличие ДН II степени, преходящая или постоянная легочная гипертензия (ХСН 0 или ХСН I стадии) | 40 - 60 |
| 1.3.3 | | | | | Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением | Выраженные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|----------|
| | | | | | (статодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 210 - 299, В 710 - 789, 798, В 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | локализации и неуточненного туберкулеза. Наличие ДН II III степени, ХСН ПА стадии | |
| 1.3.4 | | | | | Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, пищеварительной, систем и метаболизма, | Значительно выраженные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений и последствий излеченного туберкулеза различной локализации и неуточненного туберкулеза. Наличие ДН III степени, ХСН ПБ или III стадии | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|---|------------------------------------|--|---|---------|
| | | | | | мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 210 - 299, В 710 - 789, 798, В 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | | |
| 1.4 | | | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) Бессимптомный инфекционный статус | B20 - B24 Z21 | | | |
| 1.4.1 | | | | | Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439 | Бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека. ВИЧ-инфекция: стадия 3 (субклиническая стадия). Стадия 4А (вторичных заболеваний), фаза ремиссии (спонтанная, | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | после АРТ, на фоне АРТ). Количество CD4+ - 350 и более клеток/мкл. Отсутствие или незначительные нарушения функций организма | |
| 1.4.2 | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199 | ВИЧ - инфекция: Стадия 4А (вторичных заболеваний), фаза прогрессирования на фоне АРТ. Умеренные нарушения функций организма на фоне АРТ и уровня CD4+ от 200 до 350 клеток/мкл. Стадия 4Б (вторичных заболеваний), фаза ремиссии на фоне АРТ (не менее 6 месяцев). Умеренные нарушения функций организма на фоне АРТ и уровня CD4+ от 200 до 350 клеток/мкл. Стадия 4В (вторичных заболеваний), фаза ремиссии на фоне АРТ (не менее 6 месяцев). Умеренные нарушения функций организма на | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | | фоне АРТ и уровня CD4+ более 200 клеток/мкл | |
| 1.4.3 | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной системы, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199 | ВИЧ-инфекция: стадия 4Б (вторичных заболеваний), фаза прогрессирования на фоне АРТ. Выраженные нарушения функций организма на фоне АРТ и уровня CD4+ от 100 до 200 клеток/мкл. Стадия 4В (вторичных заболеваний), фаза ремиссии на фоне АРТ (не менее 6 месяцев). Выраженные нарушения функций организма на фоне АРТ и уровня CD4+ от 100 до 200 клеток/мкл | 70 - 80 |
| 1.4.4 | | | | Нарушение функций системы крови и иммунной системы; нарушения нейромышечных, | ВИЧ - инфекция: стадия 4В (вторичных заболеваний), фаза прогрессирования на фоне АРТ. | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|-----------|---|---|--|
| | | | | | скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной системы; эндокринной системы и метаболизма; пищеварительной системы; мочевыделительной функции; нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199 | Значительно выраженные нарушения функций организма на фоне АРТ и уровня CD4+ менее 100 клеток/мкл. Стадия 5 (терминальная). Значительно выраженные нарушения функций организма | |
| 2 | Новообразования (класс II) | | | C00 - D48 | | | |

Примечание к пункту 2.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при злокачественных новообразованиях при первичном освидетельствовании зависит от клинико-морфологических факторов прогноза, локализации и размера опухоли, анатомической формы роста (эндофитная, экзофитная, смешанная), темпа роста опухоли и распространения опухоли (T), наличия и характера поражения лимфатических узлов (N), наличия или отсутствия отдаленных метастазов (M), гистологического строения, степени дифференцировки и злокачественности опухоли (G), стадии опухолевого процесса (клиническая классификация по системе cTNMG до лечения, классификация pTNM - по результатам хирургического вмешательства, суTNM - по результатам лучевого, химиолучевого, химиотерапевтического, гормонального лечения). Учитываются также вид и объем лечения: радикальное, комбинированное, комплексное и паллиативное (хирургическое, лучевая терапия,

| | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|-----------|--|---|---------|
| <p>химиотерапевтическое, гормональное лечения); наличия осложнений, проводимого лечения или противопоказаний к специальному лечению. При повторном освидетельствовании количественная оценка проводится с учетом степени нарушенных функций организма после проведенного лечения, наличия ремиссии или возникновения рецидивов, метастазов, осложнений, продолженного роста опухоли после радикального лечения, а также с учетом неэффективности проводимой терапии.</p> | | | | | | | |
| 2.1 | | Злокачественные новообразования уточненных локализаций | | C00 - C75 | | | |
| 2.1.1 | | | Злокачественные новообразования губы | C00 | | | |
| 2.1.1.1 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 430 - 439; В 310 - 399 | Рак нижней губы I, II стадии (T1N0M0) после радикального лечения | 10 - 30 |
| 2.1.1.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 430 - 439, В 510 - 539, В 310 - 399 | Рак нижней губы I, II стадии (T1,2,3N1,2M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|---|----------|
| 2.1.1.3 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы; эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 310 - 399 | Рак нижней губы II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) после проведенного радикального лечения с наличием местных и/или общих осложнений. Рак нижней губы после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса | 70 - 80 |
| 2.1.1.4 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, психических функций, языковых и речевых функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, | Рак нижней губы IV стадии (T1,2,3,4N,1,2,3M1), инкурабельное состояние | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|-----------|--|--|---------|
| | | | | | В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 399 | | |
| 2.1.2 | | | Злокачественные новообразования полости рта и глотки (носоглотки, ротоглотки, гортаноглотки) | C01 - C14 | | | |
| 2.1.2.1 | | | | | Нарушения функций дыхательной системы, системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы; языковых и речевых МКФ: В 440 - 450, В 430 - 439, В 510 - 539, В 310 - 399 | Рак полости рта и глотки I, II стадии (T1,2N0M0) после радикального лечения, без признаков рецидива и остаточной опухоли | 10 - 30 |
| 2.1.2.2 | | | | | Нарушения функций дыхательной системы, системы крови и иммунной системы, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы; МКФ: В 440 - 450, В 430 - 439, В 310 - 399, В 510 - 539 | Рак полости рта и глотки I, II стадии (T1,2N1M0) после радикального лечения, без местных и/или общих осложнений. Устраняемая трахеостома | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|---|----------|
| 2.1.2.3 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы; МКФ: В 440 - 450, В 430 - 439, В 310 - 399, В 510 - 539 | Рак полости рта и глотки II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) после радикального или паллиативного лечения со стабилизацией; с наличием местных и/или общих осложнений. Неустраняемая трахеостома | 70 - 80 |
| 2.1.2.4 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; языковых и речевых функций, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В | Рак полости рта и глотки IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1) после радикального, паллиативного лечения, генерализации опухолевого процесса; наличием отдаленных метастазов, местных и/или общих осложнений. Инкурабельное состояние | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|-----|--|---|---------|
| | | | | | 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 399 | | |
| 2.1.3 | | | Злокачественное новообразование пищевода | C15 | | | |
| 2.1.3.1 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 430 - 439, В 510 - 539, В 540 - 559 | Рак пищевода I, II стадии (T1N0M0) после радикального лечения | 10 - 30 |
| 2.1.3.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 430 - 439, В 510 - 539, В 540 - 559 | Рак пищевода I, II стадии (T1,2N0,1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений. Устраняемая гастростома, временное наличие эзофагогастрального зонда | 40 - 60 |
| 2.1.3.3 | | | | | Нарушения функций системы крови и | Рак пищевода II, III стадии | 70 - 80 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | <p>иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539</p> | <p>(T1,2,3N1,2,3M0) после радикального лечения при наличии местных и/или общих осложнений. Неустраняемая гастростома, постоянное наличие эзофагогастрального зонда Рак пищевода (после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса)</p> | |
| 2.1.3.4 | | | | <p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной систем, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189 В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 -</p> | <p>Рак пищевода IV стадии (T1,2,3,4N,1,2,3M1), инкурабельное состояние</p> | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---|-----|--|--|---------|
| | | | | | 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 198, В 199 | | |
| 2.1.4 | | | Злокачественное новообразование желудка | C16 | | | |
| 2.1.4.1 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439 | Рак желудка I, II стадии (T1N0M0) после радикального лечения | 10 - 30 |
| 2.1.4.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы; МКФ: В 430 - 439, В 510 - 539 | Рак желудка I, II стадии (T1,2N0M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений. Гастрэктомия | 40 - 60 |
| 2.1.4.3 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539 | Рак желудка II, III стадии (T1,2,3N1,2,3M0) после радикального лечения при наличии местных и/или общих осложнений и последствий лечения. Рак желудка после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|---------------------------|--|--|----------|
| 2.1.4.4 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, нарушения психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 198, В 199 | Рак желудка IV стадии (T1,2,3,4N,1,2,3M0,1), инкурабельное состояние | 90 - 100 |
| 2.1.5 | | | Злокачественное новообразование тонкого кишечника Злокачественное новообразование ободочной кишки Злокачественное новообразование ректосигмоидного | C17 C18 C19 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|------------|--|--|--|----------|
| | | | соединения | | | | |
| 2.1.5.1 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439 | Рак кишечника I, II стадии (T1N0M0) после радикального лечения | 10 - 30 |
| 2.1.5.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы; МКФ: В 430 - 439, В 510 - 539 | Рак кишечника I, II стадии (T1,2N1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений. Сигмостома (устраняемая) Еюностома (устраняемая) | 40 - 60 |
| 2.1.5.3 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма; пищеварительной системы; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539 | Рак кишечника II, III стадии (T1,2,3N1,2,3M0) после радикального лечения при наличии местных и/или общих осложнений. Еюностома, сигмостома (неустраняемая) Рак кишечника после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса. | 70 - 80 |
| 2.1.5.4 | | | | | Нарушения функции системы крови и иммунной системы, | Рак кишечника IV стадии (T1,2,3,4N,1,2,3M1), | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|-----|---|---|---------|
| | | | | | нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, нарушения психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539 В 198, В 199 | инкурабельное состояние | |
| 2.1.6 | | | Злокачественное новообразование прямой кишки | C20 | | | |
| 2.1.6.1 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы, МКФ: В 430 - 439, В 510 - 539 | Рак прямой кишки I, II стадии (T1,2N0M0) после радикального лечения | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|--|----------|
| 2.1.6.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы МКФ: В 430 - 439, В 510 - 539 | Рак прямой кишки I, II стадии (T1,2N1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений Сигмостома, еюностома (устраиваемая) | 40 - 60 |
| 2.1.6.3 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной системы; эндокринной системы и метаболизма; пищеварительной системы; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539 | Рак прямой кишки II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) после радикального лечения при наличии местных и/или общих осложнений. Сигмостома, еюностома, ректовагинальный свищ (неустраиваемые) Рак прямой кишки после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса | 70 - 80 |
| 2.1.6.4 | | | | | Нарушения функции системы крови и иммунной системы, нейромускульных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) | Рак прямой кишки IV стадии (T1,2,3,4N,1,2,3M0,1), инкурабельное состояние | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|-----|--|--|---------|
| | | | | | функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199 | | |
| 2.1.7 | | | Злокачественное новообразование печени и внутрипеченочных желчных протоков | C22 | | | |
| 2.1.7.1 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы; МКФ: В 430 - 439, В 510 - 539 | Рак печени и внутрипеченочных желчных протоков I, II стадии (T1,2N0,1M0) после радикального лечения без местных и общих осложнений | 40 - 60 |
| 2.1.7.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, | Рак печени и внутрипеченочных желчных протоков II, III стадии (T1,2,3N1,2,3M0) после | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|----------|
| | | | | | эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: В 410 - 429, В 430 - 439, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539 | радикального лечения при наличии местных и/или общих осложнений | |
| 2.1.7.3 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, нарушения психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 198, В 199 | Рак печени и внутривенных желчных протоков IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0,1), инкурабельное состояние | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|-------------------------|--|--|---------|
| 2.1.8 | | | Злокачественное новообразование желчного пузыря Злокачественное новообразование других неуточненных частей желчевыводящих путей | C23 C24 и | | | |
| 2.1.8.1 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, пищеварительной системы; МКФ: В 430 - 439, В 510 - 539 | Рак желчного пузыря или желчевыводящих путей II, III стадии (T1,2N0,1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений | 40 - 60 |
| 2.1.8.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539 | Рак желчного пузыря или желчевыводящих путей I, II стадии (T1,2,3N1,2,3M0) после радикального лечения с общими и/или местными осложнениями | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|-----|---|--|----------|
| 2.1.8.3 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, нарушения психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 198, В 199 | Рак желчного пузыря или желчевыводящих путей IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1); инкурабельное состояние | 90 - 100 |
| 2.1.9 | | | Злокачественное новообразование поджелудочной железы | C25 | | | |
| 2.1.9.1 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы; нарушения нейромышечных, скелетных и | Рак поджелудочной железы I, II, III стадии (Tis1,2,3N0,1,2,3M0) после радикального лечения с общими и/или местными | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|----------|
| | | | | | связанных с осложнениями движением (статодинамических) функций; сердечно-сосудистой, дыхательной системы; эндокринной системы и метаболизма; пищеварительной системы; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539 | | |
| 2.1.9.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В | Рак поджелудочной железы IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1); инкурабельное состояние | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|-----|--|--|---------|
| | | | | | 140 - 189, В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 198, В 199 | | |
| 2.1.10 | | | Злокачественное новообразование гортани | C32 | | | |
| 2.1.10.1 | | | | | Нарушения функций дыхательной системы, системы крови и иммунной системы; языковых и речевых функций МКФ: В 440 - 450, В 430 - 439, В 310 - 399 | Рак гортани I, II стадии (T1N0M0G1) после радикального удаления опухоли (хордэктомия) | 10 - 30 |
| 2.1.10.2 | | | | | Нарушения функций дыхательной системы, системы крови и иммунной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 440 - 450, В 430 - 439, В 310 - 399 | Рак гортани I, II стадии (T1,2,3N1M0) после радикального удаления опухоли (резекция гортани) и/или лучевая терапия по радикальной программе без местных и/или общих осложнений. Трахеостома с нарушением голосообразования | 40 - 60 |
| 2.1.10.3 | | | | | Нарушения функций системы крови и | Рак гортани II, III стадии | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | | иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, языковых и речевых функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 310 - 399 | (Т1,2,3,4N1,2,3M0) после радикального или паллиативного лечения со стабилизацией; с наличием местных и/или общих осложнений. Трахеостома с нарушением голосообразования | |
| 2.1.10.4 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В | Рак гортани IV стадии (Т1,2,3,4N1,2,3M1) после радикального лечения с рецидивом или генерализации опухолевого процесса, наличием отдаленных метастазов, с наличием местных и/или общих осложнений. Инкурабельное состояние | 90 - 100 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|------------------|---|---|
| | | | | | 610 - 639, В 198, В 199 | |
| 2.1.11 | | | Злокачественное новообразование бронхов и легкого Карцинома in situ | C34 D02.2 | | |
| 2.1.11.1 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439 | Рак бронхов и легкого I стадии (Tis,1N0M0) после радикального лечения 10 - 30 |
| 2.1.11.2 | | | | | Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 440 - 450, В 410 - 429; В 430 - 439 | Рак бронхов и легкого I, II стадии (Tis,1,2N0,1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений. Пульмонэктомия 40 - 60 |
| 2.1.11.3 | | | | | Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 440 - 450, В 410 - 429; В 430 - 439 | Рак легкого II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M04) после радикального лечения с местными и/или общими осложнениями. Рак легкого после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|-----------|---|--|----------|
| 2.1.11.4 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 199 | Рак легкого IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1), инкурабельное состояние | 90 - 100 |
| 2.1.12 | | | Злокачественные новообразования костей и суставных хрящей | C40 - C41 | | | |
| 2.1.12.1 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, | Рак кости II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) после радикального лечения без местных | 70 - 80 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|---|---|----------|
| | | | | скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 198, В 199 | и/или общих осложнений. Сомнительный прогноз после операции по поводу саркомы Юинга, остеогенной саркомы. При длительном комбинированном или комплексном лечении. При рецидивах и метастазах опухоли. При наличии местных и/или общих осложнений с вовлечением соседних органов | |
| 2.1.12.2 | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, | Прогрессирование заболевания после проведенного радикального лечения. Тяжелое состояние больного при рецидиве опухоли, отдаленных метастазах. Инкурабельное состояние. Осложнения после комбинированного или комплексного лечения | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|-------------------------------|-----|--|---|---------|
| | | | | | пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 198, В 199 | | |
| 2.1.13 | | | Злокачественная меланома кожи | C43 | | | |
| 2.1.13.1 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430 - 439; В 810 - 849 | Меланома кожи I, стадии (T1aNO,MO) после радикального удаления | 10 - 30 |
| 2.1.13.2 | | | | | Нарушения функции системы крови и иммунной системы, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430 - 439; В 810 - 849 | Меланома кожи I, II стадии (T1a,bNO,1MO) после радикального удаления без местных и/или общих осложнений | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---|----------|
| 2.1.13.3 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функции кожи и связанных с ней систем МКФ: В 430 - 439; В 810 - 849 | Меланома кожи II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) после радикального лечения с местными и/или общими осложнениями. Наличие местного рецидива на фоне проводимой терапии | 70 - 80 |
| 2.1.13.4 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; нарушения психических функций, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 | Меланома IV стадии (T1,2,3,4,N1,2,3M1), инкурабельное состояние. Прогрессирование опухолевого процесса | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------|-------|---|--|----------|
| | | | | | - 539, В 540 - 559, В 810 - 849, В 198, В 199 | | |
| 2.1.14 | | | Меланома глаза | C43.3 | | | |
| Примечание к подпункту 2.1.14. Количественная оценка нарушенных функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при меланоме глаза при повторном освидетельствовании производится с учетом нарушения зрительных функций лучше видящего или единственного глаза в) условиях максимально переносимой коррекции. | | | | | | | |
| 2.1.14.1 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сенсорных функций (зрения), функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430 - 439; В 210 - 229 (зрения), В 810 - 849 | Меланома глаза T1,2N0M0 после радикального лечения с местными и/или общими осложнениями. Меланома глаза T1,2,3,4N0,1M0 после радикального лечения при повторном освидетельствовании | 40 - 60 |
| 2.1.14.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сенсорных функций (зрения), функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430 - 439; В 210 - 229 (зрения), В 810 - 849 | Меланома глаза T1,2,3,4N0,1M0 после радикального лечения с местными и/или общими осложнениями | 70 - 80 |
| 2.1.14.3 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сенсорных функций | Меланома глаза (T1,2,3,4N0,1M1) инкурабельное состояние. | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--------------------------------------|-----|--|---|---------|
| | | | | | (зрения), функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430 - 439; В 210 - 229 (зрения), В 810 - 849 | Прогрессирование опухолевого процесса | |
| 2.1.15 | | | Злокачественные новообразования кожи | C44 | | | |
| 2.1.15.1 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430 - 439; В 810 - 849 | Рак кожи I, II стадии (T1,2N0M0) после радикального лечения | 10 - 30 |
| 2.1.15.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 810 - 849 | Рак кожи II стадии (T2,3N0M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|-----|--|--|----------|
| 2.1.15.3 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559; В 810 - 849 | Рак кожи III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) после радикального или паллиативного лечения; рецидив, требующий специального лечения. Наличие местных и/или общих осложнений | 70 - 80 |
| 2.1.15.4 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559; В 810 - 849 | Рак кожи IV стадии (T1,2,3,4N2,3M1), инкурабельное состояние | 90 - 100 |
| 2.1.16 | | | Злокачественные новообразования мягких тканей | C49 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|-------|---|--|---------|
| | | | Новообразование неопределенного или неизвестного характера других и неуточненных локализаций | D48.1 | | | |
| | | | Десмоидные фибромы | | | | |
| 2.1.16.1 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции; психических функций, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 410 - 429, В 430 - 439, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 | Саркома мягких тканей II III стадии (T12N1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений. Сомнительный прогноз после операции по поводу внескелетной саркомы Юинга, саркомы мягких тканей, десмоидной фибромы. При длительном комбинированном и/или комплексном лечении. При рецидивах и метастазах опухоли. При наличии общих осложнений с вовлечением соседних органов и структур | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|-----|--|--|----------|
| | | | | | - 539, В 610 - 639, В 710 - 789, В 810 - 849 | | |
| 2.1.16.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | Прогрессирующие заболевание после проведенного лечения. Тяжелое состояние больного при рецидиве опухоли, отдаленных метастазах. Инкурабельное состояние | 90 - 100 |
| 2.1.17 | | | Злокачественное новообразование молочной железы | C50 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--------------------------------------|-----|--|---|---------|
| | | | Карцинома in situ молочной железы | D05 | | | |
| 2.1.17.1 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439 | Рак молочной железы I стадии (Tis,1N0M0) после радикального лечения | 10 - 30 |
| 2.1.17.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559; В 810 - 849 | Рак молочной железы I, II стадии (T1N0M0) после двусторонней мастэктомии. Рак молочной железы I, II стадии (T1,2N1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений | 40 - 60 |
| 2.1.17.3 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, | Рак молочной железы I, II стадии (T1,2N0,1M0) после двусторонней мастэктомии. Рак молочной железы II, III стадии (T2,3N1M0) после радикального лечения, наличие местных и/или общих осложнений. Рак молочной железы | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|--|----------|
| | | | | | эндокринной систем и метаболизма, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559; В 810 - 849 | после паллиативного лечения с удалением единичного метастаза со стабилизацией опухолевого процесса | |
| 2.1.17.4 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - | Рак молочной железы IV (T1,2,3,4N1,2,3M1), инкурабельное состояние | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|-------|---|--|---------|
| | | | | | 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 710 - 789, В 810 - 849 | | |
| 2.1.18 | | | Злокачественные новообразования наружных женских половых органов | C51.8 | | | |
| | | | Злокачественные новообразования влагалища | C52 | | | |
| 2.1.18.1 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы МКФ: В 430 - 439 | Рак наружных женских половых органов, влагалища I, II стадии (T1N0M0) после радикального лечения | 10 - 30 |
| 2.1.18.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 540 - 559 | Рак наружных женских половых органов, влагалища I, II стадии (T1,2N1M0) после радикального лечения, без местных и/или общих осложнений | 40 - 60 |
| 2.1.18.3 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, | Рак наружных женских половых органов, влагалища II, III стадии (T1,2,3N1,2,3M0) после радикального лечения; наличие местных и/или общих осложнений | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|--|----------|
| | | | | | <p>мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 610 - 639, В 640 - 679</p> | <p>(неустранимые урогенитальный, ректовагинальный свищи). Рак наружных женских половых органов, влагалища после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса</p> | |
| 2.1.18.4 | | | | | <p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В</p> | <p>Рак наружных женских половых органов, влагалища IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1), инкурабельное состояние</p> | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|-----|---|--|---------|
| | | | | | 640 - 679, В 710 - 789 | | |
| 2.1.19 | | | Злокачественное новообразование шейки матки | C53 | | | |
| | | | Злокачественное новообразование тела матки | C54 | | | |
| 2.1.19.1 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439 | Рак шейки или тела матки I, II стадии (T1N0M0) после радикального лечения | 10 - 30 |
| 2.1.19.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 540 - 559 | Рак шейки или тела матки I, II стадии (T1,2aN0,1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений | 40 - 60 |
| 2.1.19.3 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, | Рак шейки или тела матки II, III стадии (T1,2a,b,N1,2,3M0) после радикального лечения с наличием местных и/или общих осложнений (неустранимые урогенитальный, ректовагинальный свищи). | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|-----|--|--|----------|
| | | | | | В 540 - 559, В 610 - 639, В 640 - 679 | Рак шейки или тела матки после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса | |
| 2.1.19.4 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 640 - 679, В 710 - 789 | Рак шейки или тела матки IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1), инкурабельное состояние | 90 - 100 |
| 2.1.20 | | | Злокачественные новообразования яичника | C56 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|--|----------|
| 2.1.20.1 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 540 - 559 | Рак яичника I, II стадии (T1a-b,2N0,1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений | 40 - 60 |
| 2.1.20.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 610 - 639, В 640 - 679 | Рак яичника II, III стадии (T1,2,3,4N1,2,3M0) после радикального лечения с наличием местных и/или общих осложнений. Рак яичника после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса | 70 - 80 |
| 2.1.20.3 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, | Рак яичника IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1), инкурабельное состояние | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|-----|---|--|---------|
| | | | | | эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 640 - 679, В 710 - 789 | | |
| 2.1.21 | | | Злокачественное новообразование полового члена | C60 | | | |
| 2.1.21.1 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 610 - 639 | Рак полового члена I стадии (T1a-bN0,M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений | 10 - 30 |
| 2.1.21.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 610 - 639 | Рак полового члена I, II стадии (T1,2N0,1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|----------|
| 2.1.21.3 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 610 - 639, В 640 - 679 | Рак полового члена II, III стадии (T1a-b,2,3,4N1,2M0) после радикального лечения, наличие местных и/или общих осложнений | 70 - 80 |
| 2.1.21.4 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 610 - 639, В 640 - 679 | Рак полового члена IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1, инкурабельное состояние | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|-----|--|--|----------|
| 2.1.22 | | | Злокачественное новообразование предстательной железы | C61 | | | |
| 2.1.22.1 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 610 - 639, В 540 - 559 | Рак предстательной железы I - IV стадии (T1,2N0,1M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений | 40 - 60 |
| 2.1.22.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 610 - 639, В 640 - 679 | Рак предстательной железы II - IV стадии (T1,2,3N1M0) после радикального лечения при наличии местных и/или общих осложнений. Рак предстательной железы после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса | 70 - 80 |
| 2.1.22.3 | | | | | Нарушения функции системы крови и иммунной системы, | Рак предстательной железы IV стадии (T1,2,3,4N1M1), | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---------------------------------------|-----|--|--|---------|
| | | | | | нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189 В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 640 - 679, В 710 - 789 | инкурабельное состояние | |
| 2.1.23 | | | Злокачественные новообразования яичка | C62 | | | |
| 2.1.23.1 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы МКФ: В 430 - 439 | Рак яичка I стадии (T1N0M0, SO, SX) после радикального лечения | 10 - 30 |
| 2.1.23.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, | Рак яичка IIА стадии (T1-4N1M0, SO, SX) после радикального | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|----------|
| | | | | | эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 640 - 679 | удаления без местных и/или общих осложнений | |
| 2.1.23.3 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 610 - 639, В 640 - 679 | Рак яичка ПА - ПС стадии (Т1,2,3,4N1,2,3M0S1-3) после радикального удаления при наличии местных и/или общих осложнений | 70 - 80 |
| 2.1.23.4 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; | Рак яичка ПА - ПС стадии (Т1,2,3,4N1,2,3M1a-b), инкурабельное состояние | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|-----|---|---|---------|
| | | | | | МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 610 - 639, В 640 - 679 | | |
| 2.1.24 | | | Злокачественное новообразование почки, кроме почечной лоханки | C64 | | | |
| | | | Злокачественное новообразование почечных лоханок | C65 | | | |
| 2.1.24.1 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439 | Рак почки (T1,2,3,4N0M0) Рак почечной лоханки (T1,2N0M0) после радикального лечения, при удовлетворительной функции второй почки. | 10 - 30 |
| 2.1.24.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439; В 610 - 639 | Рак почки (T1-4N0-1M0). Рак почечной лоханки (T1-2N0M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений, при умеренно выраженных нарушениях функции второй почки. | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---|----------|
| 2.1.24.3 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 610 - 639 | Рак почки (T1-4N0-1M1 и рак почечной лоханки (T3-4N0-1M0-1) после радикального лечения при наличии местных и/или общих осложнений или после радикального лечения без местных и/или общих осложнений, но при выраженных нарушениях функции второй почки. Рак почки после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса. Неудаляемая (постоянная) нефростома. | 70 - 80 |
| 2.1.24.4 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, | Рак почки и почечной лоханки (T1-4N0-1M1). Рак почечной лоханки (T3-4N0-3M1), инкурабельное состояние | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|-----|--|---|---------|
| | | | | | пищеварительной системы; мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 610 - 639, В 710 - 789 | | |
| 2.1.25 | | | Злокачественное новообразование мочевого пузыря | C67 | | | |
| 2.1.25.1 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439 | Рак мочевого пузыря I - II стадии (T1,2aN0M0) после радикального удаления опухоли. За исключением цистэктомии | 10 - 30 |
| 2.1.25.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 610 - 639 | Рак мочевого пузыря I - IV стадии (T1,2a,bN0,1M0) после радикального удаления (включая цистэктомию) без местных и/или общих осложнений. Устраняемая цистостома. Устраняемая уретерокутанеостома | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---|----------|
| 2.1.25.3 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189 | Рак мочевого пузыря I - IV стадия (T1,2,3,4N2,3M0) после радикального лечения с наличием местных и/или общих осложнений. Рак мочевого пузыря после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса. Неустраняемая цистостома. Неустраняемая уретерокутанеостома | 70 - 80 |
| 2.1.25.4 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; | Рак мочевого пузыря IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1), инкурабельное состояние | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|-------|--|--|---------|
| | | | | | МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539; В 610 - 639, В 710 - 789 | | |
| 2.1.26 | | | Злокачественное новообразование головного мозга | C71 | | | |
| | | | Злокачественное новообразование мозжечка | C71.6 | | | |
| | | | Злокачественное новообразование спинного мозга | C72 | | | |
| 2.1.26.1 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, языковых и речевых, сенсорных, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 210 - 229, В 230 - 249, В 310 - 399, В 430 - 439, В 710 - 789 | Опухоли головного и спинного мозга 2 степени злокачественности после радикального лечения без местных и/или общих осложнений | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|----------|
| 2.1.26.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) языковых и речевых, сенсорных, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 210 - 229, В 230 - 249, В 310 - 399, В 430 - 439, В 710 - 789 | Опухоли головного и спинного мозга 3 степени злокачественности после радикального лечения с наличием местных и/или общих осложнений | 70 - 80 |
| 2.1.26.3 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной | Опухоли головного и спинного мозга 4 степени злокачественности после радикального или паллиативного лечения, инкурабельное состояние | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|-----|---|--|---------|
| | | | | | функции, языковых и речевых, сенсорных функций, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 210 - 229, В 230 - 249, В 310 - 399, В 410 - 429, В 430 - 439, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539; В 610 - 639; В 710 - 789 | | |
| 2.1.27 | | | Злокачественное новообразование щитовидной железы | C73 | | | |
| 2.1.27.1 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439 | Рак щитовидной железы (T1,2N0M0) после радикального лечения | 10 - 30 |
| 2.1.27.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, языковых и речевых функций; МКФ: В 310 - 399, В 430 - 439, В 540 - 559 | Рак щитовидной железы (T1,2,3N1,2M0) после радикального лечения без местных и/или общих осложнений | 40 - 60 |
| 2.1.27.3 | | | | | Нарушения функций системы крови и | Рак щитовидной железы (T2,3,4N1,2,3M0) после | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|--|----------|
| | | | | | иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, языковых и речевых функций; МКФ: В 310 - 399, В 430 - 439, В 540 - 559 | радикального лечения с наличием местных и/или общих осложнений. Рак щитовидной железы после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса | |
| 2.1.27.4 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539; В 610 - 639, В 710 - 789 | Рак щитовидной железы (T1,2,3,4N1,2,3M1), инкурабельное состояние | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--------------------------------|---------------------------------|---|--|----------|
| 2.1.28 | | Злокачественное новообразование надпочечника | Злокачественная феохромоцитома | C74.1 (добавочный код E27.5) | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 410 - 429, В 450 - 469, В 430 - 439, В 510 - 559, В 610 - 639, В 730 - 749 | Злокачественная феохромоцитома IV стадии (T1,2,3,4N1,2,3M1) после радикального, комплексного или комбинированного лечения с наличием местных и/или общих осложнений. Злокачественная феохромоцитома после паллиативного лечения со стабилизацией опухолевого процесса. Инкурабельное состояние | 90 - 100 |
| 2.1.29 | | Злокачественные новообразования неточно обозначенных, вторичных и неуточненных локализаций | | C76 - C80 | | | |

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---|-----|----------|
| 2.1.29.1 | | | | | | Метастазы выявленного первичного очага после радикального лечения | без | 70 - 80 |
| 2.1.29.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, языковых, и речевых, сенсорных, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 310 - 399, В 201 - 229, В 230 - 249, В 199 | Метастазы выявленного первичного очага | без | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|--------------------------------------|-----------|--|--|---------|
| 2.1.30 | | Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей | | C81 - C96 | | | |
| 2.1.30.1 | | | Болезнь Ходжкина (лимфогранулематоз) | C81 | | | |
| 2.1.30.1.1 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439 | Лимфома Ходжкина I, II стадии после курса лечения при достижении полной клинико-гематологической ремиссии | 10 - 30 |
| 2.1.30.1.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы; дыхательной, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 430 - 439, В 440 - 449; В 410 - 429 | Лимфома Ходжкина I, II стадии после курса лечения при достижении неполной клинико-гематологической ремиссии с умеренными нарушениями функций организма | 40 - 60 |
| 2.1.30.1.3 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы; | Лимфома Ходжкина III, IV стадии на фоне терапии с выраженными | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|---|--|----------|
| | | | | | функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем; мочевыделительной функции; МКФ: В 410 - 429, В 430 - 439, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639 | нарушениями функций организма. Лимфома Ходжкина II стадии при наличии осложнений терапии с выраженными нарушениями функций организма | |
| 2.1.30.1.4 | | | | | Нарушения психических функций, функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 540 - 559, В 610 - 639 | Лимфома Ходжкина IV стадии, резистентная к лечению Трансформация в другое лимфо/миелопролиферативное заболевание. Значительно выраженные нарушения функций организма | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|---|---|---------|
| 2.1.30.2 | | | <p>Фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома</p> <p>Диффузная неходжкинская лимфома</p> <p>Другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы</p> <p>Другие уточненные типы Т/НК-клеточной лимфомы</p> <p>Макроглобулинемия Вальденстрема</p> | <p>C82</p> <p>C83</p> <p>C85</p> <p>C86</p> <p>C88.0</p> | | | |
| 2.1.30.2.1 | | | | | <p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В</p> | <p>При первичном освидетельствовании - неходжкинская лимфома любой стадии</p> | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | | 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639 | | |
| 2.1.30.2 .2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639 | При первичном освидетельствовании - прогрессия неходжкинских лимфом на фоне терапии со значительно выраженными нарушениями функций крови и иммунной системы, других функций организма | 90 - 100 |
| Повторное освидетельствование | | | | | | | |
| 2.1.30.2 .3 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной | Неходжкинские лимфомы I, II, III стадии, при отсутствии прогрессирования заболевания или при достижении длительной ремиссии с умеренными нарушениями функций организма | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|---|---|----------|
| | | | | | функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639 | | |
| 2.1.30.2 .4 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639 | Неходжкинские лимфомы I, II, III, IV стадии с прогрессированием на фоне терапии. Выраженные нарушения функций организма | 70 - 80 |
| 2.1.30.2 .5 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения | Прогрессирующие неходжкинские лимфомы со значительно выраженными нарушениями функций организма | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|---|-----|--|---|---------|
| | | | | | функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189 | | |
| 2.1.30.3 | | | Множественная миелома и злокачественные плазмоклеточные новообразования | C90 | | | |
| 2.1.30.3.1 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439 | При первичном освидетельствовании - латентная, индолентная, вялотекущая формы на фоне проводимого лечения | 40 - 60 |
| 2.1.30.3.2 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439 | При первичном освидетельствовании множественная миелома любой стадии | 70 - 80 |

| Повторное освидетельствование | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 710 - 789 | Множественная миелома I, II, III стадии с наличием умеренных нарушений функций организма | 40 - 60 |
| 2.1.30.3 .3 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с | Множественная миелома I, II, III стадии с наличием выраженных нарушений функций организма. Миеломная болезнь любой стадии, | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559; В 510 - 539, В 610 - 639</p> | <p>резистентная к терапии с умеренными или выраженными нарушениями функций</p> | |
| 2.1.30.3.4 | | | | <p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма,</p> | <p>Множественная миелома I, II или III стадии, резистентная к лечению; наличие значительно выраженных нарушений функций организма. Прогрессирование основного заболевания; наличие осложнений</p> | 90 - 100 | |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|---|--------------------|--|--|---------|
| | | | | | пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 540 - 559; В 610 - 639, В 710 - 789 | | |
| 2.1.30.4 | | | Хронический лимфоидный лейкоз (лимфолейкоз) | C91.1 C91.4 - 9 | | | |
| 2.1.30.4.1 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439 | При первичном освидетельствовании хронический лимфолейкоз 0-I стадии по Rai (или стадия А по Binet), требующая динамического наблюдения при отсутствии необходимости в терапии | 10 - 30 |
| 2.1.30.4.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с | При первичном освидетельствовании хронический лимфолейкоз II стадии по Rai (или стадия А по Binet) - осложнения от | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 540 - 559; В 610 - 639, В 710 - 789</p> | <p>проводимой терапии в виде умеренных нарушений функций организма</p> | |
| 2.1.30.4.3 | | | | <p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма,</p> | <p>При первичном освидетельствовании хронический лимфолейкоз III и IV стадии по Rai (или стадия В и С по Binet) после проведенной индукционной терапии при достижении ремиссии с возникновением рецидива; резистентная форма заболевания</p> | 70 - 80 | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|----------|
| | | | | | пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 540 - 559; В 610 - 639, В 710 - 789 | | |
| 2.1.30.4 .4 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - | При первичном освидетельствовании - осложнения со значительно выраженными нарушениями функций организма (значительно выраженные нарушения костно-мозгового кроветворения); терминальная стадия заболевания | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | 450, В 510 - 539, В 540 - 559; В 610 - 639, В 710 - 789 | | |
| Повторное освидетельствование | | | | | | | |
| 2.1.30.4 .5 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439 | Достижение полной клинико-гематологической ремиссии продолжительностью не менее 1 года. Отсутствие или незначительные нарушения функций организма | 10 - 30 |
| 2.1.30.4 .6 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических | При достижении полной или частичной ремиссии с умеренными нарушениями функций организма. Хронический лимфолейкоз II или III стадии по Rai (стадия А или В по Binet), медленно прогрессирующего течения; умеренные нарушения функции организма | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199 | | |
| 2.1.30.4 .7 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199 | Отсутствие клинической ремиссии с высоким риском возможной трансформации в прогрессирующую и бластную фазу Хронический лимфолейкоз прогрессирующего течения; резистентность к терапии. Осложнения терапии и/или поражение органов-мишеней с выраженными нарушениями функций организма | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|---|--|---|--|----------|
| 2.1.30.4 .8 | | | | | <p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199</p> | <p>Хронический лимфолейкоз IV стадии, резистентный к терапии. Хронический лимфолейкоз со значительно выраженными нарушениям функций организма. Опухолевая прогрессия, трансформация в другие лимфо/миелопролиферативные заболевания</p> | 90 - 100 |
| 2.1.30.5 | | | <p>Хронический миелоидный лейкоз (миелолейкоз). Моноцитарный лейкоз Другой лейкоз уточненного</p> | <p>C92.1 C93 C94</p> | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|---|-------|--|---|---------|
| | | | клеточного типа Лейкоз неуточненного клеточного типа | C95 | | | |
| | | | Другой миелоидный лейкоз | C92.7 | | | |
| 2.1.30.5 .1 | | | | | | При первичном освидетельствовании хронический миелолейкоз любой стадии на период лечения | 70 - 80 |
| Повторное освидетельствование | | | | | | | |
| 2.1.30.5 .2 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439 | Хронический миелолейкоз при достижении полной клинико-гематологичес кой, цитогенетической и молекулярной ремиссии; отсутствие или незначительные нарушения функций организма | 10 - 30 |
| 2.1.30.5 .3 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, | Хронический миелолейкоз при достижении клинико-гематологичес кой ремиссии; умеренные нарушения | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|----------|
| | | | | | пищеварительной систем, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639 | функций организма | |
| 2.1.30.5.4 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 410 - 429, В 430 - 439, В 440 - 450, В 510 - 539, В 540 - 559, В 610 - 639 | Хронический миелолейкоз при отсутствии клинико-гематологической ремиссии; выраженные нарушения функций организма | 70 - 80 |
| 2.1.30.5.5 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) | Хронический миелолейкоз в стадии акселерации или властного криза. Хронический миелолейкоз со значительно выраженными | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---------------------------------|-------|---|-------------------------------|--|
| | | | | | функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 410 - 429, В 430 - 439, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 710 - 789, В 198, В 199 | нарушениями функций организма | |
| 2.1.30.6 | | | Острый миелобластный лейкоз | C92.0 | | | |
| | | | Острый лимфобластный лейкоз | C91.0 | | | |
| | | | Острый промиелоцитарный лейкоз | C92.4 | | | |
| | | | Острый миеломоноцитарный лейкоз | C92.5 | | | |
| | | | Острый | C92.6 | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|---|-------|---|--|----------|
| | | | миелоидный лейкоз с 11q23-аномалией | | | | |
| | | | Другой миелоидный лейкоз | C92.7 | | | |
| | | | Острый миелоидный лейкоз с многолинейной дисплазией | C92.8 | | | |
| | | | Миелоидный лейкоз неуточненный | C92.9 | | | |
| 2.1.30.6 .1 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, | Острый лейкоз в развернутой стадии. Терминальная стадия острого лейкоза с полиорганной недостаточностью, резистентной к терапии, значительно выраженными нарушениями функций организма | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199 | | |
| 2.1.30.6 .2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199 | Острый лейкоз после проведенной индукционной терапии при достижении полной клинико-гематологической ремиссии при наличии осложнений лечения и/или выраженных нарушениях функций организма | 70 - 80 |
| 2.1.30.6 .3 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы; функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной | Острый лейкоз при достижении полной клинико-гематологической ремиссии с наличием осложнений терапии и/или умеренными нарушениями функций организма | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|-------------------------------------|-----|--|--|---------|
| | | | | | системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639 | | |
| 2.1.30.7 | | | Миелодиспластические синдромы (МДС) | D46 | | | |
| 2.1.30.7.1 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439 | Латентная, вялотекущая, индолентная формы МДС без признаков прогрессирования с незначительными нарушениями функций организма | 10 - 30 |
| 2.1.30.7.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - | МДС с умеренными нарушениями функции крови и иммунной системы на фоне терапии | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | 639 | | |
| 2.1.30.7 .3 | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639 | МДС с выраженными нарушениями функции крови и иммунной системы на фоне терапии | 70 - 80 |
| 2.1.30.7 .4 | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной | МДС высокого риска; терминальная стадия заболевания, со значительно выраженными нарушениями функции крови и иммунной системы, трансформация в острый лейкоз | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | системы, мочеvyделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199 | | |
| 2.2 | | | Доброкачественные новообразования Доброкачественные новообразования мозговых оболочек Доброкачественные новообразования головного мозга и других отделов ЦНС Опухоль гипофиза | D00 - D48 D32 D33 D35.2 | | | |
| 2.2.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением | Доброкачественные опухоли различной локализации при: небольших размерах или отсутствии роста (медленном росте), опухоли без влияния на функцию смежных структур и/или органов; | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | <p>(статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 849</p> | <p>гормонально неактивные опухоли; опухоли после проведенного радикального оперативного лечения при отсутствии признаков рецидива или продолженного роста опухоли</p> | |
| 2.2.2 | | | | <p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)</p> | <p>Доброкачественные опухоли различной локализации при: больших размерах опухоли с воздействием на положение и функцию смежных структур, гормонально активные опухоли, приводящие к</p> | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 849 | умеренным нарушениям функций организма; после проведенного оперативного лечения (радикального или нерадикального) при наличии умеренных нарушений функций организма | |
| 2.2.3 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций | Доброкачественные опухоли различной локализации (преимущественно головного и спинного мозга) при: быстром росте опухоли с выраженным воздействием на положение и функцию смежных органов и | 70 - 80 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|---|---|----------|
| | | | | сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 849 | невозможности радикального ее удаления; гормонально активные опухоли, приводящие к выраженным нарушениям функций организма; после проведенного оперативного лечения (радикального или нерадикального) при наличии продолженного роста опухоли; при наличии выраженных нарушений функций организма | |
| 2.2.4 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, | Доброкачественные опухоли головного и спинного мозга при невозможности радикального хирургического лечения или после проведенного хирургического лечения со значительно выраженными нарушениями функций | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---|-------|---|--|---------|
| | | | | | <p>дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 849</p> | организма | |
| 2.2.5 | | Доброкачественное новообразование надпочечника | Доброкачественная феохромоцитома/Альдостерома | D35.0 | | | |
| 2.2.5.1 | | | | | Нарушения функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, нейромышечных, скелетных и связанных с | Доброкачественная феохромоцитома/альдостерома после радикального лечения без первичной надпочечниковой недостаточности | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410 - 429, В 450 - 4469, В 510 - 559, В 730 - 749 | | |
| 2.2.5.2 | | | | | Нарушение функции сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, мочевыделительных и двигательных функций, МКФ: В 410 - 429, В 450 - 469, В 510 - 559, В 730 - 749, В 750 - 789, В 610 - 639 | Доброкачественная феохромоцитома/альдостерома после радикального лечения с развитием первичной надпочечниковой недостаточности | 40 - 60 |
| 3 | Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|----------------|--|--|--|
| | (класс III), патология других органов и систем организма, вовлекающая иммунный механизм, и представленная в других классах болезней | | | | | | |
| <p>Примечание к пункту 3. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций крови, кроветворных органов и иммунной системы организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, зависит от вида и тяжести течения заболевания (по данным клинико-лабораторного обследования); частоты и тяжести кризов; наличия и вида кровоизлияний во внутренние органы, а также в полости крупных суставов (некритические или жизнеугрожающие), от поражения органов-мишеней, вида, объема и эффективности проводимого лечения (в том числе от регулярного применения стимуляторов гемопоэза, переливания компонентов крови или трансплантации костного мозга), резистентности к проводимой терапии, наличия осложнений (в том числе от проводимой терапии), от степени нарушения функции других органов и систем организма; прогноза заболевания.</p> | | | | | | | |
| 3.1 | | Другие болезни крови и кроветворных органов | | D70 - D77 | | | |
| 3.1.1 | | | Гипоспленизм. Врожденные аномалии селезенки - аспления | D73.0 Q89.0 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---|-------|---|---|---------|
| 3.1.1.1 | | | | | Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439 | Незначительные нарушения функций организма при отсутствии селезенки | 10 - 30 |
| 3.1.2 | | | Агранулоцитоз (наследственная нейтропения) | D70 | | | |
| | | | Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител | D80 | | | |
| | | | Комбинированные иммунодефициты | D81 | | | |
| | | | Иммунодефициты, связанные с другими значительными дефектами | D82 | | | |
| | | | Обычный переменный иммунодефицит | D83 | | | |
| | | | Другие иммунодефициты | D84 | | | |
| | | | Дефект в системе комплемента | D84.1 | | | |
| 3.1.2.1 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы; | При отсутствии осложнений после проведенного | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | МКФ: В 430 - 439 | эффективного лечения и достижения стойкой длительной (6 и более месяцев) ремиссии | |
| 3.1.2.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 610 - 639 | Рецидивирующее течение заболевания, наличие инфекционных осложнений с умеренными нарушениями функций организма на фоне базисной терапии | 40 - 60 |
| 3.1.2.3 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639 | Непрерывно рецидивирующее течение заболевания, наличие инфекционных осложнений с выраженными нарушениями функций организма на фоне базисной терапии | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|-------|--|---------------------------------------|--|--------------|--|--|---------|
| 3.2 | | Гемолитическ ие анемии | | D55 - D59 | | | |
| | | Серповидно-к леточные нарушения | | D57 | | | |
| | | Апластически е и другие анемии | | D60 - D64 | | | |
| 3.2.1 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450 | Легкая форма анемии при отсутствии нарушений (клинико-гематологическая ремиссия) либо с незначительными нарушениями функций организма на фоне базисной терапии | 10 - 30 |
| 3.2.2 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450 | Средне-тяжелая форма анемии с умеренными нарушениями функций организма на фоне базисной терапии | 40 - 60 |
| 3.2.3 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: В 430 - 439, В | Тяжелая или сверхтяжелая форма анемии с выраженными нарушениями функций организма на фоне базисной терапии | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|-------|--|--|----------|
| | | | | | 410 - 429, В 440 - 450 | | |
| 3.2.4 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450 | Анемии, резистентные к терапии. Тяжелая или сверхтяжелая форма анемии со значительно выраженными нарушениями функций организма на фоне базисной терапии | 90 - 100 |
| 3.3 | | | Наличие другого трансплантированного органа или ткани (костного мозга) | Z94.8 | | | |
| Первичное освидетельствование | | | | | | | |
| 3.3.1 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем; мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В | После аллогенной трансплантации костного мозга на срок 2 года | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | 198, В 199 | | |
| Повторное освидетельствование (через 2 года после трансплантации костного мозга) | | | | | | | |
| 3.3.2 | | | | | Нарушения функции системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199 | При наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма | 40 - 60 |
| 3.3.3 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических | При наличии осложнений с выраженными нарушениями функций организма | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|-----------|---|---|----------|
| | | | | | функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199 | | |
| 3.3.4 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы; мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199 | При наличии осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма | 90 - 100 |
| 3.4 | | Нарушения свертываемости крови, пурпура и другие геморрагические состояния | | D65 - D69 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|-------|--|--|--|
| 3.4.1 | | | Наследственный дефицит фактора VIII (гемофилия А) | D66 | | | |
| | | | Наследственный дефицит фактора IX (гемофилия В) | D67 | | | |
| | | | Болезнь Виллебранда | D68.0 | | | |
| | | | Наследственный дефицит фактора XI (гемофилия С) | D68.1 | | | |
| | | | Наследственный дефицит фактора I (фибриногена); наследственный дефицит фактора II (гипопротромбинемия); наследственный дефицит фактора V (лабильного); наследственный дефицит фактора VII (стабильного); наследственный дефицит фактора X (Стюарта-Прауэра); наследственный дефицит фактора XII (Хагемана); наследственный | D68.2 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|---------------------------|--|---|---------|
| | | | <p>дефицит фактора XIII (фибринстабилизирующего; дисфибриногенемия (врожденная), гипопроконвертинемия; Болезнь Оврена</p> <p>Геморрагические нарушения, обусловленные циркулирующими в крови антикоагулянтами Ингибиторы к факторам свертывания крови</p> <p>Приобретенный дефицит фактора свертывания</p> <p>Различные комбинации врожденного дефицита II, VII, IX и X факторов свертывания</p> | <p>D68.3</p> <p>D68.4</p> | | | |
| 3.4.1.1 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439 | Легкая форма заболевания при отсутствии кровотечений либо с | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | редкими (не более 1 раза в год) кровотечениями, требующими обращения в медицинскую организацию; не требующих заместительной терапии и/или не приводящими к развитию анемии; отсутствие кровоизлияний в суставы и/или мышцы/внутренние органы; нерегулярное использование концентратов факторов свертывания крови и/или препаратов крови с профилактической целью (при оперативных вмешательствах или травмах); для гемофилии А и В - активность факторов свертывания VIII/IX более 5% (учитывается минимальная степень активности факторов свертывания VIII/IX, когда-либо определенная у данного | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | | пациента) | |
| 3.4.1.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189 | Легкая и среднетяжелая форма заболевания с редкими (не более 3 раз в год) кровотечениями, требующих заместительной терапии и/или с развитием анемии; кровоизлияния в суставы и/или мышцы/внутренние органы не более 1 раза в год; для гемофилии А и В - активность факторов свертывания VIII/IX от 2 до 5% (учитывается минимальная степень активности факторов свертывания VIII/IX, когда-либо определенная у данного пациента) | 40 - 60 |
| 3.4.1.3 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с | Среднетяжелая и тяжелая форма заболеваний с повторными (более 3 раз в год) кровотечениями, | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | | <p>движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189</p> | <p>требующими заместительной терапии и/или госпитализации; кровоизлияния в суставы и/или мышцы/внутренние органы не более 2 - 3 раз в год; наличие хронического синовита и/или артропатии одного крупного сустава; для гемофилии А и В - активность факторов свертывания VIII/IX 1 - 2% (учитывается минимальная степень активности факторов свертывания VIII/IX, когда-либо определенная у данного пациента); регулярное использование концентратов факторов свертывания крови и/или препаратов крови с профилактической и гемостатической целью</p> | |
| 3.4.1.4 | | | | | <p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных,</p> | <p>Тяжелые формы заболеваний с частыми повторными (6 и более раз в год)</p> | 90 - 100 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189 | и с кровотечениями, со склонностью к частым (более 3 раз в год) тяжелым кровотечениям (в том числе спонтанным); кровоизлияния в суставы и/или мышцы более 3 раз в год и/или кровоизлияния во внутренние органы более 2 раз в год, и/или любой эпизод внутрочерепного кровоизлияния и/или повторные эпизоды почечных кровотечений; признаки хронического синовита и/или артропатии более чем одного крупного сустава; для гемофилии А и В - активность факторов свертывания VIII/IX менее 1% (учитывается минимальная степень активности факторов свертывания VIII/IX, когда-либо определенная у данного пациента); наличие ингибиторной |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | |
|--------|--|--|---|-------|--|--|--|
| | | | | | | гемофилии с титром ингибитора > 0,6 БЕ | |
| 3.4.2. | | | Болезнь Виллебранда | D68.0 | | | |
| | | | Качественные дефекты тромбоцитов Тромбастения, болезнь Гланцманна, болезнь Бернара-Сулье, синдром Скотта, дефицит/дефект мобилизации пулов хранения тромбоцитов, дефект сигнальных путей тромбоцитов, другие формы | D69.1 | | | |
| | | | Другие первичные тромбоцитопении, МУН9-ассоциированная тромбоцитопения, семейная тромбоцитопения с предрасположенностью к миелодисплазии, синдром "серых" тромбоцитов, | D69.4 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | | средиземноморская макротромбоцитопе ния и другие | | | | |
| 3.4.2.1 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439 | Легкая форма заболевания (отсутствие кровотечений или редкие (не более 3 раз в год) кровотечения, не требующие медикаментозной и гемостатической терапии и/или не приводящие к анемизации; использование концентратов факторов свертывания крови и/или препаратов крови не требуется | 10 - 30 |
| 3.4.2.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и | Среднетяжелая форма заболевания с частотой кровотечений (3 - 10 раз в год), либо до 3-х кровотечений, требующих гемостатической терапии и/или госпитализации; хроническая постгеморрагическая анемия средней степени, не требующая | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | <p>метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639; В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199</p> | <p>заместительной терапии препаратами крови; использование концентратов факторов свертывания крови и/или препаратов крови при оперативных вмешательствах/травмах с целью профилактики (купирования) геморрагических эпизодов</p> | |
| 3.4.2.3 | | | | <p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429,</p> | <p>Тяжелая форма заболевания с частыми (более 10 раз в год) либо 1 - 3 обильных кровотечений, приводящих к развитию острой постгеморрагической анемии; кровотечения из слизистой оболочки полости рта, макрогематурия, кровоизлияния в суставы/мышцы до 3 раз в год, во внутренние органы 2 раза в год и/или кровотечение из ЖКТ не приведшее к развитию острой или хронической</p> | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|--|----------|
| | | | | | В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199 | постгеморрагической анемии. Использование концентратов факторов свертывания крови и/или препаратов крови с профилактической или гемостатической целью при оперативных вмешательствах/травмах и/или по другим показаниям | |
| 3.4.2.4 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, | Тяжелая форма заболевания с частыми (более 3 раз в год) тяжелыми кровотечениями, приводящими к развитию острой постгеморрагической анемии, либо иными жизнеугрожающими кровотечениями | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | скелетных и первичной связанных с фармакологической движением с антитромботической (статодинамических) профилактики только в функций, нарушения ситуациях функций присоединившегося сердечно-сосудистой, высокого дыхательной, тромботического риска эндокринной систем и (тяжелый метаболизма, инфекционный процесс, пищеварительной системы, крупные хирургические мочевогоделительной функции, психических функции; вмешательства и прочие) МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199 | | |
| 3.4.3.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и тромбоза (не связанных с идиопатический движением тромбоз), не (статодинамических) приводящая к развитию функций, нарушения функций ПТФБ, требующая функций нарушения функций курса вторичной сердечно-сосудистой, фармакологической дыхательной, профилактики | Среднетяжелая форма заболевания с однократным случаем спровоцированного (не тромбоз), не приводящая к развитию ПТФБ, требующая курса вторичной фармакологической профилактики | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199 | | |
| 3.4.3.3 | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В | Тяжелая форма заболевания с повторными не более 2-х спровоцированных или 1 не спровоцированного тромбоза (идиопатический вариант). И/или требующей вторичной профилактики Или тромбоз любой локализации, приведший к ПТФБ. Дефицит протеина С/S/антитромбина менее 50%, но более 12% | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | | 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199 | | |
| 3.4.3.4 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199 | Тяжелая и крайне тяжелая форма заболевания с более чем 2 случаями спровоцированного тромбоза (не идиопатический тромбоз) и/или более чем 1 случаев идиопатического тромбоза, и/или 2 и более случаями тромбоза сосудов ЦНС, внутренних органов, тромбоэмболии легочной артерии вне зависимости от наличия/отсутствия видимой причины для тромбоза; значительно выраженные нарушения функций организма. Дефицит протеина C/S антитромбина менее 12% | 90 - 100 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|---------|
| 3.4.3.5 | | | | <p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199</p> | <p>Легкая форма заболевания при отсутствии тромбоза в анамнезе, требующая первичной фармакологической антитромботической профилактики только в ситуациях присоединившегося высокого тромботического риска (тяжелый инфекционный процесс, крупные хирургические вмешательства и прочее)</p> | 10 - 30 |
| 3.4.3.6 | | | | <p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических)</p> | <p>Среднетяжелая форма заболевания с однократным случаем спровоцированного тромбоза (не идиопатический тромбоз), не приводящая к развитию</p> | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|-------|---|--|--|
| | | | | | функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199 | ПТФБ, требующая курса вторичной фармакологической профилактики | |
| 3.4.4 | | | Первичная тромбофилия дефицит Антитромбина носительство FV Leiden (аномалия фактора V-мутация Лейдена); носительство FII G20210A; недостаточность антитромбина, протеинов C и S; мутация гена протромбина | D68.5 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|-------|--|---|---------|
| | | | Другая тромбофилия; синдром антикардиолипина, антифосфолипидный синдром, наличие волчаночного антикоагулянта | D68.6 | | | |
| 3.4.4.1 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В | Легкая форма заболевания при отсутствии тромбоза в анамнезе, требующая первичной фармакологической антитромботической профилактики только в ситуациях присоединившегося высокого тромботического риска (тяжелый инфекционный процесс, крупные хирургические вмешательства и прочее) | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | 140 - 189, В 198, В 199 | | |
| 3.4.4.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199 | Среднетяжелая форма заболевания с однократным случаем спровоцированного тромбоза (не идиопатический тромбоз), не приводящая к развитию ПТФБ, требующая курса вторичной фармакологической профилактики | 40 - 60 |
| 3.4.4.3 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с | Тяжелая форма заболевания с повторными случаями спровоцированного тромбоза (не более двух спровоцированных | 70 - 80 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|---|--|----------|
| | | | | <p>движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199</p> | <p>случаев или однократным случаем не спровоцированного тромбоза (идиопатический вариант) и/или требующий вторичной профилактики тромбоз, или тромбоз любой локализации, приведший к ПТФБ. Дефицит протеина C/S/антитромбина менее 50%, но более 12%</p> | |
| 3.4.4.4 | | | | <p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма,</p> | <p>Тяжелая и крайне тяжелая форма заболевания с более чем 2 случаями спровоцированного тромбоза (не идиопатический тромбоз) и/или более чем однократным случаем идиопатического тромбоза, и/или двумя и более случаями тромбоза сосудов ЦНС,</p> | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------|--|--|--|
| | | | | | пищеварительной системы, мочевыделительной функции, психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199 | внутренних органов, тромбоэмболии легочной артерии вне зависимости от наличия/отсутствия видимой причины для тромбоза; значительно выраженные нарушения функций организма. Дефицит протеина C/S антитромбина менее 12% | |
| 4 | Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (класс IV) и патология органов эндокринной системы, представленная в других классах болезней | | | E00 - E90 | | | |

Примечание к [пункту 4](#).

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ зависит от характера и степени

выраженности клинической симптоматики заболевания, результатов клинических и инструментальных методов исследования, а также возможности компенсации нарушенных функций с применением современных методов лечения и реабилитации.

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|----------------------|--|--|--|
| 4.1 | | Болезни щитовидной железы Эндокринные и метаболические нарушения, возникшие после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках | | E00 - E07 E89 | | | |
|-----|--|--|--|----------------------|--|--|--|

Примечание к [подпункту 4.1](#).

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных патологией щитовидной железы, производится с учетом того, что данная патология хорошо поддается лечению современными лекарственными препаратами и, как правило, не приводит к стойкому нарушению функций организма. К умеренным нарушениям функций организма могут приводить осложнения заболеваний щитовидной железы, оценка выраженности которых проводится только после достижения компенсации основного заболевания.

| | | | | | | | |
|-------|--|--|---|--------------------|--|--|--|
| 4.1.1 | | | Врожденный гипотиреоз с диффузным зобом Врожденный гипотиреоз без зоба | E03.0 E03.1 | | | |
|-------|--|--|---|--------------------|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 4.1.1.1 | | | | | Нарушения психических функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189; В 710 - 789, В 798, В 799; В 540 - 559, В 410 - 429 | незначительные нарушения функций организма на фоне адекватной заместительной терапии | 10 - 30 |
| 4.1.1.2 | | | | | Нарушения психических функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189; В 710 - 789, В 798, В 799; В 540 - 559, В 410 - 429 | Умеренные нарушения функций организма на фоне адекватной заместительной терапии | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|-----------------------------|-----|--|--|---------|
| 4.1.1.3 | | | | | Нарушения психических функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189; В 710 - 789, В 798, В 799; В 540 - 559, В 410 - 429 | Выраженные нарушения функций организма на фоне адекватной заместительной терапии | 70 - 80 |
| 4.1.2 | | | Тиреотоксикоз (гипертиреоз) | E05 | | | |
| 4.1.2.1 | | | | | Нарушения психических функций, сенсорных функций (зрения), функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189; В 198, В 199; В 210 - 229; В 410 - 429, В 540 - 559 | Осложнения, приводящие к незначительным нарушениям функций организма | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------------|--|-------------------|---|--|---------|
| 4.1.2.2 | | | | | Нарушения психических функций, сенсорных функций (зрения), функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189; В 198, В 199; В 210 - 229; В 410 - 429, В 540 - 559 | Осложнения, приводящие к умеренным нарушениям функций организм | 40 - 60 |
| 4.1.2.3 | | | | | Нарушения психических функций, сенсорных функций (зрения), функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189; В 198, В 199; В 210 - 229; В 410 - 429, В 540 - 559 | Осложнения, приводящие к выраженным нарушениям психических, сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой системы | 70 - 80 |
| 4.2 | | Сахарный диабет | | E10 - E14 | | | |
| 4.2.1 | | | Инсулинзависимый сахарный диабет. Инсулиннезависимый сахарный диабет. Сахарный диабет, связанный с | E10 E11 E12 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|--|--|---------|
| | | | недостаточностью питания. | | | | |
| | | | Другие уточненные формы сахарного диабета. | E13 | | | |
| | | | Сахарный диабет неуточненный | E14 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 4.2.1. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных сахарным диабетом, основывается на оценке степени выраженности нарушенных функций при верифицированных осложнениях со стороны органов-мишеней, таких как диабетическая нефропатия, ретинопатия, катаракта, неврологические осложнения (диабетическая невропатия), нарушения периферического кровообращения (диабетическая ангиопатия, трофическая язва, гангрена), диабетическая остеоартропатия (стопа или сустав Шарко) и прочее.</p> | | | | | | | |
| 4.2.1.1 | | | | | Нарушения сенсорных функций (зрения), нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 210 - 229; В 710 - 789, В 798, В 799; В 540 - 559, В 410 - 429; В 610 - 639 | Сахарный диабет без поражения органов-мишеней (отсутствие осложнений) или при наличии осложнений с незначительным нарушением функций организма: диабетическая нефропатия - ХБП 1, 2 и 3а стадии; диабетическая ретинопатия с остротой зрения лучше видящего или единственного глаза коррекцией > 0,3, сужено до 40°; | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | | <p>незначительная или умеренная дистальная сенсорная и сенсомоторная полиневропатия; диабетическая ангиопатия с незначительными нарушениями функций организма</p> | |
| 4.2.1.2 | | | | | <p>Нарушения психических функций, сенсорных функций (зрения); нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189; В 210 - 229; В 710 - 789, В 798, В 799; В 540 - 559, В 410 - 429; В 610 - 639</p> | <p>Осложнения сахарного диабета с умеренными нарушениями функций органов-мишеней: диабетическая нефропатия - ХБП 3Б стадии. диабетическая ретинопатия с остротой зрения лучше видящего или единственного глаза с коррекцией > 0,1 до 0,3; поле зрения - в пределах 20 - 40°; выраженная сенсомоторная невропатия с наличием пареза стоп и/или с нарушением равновесия, и/или с формированием высокого риска развития рецидива язвы</p> | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|---|--|----------|
| | | | | | стопы; диабетическая ангиопатия с умеренными нарушениями функций организма | |
| 4.2.1.3 | | | | Нарушения психических функций, сенсорных функций (зрения); нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189; В 210 - 229; В 710 - 789, В 798, В 799; В 540 - 559, В 410 - 429, В 610 - 639 | Осложнения сахарного диабета с выраженными нарушениями функций органов-мишеней: диабетическая нефропатия - ХБП 4 стадии (подготовка к диализу) и ХБП 5 стадии при эффективности диализа и отсутствии его осложнений; диабетическая ретинопатия с остротой зрения лучше видящего или единственного глаза с коррекцией 0,1 - 0,05; поле зрения - от 10 до 20° диабетическая ангиопатия с выраженными нарушениями функций организма | 70 - 80 |
| 4.2.1.4 | | | | Нарушения психических функций, сенсорных функций (зрения); | Осложнения сахарного диабета со значительно выраженными нарушениями функций | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---|-------|--|--|---------|
| | | | | | нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189; В 210 - 229; В 710 - 789, В 798, В 799; В 540 - 559, В 410 - 429, В 610 - 639 | органов-мишеней, такие как: диабетическая нефропатия - ХБП 5 стадии, осложнения заместительной почечной терапии; Диабетическая пролиферативная ретинопатия с остротой зрения лучше видящего глаза коррекцией 0,04 и ниже вплоть до слепоты; поле зрения < 10°, диабетическая ангиопатия со значительно выраженными нарушениями функций организма | |
| 4.2.2 | | | Сахарный диабет с нарушениями периферического кровообращения (диабетическая ангиопатия, трофическая язва) | E10.5 | | | |
| 4.2.2.1 | | | | | Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, функции сердечно-сосудистой | Диабетическая ангиопатия обеих нижних конечностей с ХАН 0 или I стадии | 10 - 20 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|-------|--|--|---------|
| | | | | | системы; МКФ: В 540 - 559, В 410 - 429 | | |
| 4.2.2.2 | | | | | Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, функции сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 540 - 559, В 410 - 429 | Диабетическая ангиопатия обеих нижних конечностей с ХАН II стадии | 40 - 50 |
| 4.2.2.3 | | | | | Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, функции сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 540 - 559, В 410 - 429 | ХАН III стадии с язвенным дефектом после заживления или ампутации на уровне стопы с деформацией и формированием зоны высокого риска рецидива язвы стопы одной конечности | 70 - 80 |
| 4.2.3 | | | Сахарный диабет с другими уточненными осложнениями (диабетическая нейро-остеоартропатия (Шарко)) | E10.6 | | | |
| 4.2.3.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и | Диабетическая нейроостеоартропатия одной или обеих стоп с | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799; В 540 - 559 | незначительными нарушениями статодинамических функций | |
| 4.2.3.2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710 - 789, В 540 - 559 | Диабетическая нейроостеоартропатия одной или обеих стоп с умеренными нарушениями статодинамических функций | 40 - 60 |
| 4.2.3.3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710 - 789, В 540 - 559 | Выраженная деформация обеих стоп или одной стопы в сочетании с ампутацией другой стопы с выраженными нарушениями статодинамических функций | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|------------------------------------|--|--|--|----------|
| 4.2.4 | | | Ампутационная культи конечности | | | | |
| 4.2.4.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710 - 789, В 540 - 559 | Ампутационная культя стопы, голени, бедра при отсутствии с нарушений на другой конечности | 40 - 60 |
| 4.2.4.2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710 - 789, В 540 - 559 | Ампутационная культя бедр/голен/стопы одной конечности в сочетании с ХАН II, III стадии или диабетической нейроостеартропатией на другой конечности | 70 - 80 |
| 4.2.4.3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций | Ампутационные культы голен/бедр обеих конечностей при невозможности их протезирования | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---|--------------|--|---|---------|
| | | | | | эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710 - 789, В 540 - 559 | | |
| 4.3 | | Нарушения других эндокринных желез | | E20 - E35 | | | |
| 4.3.1 | | | Гипопаратиреоз Гипопаратироидизм, возникший после медицинских процедур | E20 E89.2 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 4.3.1. Количественная оценка стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при гипопаратиреозе зависит от частоты и вида тетании (судорожных сокращений скелетных мышц, дыхательных мышц и мышц желудочно-кишечного тракта), а также от степени выраженности изменений фосфорно-кальциевого обмена при измерении показателей в условиях стационара (содержание кальция - общего и ионизированного, фосфора и паратормона в сыворотке крови; уровень кальция и фосфора в моче).</p> | | | | | | | |
| 4.3.1.1 | | | | | Нарушения психических функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, | Незначительные нарушения функций организма на фоне постоянной заместительной терапии при наличии редких тетаний преимущественно скелетных мышц, отсутствие или наличие незначительных | 10 - 20 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|---------------------|--|--|---------|
| | | | | | мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 210 - 229, В 710 - 789, В 540 - 559, В 610 - 639 | изменений показателей фосфорно-кальциевого обмена (при измерении в условиях стационара) | |
| 4.3.1.2 | | | | | Нарушения психических функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 210 - 229, В 710 - 789, В 540 - 559, В 610 - 639 | Умеренные нарушения функций организма на фоне постоянной заместительной терапии при наличии частых тетаний различных мышечных групп (скелетных, дыхательных, мышц ЖКТ) и/или наличия умеренных изменений показателей фосфорно-кальциевого обмена (при измерении в условиях стационара) | 40 - 50 |
| 4.3.2 | | | Гиперпаратиреоз и другие нарушения паращитовидной (околощитовидной) железы | E21 | | | |

Примечание к [подпункту 4.3.2.](#)

Количественная оценка стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при гиперпаратиреозе зависит от нарушений функций опорно-двигательного аппарата (остеопороз, остеодистрофия, деформации костей, патологические

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|---------|
| переломы), а также от нарушений мочевыделительной функции (проявления нефролитиаза, нефрокальциноза), функции пищеварительной системы. | | | | | | | |
| 4.3.2.1 | | | | | <p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 789, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639</p> | <p>Нормокальцемическая и мягкая форма гиперпаратиреоза без клинических проявлений либо с незначительными нарушениями функций организма</p> | 10 - 20 |
| 4.3.2.2 | | | | | <p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций пищеварительной системы, мочевыделительной</p> | <p>Манифестная форма гиперпаратиреоза с умеренными нарушениями функций организма на фоне базисной терапии</p> | 40 - 50 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|---|---------|
| | | | | | функции; МКФ: В 710 - 789, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639 | | |
| 4.3.2.3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 789, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639 | Манифестная форма гиперпаратиреоза с выраженными нарушениями функций организма на фоне базисной терапии | 70 - 80 |
| 4.3.3 | | Гиперфункция гипофиза | | E22 | | | |
| 4.3.3.1 | | | Акромегалия и гипофизарный гигантизм | E22.0 | | | |
| 4.3.3.1.1 | | | | | Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, | Акромегалия (и гипофизарный гигантизм) легкого течения | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 210 - 229, В 710 - 789, В 540 - 559, В 410 - 429 | и с незначительными нарушениями функций организма | |
| 4.3.3.1. 2 | | | | | Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 210 - 229, В 710 - 789, В 540 - 559, В 410 - 429 | и с Акромегалия (и гипофизарный гигантизм) среднетяжелого течения умеренными нарушениями функций организма | 40 - 50 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|-----------------|-------|--|---|---------|
| 4.3.3.1. 3 | | | | | Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 210 - 229, В 710 - 789, В 540 - 559, В 410 - 429, В 610 - 639 | Акромегалия (и гипофизарный гигантизм) среднетяжелого течения с выраженными нарушениями функций организма | 70 - 80 |
| 4.3.4 | | Гипофункция и другие нарушения гипофиза. | | E23 | | | |
| 4.3.4.1 | | | Гипопитуитаризм | E23.0 | | | |
| 4.3.4.1. 1 | | | | | Нарушения психических функций, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, | Гипогонадотропный гипогонадизм, СТГ-недостаточность без карликовости; пангипопитуитаризм, | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 117 - 139, В 140 - 189, В 210 - 279, В 710 - 789, В 510 - 539, В 410 - 429, В 540 - 559, В 610 - 639 | состояние с медикаментозной компенсации или субкомпенсации | |
| 4.3.4.1. 2 | | | | | Нарушения психических функций, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной | СТГ-недостаточность с карликовостью; пангипопитуитаризм с умеренно выраженными нарушениями функций организма | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---|--|---|--|---------|
| | | | | | функции; МКФ: В 117 - 139, В 140 - 189, В 210 - 279, В 710 - 789, В 510 - 539, В 410 - 429, В 540 - 559, В 610 - 639 | | |
| 4.3.5 | | | Несахарный диабет. Нефрогенный несахарный диабет | E23.2 N25.1 | | | |
| 4.3.5.1 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функции эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 540 - 559, В 410 - 429, В 510 - 539, В 610 - 639, В 810 - 849 | Несахарный диабет (центральный или нефрогенный), компенсированный или субкомпенсированный на фоне проводимой терапии | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|----------------------------------|-----|---|--|---------|
| 4.3.5.2 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функции эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 540 - 559, В 410 - 429, В 510 - 539, В 610 - 639, В 810 - 849 | Умеренные нарушения функций организма при декомпенсации несахарного диабета (центрального или нефрогенного) на фоне резистентности к терапии | 40 - 60 |
| 4.3.6 | | | Синдром и болезнь Иценко-Кушинга | E24 | | | |

Примечание к подпункту 4.3.6.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных синдромом и болезнью Иценко-Кушинга, зависит от фазы заболевания (активная, неактивная), степени тяжести формы заболевания (легкая, средней тяжести, тяжелая форма), наличия осложнений (миопатии, кардиомиопатия с проявлениями ХСН, стероидный диабет, остеопороз, аменорея, атрофия мышц, спонтанные переломы костей, нейроофтальмологические нарушения, гипертоническая первично-сморщенная почка, почечная недостаточность, органические поражения ЦНС, психические нарушения), а также наличия злокачественных опухолей гипофиза, надпочечников и резистентности к проводимой терапии.

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|---|---------|
| 4.3.6.1 | | | | | Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 117 - 139, В 140 - 189, В 710 - 789, В 540 - 559, В 410 - 429, В 610 - 639 | Гиперкортицизм с отсутствием или незначительными нарушениями функций организма на фоне проводимой терапии | 10 - 30 |
| 4.3.6.2 | | | | | Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 117 - 139, В | Гиперкортицизм средней тяжести синдрома без осложнений, с умеренными нарушениями функций организма на фоне проводимой терапии | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | | 140 - 189, В 710 - 789, В 540 - 559, В 410 - 429, В 610 - 639 | | |
| 4.3.6.3 | | | | | Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 117 - 139, В 140 - 189, В 710 - 789, В 540 - 559, В 410 - 429, В 610 - 639 | Тяжелая форма гиперкортицизма с прогрессирующим течением на фоне проводимой терапии; с осложнениями, в том числе от хирургического и/или лучевого лечения опухолей, продуцирующих АКТГ; рецидив заболевания, приводящих к выраженным нарушениям функций организма | 70 - 80 |
| 4.3.6.4 | | | | | Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой | Тяжелая форма гиперкортицизма с прогрессирующим течением на фоне терапии; с осложнениями, в том числе от оперативного и/или лучевого лечения опухолей надпочечников или гипофиза; рецидив | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---|-------|--|---|---------|
| | | | | | системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 117 - 139, В 140 - 189, В 710 - 789, В 540 - 559, В 410 - 429, В 610 - 639 | заболевания, приводящих к значительным нарушениям функций организма | |
| 4.3.7 | | | Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные дефицитом ферментов | E25.0 | | | |
| 4.3.7.1 | | | | | Нарушение функции эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 540 - 559 | Недостаточность функции надпочечников без нарушений функций или с незначительными нарушениями функций организма на фоне постоянной заместительной терапии | 10 - 30 |
| 4.3.7.2 | | | | | Нарушение функции эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 540 - 559 | Недостаточность функции надпочечников с умеренными нарушениями функций организма на фоне постоянной заместительной терапии | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---------------------|-----|---|---|---------|
| 4.3.7.3 | | | | | Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 540 - 559, В 710 - 789 | Недостаточность функции надпочечников с выраженными нарушениями функций организма | 70 - 80 |
| 4.3.8 | | | Гиперальдостеронизм | E26 | | | |
| 4.3.8.1 | | | | | Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 540 - 559, В 410 - 429 | Гиперальдостеронизм с незначительными нарушениями функций организма на фоне проводимой терапии (в том числе хирургической) | 20 - 30 |
| 4.3.8.2 | | | | | Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; | Гиперальдостеронизм с умеренными нарушениями функции организма при неэффективности лечения (невозможность радикального удаления, рецидивы, продолженный рост опухоли, | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|---------|--|---|--|--|---|--|---------|
| | | | | | МКФ: В 540 - 559, В 410 - 429, В 710 - 789 | резистентность к медикаментозной терапии) | |
| 4.3.8.3 | | | | | Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 540 - 559, В 410 - 429, В 710 - 789 | Гиперальдостеронизм с выраженными нарушениями функции организма при неэффективности лечения (невозможность радикального удаления, рецидивы, продолженный рост опухоли, резистентность к медикаментозной терапии) | 70 - 80 |
| 4.3.9 | | Другие нарушения надпочечников Полигландулярная дисфункция | | E27 E31 | | | |

Примечание к подпункту 4.3.9.

Количественная оценка стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при полигландулярной дисфункции и первичной надпочечниковой недостаточности зависит от прогрессивного характера течения заболевания, от "компонентов" заболевания (количества и вида органов и/или систем организма, вовлеченных в патологический процесс), вида и степени нарушенных функций организма: сенсорных (снижение остроты зрения вплоть до слепоты), статодинамических (множественные патологические переломы, остеопороз, контрактуры суставов, анкилозы), функций пищеварительной системы (синдром мальабсорбции, язвенная болезнь), сердечно-сосудистой системы (ХСН различной стадии), эндокринной системы и

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------|--|---|---------|
| метаболизма (гипогликемический синдром, сахарный диабет), мочевыделительной системы (ХБП различной стадии), функции кожи и связанных с ней систем, а также от наличия осложнений со стороны каждого "компонента" заболевания и эффективности проводимой терапии. | | | | | | | |
| 4.3.9.1 | | | Первичная надпочечниковая недостаточность | E27.1 | | | |
| | | | Аутоиммунная полигландулярная недостаточность | E31.0 | | | |
| | | | Полигландулярная гиперфункция | E31.1 | | | |
| 4.3.9.1.1 | | | | | Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; | Отсутствие клинико-функциональных проявлений заболевания на фоне проводимой терапии (в том числе хирургического лечения) или незначительные нарушения функций организма | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | МКФ: В 117 - 139, В 140 - 189, В 210 - 279, В 710 - 789, В 510 - 539, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | | |
| 4.3.9.1. 2 | | | | | Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 117 - 139, В 140 - 189, В 210 - 279, В 710 - 789, В 510 - 539, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | Умеренные нарушения функций организма при неэффективности лечения (в том числе хирургического) | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|---|--|----------|---|--|---------|
| 4.3.9.1. 3 | | | | | Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 117 - 139, В 140 - 189, В 210 - 279, В 710 - 789, В 510 - 539, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | Выраженные нарушения функций организма при неэффективности лечения и/или наличия осложнений со стороны органа и/или системы, вовлеченной в синдром | 70 - 80 |
| 4.4 | | Ожирение и другие виды избыточности питания | | E65 - 68 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--------------------|----------------|---|--|---------|
| 4.4.1 | | | Морбидное ожирение | E66.0 E67.8 | | | |
| 4.4.1.1 | | | | | Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 140 - 189, В 710 - 789, В 510 - 539, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559 | Ожирение без осложнений либо в сочетании с незначительными нарушениями функций организма | 10 - 30 |
| 4.4.1.2 | | | | | Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, | Ожирение с ИМТ более 40,0 в сочетании с умеренными нарушениями функций организма | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|--|----------|
| | | | | | эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 140 - 189, В 710 - 789, В 510 - 539, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559 | | |
| 4.4.1.3 | | | | | Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 140 - 189, В 710 - 789, В 510 - 539, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559 | Ожирение с ИМТ более 40,0 в сочетании с выраженными нарушениями функций организма | 70 - 80 |
| 4.4.1.4 | | | | | Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций | Ожирение с ИМТ более 40,0 в сочетании со значительно выраженными нарушениями функций организма | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|--------------------|--|--|--|
| | | | | | пищеварительной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 140 - 189, В 710 - 789, В 510 - 539, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559 | | |
| 4.5 | | Нарушения обмена веществ | | E70 - E90 | | | |
| 4.5.1 | | | Классическая фенилкетонурия Другие виды гиперфенилаланиемии | E70.0 E70.1 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 4.5.1. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных фенилкетонурией, основывается на определении степени выраженности сформированных в детском возрасте стойких нарушений психических функций, а также учитывает форму, течение заболевания, возможность достижения безопасного допустимого уровня фенилаланина и прогноз.</p> | | | | | | | |
| 4.5.1.1 | | | Фенилкетонурия легкая (6 - 10 мг/дл), среднетяжелая (10 - 20 мг/дл) форма Фенилкетонурия классическая форма | E70.0 | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--|---|-------|---|---|---------|
| | | | (более 20 мг/дл) Другие виды гиперфенилаланинемии: птерин-зависимая (кофакторная, атипичная форма фенилкетонурии) - ФКУ II и III типа | E70.1 | | | |
| 4.5.1.1.1 | | | | | Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189; | При наличии незначительных нарушений функций организма: незначительное когнитивное снижение; незначительное снижение интеллекта (IQ = 65 - 69 баллов) | 10 - 30 |
| 4.5.1.1.2 | | | | | Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, | При наличии умеренных нарушений функций организма: умеренное когнитивное снижение; умеренное снижение интеллекта (IQ = 50 - 64 баллов) | 40 - 60 |
| 4.5.1.1.3 | | | | | Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189; В 310 - 340 | При наличии выраженных нарушений функций организма: выраженное когнитивное снижение; выраженное снижение | 70 - 80 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|-----|--|--|---|----------|
| | | | | | | интеллекта (IQ = 35 - 49 баллов) | | |
| 4.5.1.1.4 | | | | | | Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189 | При наличии значительно выраженных нарушений функций организма: значительно выраженное снижение интеллекта (IQ < 35 баллов) | 90 - 100 |
| 4.5.2 | | | Нарушение обмена ароматических аминокислот | E70 | | | | |
| | | | Нарушение обмена аминокислот с разветвленной цепью и обмена жирных кислот: болезнь "кленового сиропа" (лейциноз), изовалериановая, метилмалоновая, пропионовая ацидемия и другие | E71 | | | | |
| | | | Другие нарушения обмена аминокислот: цистиноз, цистинурия, синдром Фанкони (-де Тони) (-Дебре), | E72 | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----|--|--|--|
| | | | болезнь Хартнупа, синдром Лоу, глутарикацидурия, гомоцистинурия и другие | | | | |
| | | | Другие нарушения обмена углеводов: галактоземия, фруктоземия и другие | E74 | | | |
| | | | Нарушения обмена сфинголипидов и другие болезни накопления липидов: болезнь Фабри, Тей-Сакса, Гоше, Краббе, Ниманна-Пика; синдром Фабера, метахроматическая лейкодистрофия; недостаточность сульфатазы) | E75 | | | |
| | | | Нарушения обмена глюкозаминогликан ов (мукополисахаридоз ы I, II, III, IV, VI, VII типов) | E76 | | | |
| | | | Нарушение обмена гликопротеинов | E77 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|--|--|--|
| | | | Нарушение обмена липопротеидов и другие дислипидемии | E78 | | | |
| | | | Нарушения обмена пуринов и пиримидинов: синдром Леша-Нихена, ксантинурия | E79 | | | |
| | | | Нарушения обмена порфирина и билирубина (синдром Криглера-Найяра, болезнь Байлера, синдром Люси-Дрисколла) | E80 | | | |
| | | | Нарушение минерального обмена (болезнь Вильсона-Коновалова, гепатолентикулярная дегенерация) | E83 | | | |

Примечание к подпункту 4.5.2.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при редких орфанных заболеваниях, обусловленных нарушением обмена тирозина, аминокислот с разветвленной цепью, жирных кислот, сфинголипидов и других, основывается на оценке показателей нервно-психического, физического и речевого развития, а также учитывает форму и тип течения заболевания (прогредиентное или кризовое), клинический полиморфизм симптоматики,

возможность компенсации нарушенных функций организма патогенетическим лечением, прогноз течения заболевания.

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|---------|
| 4.5.2.1 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 117 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399; В 210 - 279, В 710 - 789, В 798, В 799; В 510 - 539, В 410 - 429, В 540 - 559, В 610 - 639 | Прогрессирующее течение заболевания, частично компенсируемое патогенетической терапией, при наличии незначительных нарушений функций организма | 10 - 30 |
| 4.5.2.2 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с | Кризовое или прогрессирующее течение заболевания, не компенсируемое патогенетической терапией, при наличии умеренных нарушений | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 117 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 279, В 710 - 789, В 798, В 799; В 510 - 539, В 410 - 429, В 540 - 559, В 610 - 639 | функций организма | |
| 4.5.2.3 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; | Кризовое или прогрессивное течение заболевания, не компенсируемое патогенетической терапией, при наличии выраженных нарушений функций организма | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | | МКФ: В 117 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 279, В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 540 - 559, В 610 - 639 | | |
| 4.5.2.4 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 117 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399; В 210 - 279, В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 540 - 559, В 610 - 639 | Кризовое или прогрессирующее течение заболевания, не компенсируемое патогенетической терапией, при наличии значительно выраженных нарушений функций организма | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|--|--|---------|
| 4.5.3 | | | Кистозный фиброз (муковисцидоз) с легочными проявлениями | E84.0 | | | |
| | | | Кистозный фиброз (муковисцидоз) с другими проявлениями (с комбинированными проявлениями) | E84.1 | | | |
| | | | Кистозный фиброз неуточненный | E84.9 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 4.5.3. Количественная оценка стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных муковисцидозом, основывается на оценке фазы и активности процесса, характера течения заболевания, вида генетических мутаций, степени выраженности проявлений со стороны пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, других систем организма, вида микробного патогена дыхательного тракта, а также наличия осложнений.</p> | | | | | | | |
| 4.5.3.1 | | | | | Нарушения функций дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559 | Формы заболевания без клинической симптоматики или легкое течение заболевания с незначительными нарушениями функции дыхательной и пищеварительной систем | 10 - 30 |
| 4.5.3.2 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, дыхательной, | Среднетяжелая форма заболевания с умеренными | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 510 - 539, В 440 - 449; В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559 | нарушениями функций организма, первичный или интермитирующий высев: <i>P. aeruginosa</i> , <i>B. ceracia complex</i> , <i>MRSA</i> , <i>Stenotrophomonas maltophilia</i> , <i>Achromobacter</i> spp., нетуберкулезными микобактериями, грибами рода <i>Aspergillus</i> и других микробных патогенов, синдром потери соли, хроническая панкреатическая недостаточность, острый и рецидивирующий панкреатит, синдром дистальной кишечинальной обструкции, кровохарканье, цирроз печени без портальной гипертензии, нарушенная толерантность к глюкозе и диабет без потребности в инсулине, хронический панкреатит, белково-энергетическая недостаточность | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|---|---------|
| 4.5.3.3 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, нарушение психических функций; МКФ: В 510 - 539, В 440 - 449, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 110 - 139, В 140 - 189 | Тяжелая форма заболевания с выраженными нарушениями функций организма; наличие тяжелых хронических инфекционных осложнений, вызванных: P. aeruginosa, B. cereacia complex, MRSA, Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter spp., нетуберкулезными микобактерии, грибами рода Aspergillus и другими микробными патогенами, повторный синдром потери соли или синдром дистальной кишечинальной обструкции, легочное кровотечение, цирроз печени с портальной гипертензией, муковисцидоз-ассоциированный диабет с потребностью в инсулине, остеопороз, белково-энергетическая недостаточность 2 - 3 степени - носители | 70 - 80 |
|---------|--|--|--|--|---|---|---------|

| | | | | | | | |
|---------|--------------------------|--|--|-----------|---|--|----------|
| | | | | | | гастростомы, панкреатическая недостаточность с высокой потребностью в панкреатических ферментах (> 10 000 Ед/кг или 4 000 Ед/грамм жира), частые обострения хронического панкреатита, пневмоторакс | |
| 4.5.3.4 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, нарушение психических функций; МКФ: В 510 - 539, В 440 - 449, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 110 - 139, В 140 - 189 | Хроническая дыхательная недостаточность с кислородозависимостью, ОФВ ₁ < 30% от должного, пациенты находящиеся в листе ожидания трансплантации легких или печени | 90 - 100 |
| 5 | Психические расстройства | | | F00 - F99 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|------------|---|--|--|
| | расстройств а поведения (класс V) | | | | | | |
| <p>Примечание к пункту 5. Количественная оценка стойких нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных психическими расстройствами и расстройствами поведения, основывается преимущественно на оценке типологии, выраженности и стойкости психопатологической симптоматики, объективизируемых клинически и экспериментально-психологически. Учитываются также особенности течения заболевания, его стадия и прогноз, характер и тяжесть осложнений, наличие и особенности патопластического фона, включая преморбидные особенности личности, эффективность компенсаторных механизмов и состояние адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, бытовой, социально-средовой).</p> | | | | | | | |
| 5.1 | | Нарушения психологического развития | | F80 F89 | - | | |
| 5.1.1. | | | Общие расстройства психологического развития | F84 | | | |
| | | | Детский аутизм | F84.0 | | | |
| | | | Атипичный аутизм | F84.1 | | | |
| | | | Синдром Ретта. | F84.2 | | | |
| | | | Синдром Аспергера | F84.5 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 5.1.1. Количественная оценка стойких нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при расстройствах аутистического спектра различного генеза основывается преимущественно на анализе степени дефицита социальной коммуникации (аутистическая отрешенность, отвержение, замещение, тормозимость, снижение, вплоть до полного отсутствия социальной активности), выраженности и стойкости имеющейся клинической симптоматики и нарушений поведения (фобии и аффективные методы защиты - моторные и речевые стереотипии, поведенческие ритуалы, сверхценные увлечения, патологические фантазии, "феномен тождества" или требование неизменности, постоянства; агрессивность, включая аутоагрессию). Учитываются</p> | | | | | | | |

также характер и выраженность специфических речевых нарушений, интеллектуальной недостаточности, когнитивного снижения, психопатологических расстройств (кататонических, пароксизмальных и подобных), а также состояние компенсаторных механизмов и адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, бытовой, социально-средовой).

5.1.1.1

Нарушение психических, языковых и речевых функций;
МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399

Взрослый самостоятельно устанавливает контакт, но испытывает трудности в организации общения, особенно в новых социальных контактах (нервозность, робость, тормозимость). Нет активного избегания взгляда.
"Поведенческий сценарий": сохранение постоянства среды за счет формирования штампов - образцов правильного социального поведения; защитные образования (стереотипии, ритуалы) минимальны, носят адекватный, компенсаторный характер, появляются только в ситуации тревоги. Речевые навыки сформированы, в речи возможны единичные

10 - 30

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | | эхолалии, стереотипии, речевые "штампы". Коммуникативная функция речи сохранена. Интеллект не снижен либо снижен незначительно (IQ = 65 - 69 баллов). В целом социально адаптирован, но нуждается в индивидуальном подходе, при необходимости - в социальном сопровождении | |
| 5.1.1.2 | | | | | Нарушение психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399 | Взрослый самостоятельно устанавливает лишь минимальный контакт с окружающими, требуется постоянное побуждение. Во время контакта - повышенный уровень нервозности и боязни. Наличие кратковременного фиксированного визуального контакта. "Поведенческий сценарий": допускаются минимальные | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | <p>нарушения стереотипа общения, формируются сложные виды аффективной защиты (патологические увлечения, компенсаторные фантазии, лишенные социальной направленности). Коммуникативная функция речи нарушена. Имеются умеренные специфические нарушения речи (речь "штампованная", "стереотипная"). Интеллект не снижен либо снижен от незначительной до умеренной степени (IQ = 50 - 69 баллов). Испытывает существенные трудности адаптации в основных сферах жизнедеятельности, нуждается в периодическом социальном сопровождении</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|---|---------|
| 5.1.1.3 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639 | Взрослый самостоятельно не устанавливает контакт с окружающими, возможно лишь кратковременное привлечение внимания после побуждения. Избегание визуального контакта. "Поведенческий сценарий": не допускаются нарушения стереотипа окружающей среды, формируются множественные стереотипии, поведенческие ритуалы; характерны выраженные фобии. Коммуникативная функция речи нарушена. Имеются выраженные специфические нарушения речи. Интеллект - выраженное снижение (IQ = 35 - 49 баллов). Возможно нарушение функции тазовых органов. Частичная дезадаптация | 70 - 80 |
|---------|--|--|--|--|---|---|---------|

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|---|--|----------|
| | | | | | в основных сферах жизнедеятельности, нуждается в постоянном социальном сопровождении | |
| 5.1.1.4 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639 | Отсутствие визуального и вербального контакта, привлечь внимание невозможно. "Поведенческий сценарий": при малейшем изменении постоянства окружающей среды - неуправляемое двигательное возбуждение либо полное отрешение от окружающего; многочисленные страхи, стереотипии, проявления кататонического синдрома. Методы аффективной защиты (ритуалы) не развиты. Интеллект: значительно выраженное снижение (IQ < 34 баллов). Нарушение или отсутствие контроля функции тазовых органов. | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|--------------------------------------|------------|---|---|--|
| | | | | | | Полная дезадаптация в основных сферах жизнедеятельности с нуждаемостью в постоянном постороннем уходе и надзоре | |
| 5.2 | | Умственная отсталость | | F70 F79 | - | | |
| <p>Примечание к подпункту 5.2. Количественная оценка стойких нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше граждан в возрасте 18 лет и старше при умственной отсталости основывается на оценке степени интеллектуальной недостаточности, объективизируемой клинически и экспериментально-психологически (тест WAIS - Wechsler Adult Intelligence Scale, предназначенный для тестирования лиц от 16 лет и старше); на наличии, клиническом варианте и степени выраженности поведенческих нарушений (конфликтность, агрессивность, асоциальность, делинквентная направленность, аддиктивность, неусидчивость, моторное беспокойство, негативизм, истерические, отказные реакции и реакции ухода, индифферентность, аутизация и прочее); сопутствующей психопатологической и соматоневрологической симптоматики (пароксизмальные нарушения, параличи, парезы, патология зрения и слуха и другие); на клиническом и социальном прогнозе; на уровне адаптации взрослого в основных сферах жизнедеятельности (производственной, бытовой, социально-средовой).</p> <p>При наличии в структуре умственной отсталости системного недоразвития речи различной степени количественно оцениваются и нарушения языковых и речевых функций. При невозможности или затруднении оценки степени интеллектуальной недостаточности методикой Векслера в связи с особенностями клинической симптоматики (тяжелые поведенческие расстройства, наличие патологии органов восприятия - зрения и/или слуха) оценка производится только клинически по результатам динамического наблюдения (заключение ВК ПНД).</p> | | | | | | | |
| 5.2.1 | | | Умственная отсталость легкой степени | F70 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|--|---------|
| 5.2.1.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399 | Легкая умственная отсталость (IQ 65 - 69 баллов) при отсутствии либо в сочетании с незначительными расстройствами поведения, соматоневрологическим и нарушениями, существенно не влияющими на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности | 10 - 30 |
| 5.2.1.2 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399 | Легкая умственная отсталость (IQ 50 - 64 балла) при отсутствии сопутствующей симптоматики; легкая умственная отсталость (IQ 50 - 69 баллов) в сочетании с умеренными стойкими расстройствами поведения, психическими нарушениями (когнитивными, аффективными и прочими), соматоневрологическим и нарушениями, существенно | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---------------------------------|-----|---|--|---------|
| | | | | | | затрудняющими адаптацию в основных сферах жизнедеятельности | |
| 5.2.1.3 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639 | Легкая умственная отсталость (IQ 50 - 69 баллов) в сочетании с выраженными стойкими расстройствами поведения с возможностью лишь частичной их коррекции; психическими нарушениями (когнитивными, аффективным и прочими), соматоневрологическим и нарушениями, приводящими к дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности. Нарушение контроля функции тазовых органов | 70 - 80 |
| 5.2.2 | | | Умственная отсталость умеренная | F71 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399 | Умеренная умственная отсталость (IQ 35 - 49 баллов) при отсутствии сопутствующей симптоматики, либо в сочетании с незначительными стойкими расстройствами поведения, психическими нарушениями (когнитивными, аффективными и прочими), соматоневрологическим и нарушениями, существенно затрудняющими адаптацию в основных сферах жизнедеятельности | 40 - 60 |
| 5.2.2.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639 | Умеренная умственная отсталость (IQ 35 - 49 баллов) при отсутствии сопутствующей симптоматики; умеренная умственная отсталость (IQ 35 - 49 баллов) в сочетании с умеренными стойкими расстройствами поведения, | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|--|----------|
| | | | | | | психическими нарушениями (когнитивными, аффективными и прочими), соматоневрологическим и нарушениями, приводящими к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности. Нарушение контроля функции тазовых органов | |
| 5.2.2.2 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639 | Умеренная умственная отсталость (IQ 35 - 49 баллов) в сочетании с выраженными и значительно выраженными стойкими расстройствами поведения при невозможности их коррекции; психопатологическими нарушениями (затяжными психотическими состояниями, некорректируемыми аффективными, двигательными нарушениями, | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|-------------------------------|-----|---|---|----------|
| | | | | | | расстройствами сферы влечений и иными нарушениями), грубыми соматоневрологическим и нарушениями, снижением или отсутствием контроля функции тазовых органов, приводящими к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора | |
| 5.2.3 | | | Умственная отсталость тяжелая | F72 | | | |
| | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639 | Тяжелая умственная отсталость (IQ 20 - 34 баллов), приводящая к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора. Отсутствие контроля функции тазовых органов | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------|---|--|----------|
| 5.2.4 | | | Умственная отсталость глубокая | F73 | | | |
| 5.2.4.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639 | Глубокая умственная отсталость (IQ < 20 баллов), приводящая к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора. Отсутствие контроля функции тазовых органов | 90 - 100 |
| 5.3 | | Шизофрения, шизотипические состояния и бредовые расстройства | | F20 - F29 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 5.3. Количественная оценка стойких нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при шизофрении основывается преимущественно на анализе клинической формы, типа, темпа течения и стадии развития заболевания, типологии, выраженности и стойкости психопатологической симптоматики, этапа, полноты и стойкости ремиссии, характера и выраженности эндогенных изменений личности, объективизируемых клинически и экспериментально-психологически. Учитываются также клинический и социальный прогноз; преморбидные особенности, уровень критики и компенсаторные возможности личности; состояние адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, бытовой, социально-средовой).</p> | | | | | | | |
| 5.3.1 | | | Шизофрения, эпизодический ремитирующий (рекуррентный) тип | F20 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | | <p>течения:</p> <p>кататоническая, F20.2</p> <p>недифференцированная, F20.3</p> <p>постшизофреническая депрессия, F20.4</p> <p>другой тип, F20.8</p> <p>неуточненная F20.9</p> <p>Шизоаффективное расстройство F25</p> | | | | |
| 5.3.1.1 | | | | | Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199 | <p>Приступ (приступы) общей продолжительностью до 4 месяцев в год; устойчивая ремиссия с незначительной стойкой резидуальной психопатологической симптоматикой, существенно не влияющей на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности</p> | 10 - 30 |
| 5.3.1.2 | | | | | Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199 | <p>Приступ (приступы) общей продолжительностью от 4 до 10 месяцев в год;</p> | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---|-----|--|--|---------|
| | | | | | | неполная и/или нестойкая ремиссия с умеренной психопатологической симптоматикой, резистентной к терапии, существенно затрудняющей адаптацию в основных сферах жизнедеятельности | |
| 5.3.1.3 | | | | | Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199 | Затяжные или частые приступы общей продолжительностью 10 и более месяцев в год; неполная и нестойкая ремиссия с выраженной психопатологической симптоматикой, резистентной к терапии и приводящей к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности | 70 - 80 |
| 5.3.2 | | | Шизофрения: эпизодический тип течения со стабильным дефектом, эпизодический тип течения с нарастающим | F20 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---|--|--|---|---------|
| | | | дефектом: параноидная гебефреническая кататоническая недифференцированная постшизофреническая депрессия остаточная (резидуальная) другой тип неуточненная | F20.0 F20.1 F20.2 F20.3 F20.4 F20.5 F20.8 F20.9 | | | |
| 5.3.2.1 | | | | | Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199 | Не более одного приступа в год продолжительностью до 4 месяцев; стойкая ремиссия с незначительными стойкими дефицитарными расстройствами, эндогенными изменениями личности, существенно не влияющими на адаптацию в основных сферах | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | жизнедеятельности | |
| 5.3.2.2 | | | | Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199 | Приступ (приступы) общей продолжительностью от 4 до 6 месяцев в год; неполная и/или нестойкая ремиссия с умеренными стабильными или нарастающими дефицитарными расстройствами, эндогенными изменениями личности, резидуальной психопатологической симптоматикой, существенно затрудняющими адаптацию в основных сферах жизнедеятельности | 40 - 60 |
| 5.3.2.3 | | | | Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199 | Приступ (приступы) общей продолжительностью от 6 до 10 месяцев в год; неполная и нестойкая ремиссия с выраженными стабильными или нарастающими дефицитарными | 70 - 80 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|----------|
| | | | | | расстройствами, эндогенными изменениями личности, резидуальной психопатологической симптоматикой, резистентной к терапии, приводящими к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности | |
| 5.3.2.4 | | | | Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 510 - 539, В 610 - 639 | Приступ (приступы) общей продолжительностью 10 и более месяцев в год; значительно выраженные стойкие дефицитарные расстройства, эндогенные изменения личности с отсутствием критики к состоянию, возможным снижением или отсутствием контроля функции тазовых органов, приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---|---|--|--|---------|
| 5.3.3 | | | Шизофрения, непрерывный тип течения: параноидная гебефреническая кататоническая, недифференцированная, остаточная простая другой тип неуточненная | F20 F20.0 F20.1 F20.2 F20.3 F20.5 F20.6 F20.8 F20.9 | | | |
| 5.3.3.1 | | | | | Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199 | Незначительные стойкие прогрессирующие дефицитарные расстройства, эндогенные изменения личности, продуктивная психопатологическая симптоматика, существенно не влияющие на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|---|----------|
| 5.3.3.2 | | | | | Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199 | Умеренные стойкие прогрессирующие дефицитарные расстройства, эндогенные изменения личности, продуктивная психопатологическая симптоматика, существенно затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности | 40 - 60 |
| 5.3.3.3 | | | | | Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199 | Выраженные стойкие прогрессирующие дефицитарные расстройства, эндогенные изменения личности, продуктивная психопатологическая симптоматика, резистентная к терапии, приводящие к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности | 70 - 80 |
| 5.3.3.4 | | | | | Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной | Значительно выраженные стойкие дефицитарные расстройства (шизофреническое слабоумие), эндогенные | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|-----------------------------|-----|--|---|---------|
| | | | | | функции; МКФ: В 110 - 199, В 510 - 539, В 610 - 639 | изменения личности, продуктивная психопатологическая симптоматика, резистентная к терапии, с отсутствием критики к состоянию, возможным снижением или отсутствием контроля функции тазовых органов, приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора | |
| 5.3.4 | | | Шизотипическое расстройство | F21 | | | |
| 5.3.4.1 | | | | | Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199 | Незначительные стойкие дефицитарные расстройства, эндогенные изменения личности, психопатологическая симптоматика непсихотического регистра, существенно не влияющие на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|----------|
| 5.3.4.2 | | | | | Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199 | Умеренные стойкие дефицитарные расстройства, эндогенные изменения личности, психопатологическая симптоматика непсихотического регистра, существенно затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности | 40 - 60 |
| 5.3.4.3 | | | | | Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199 | Выраженные стойкие дефицитарные расстройства; эндогенные изменения личности, психопатологическая симптоматика непсихотического регистра, приводящие к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности | 70 - 80 |
| 5.3.4.4 | | | | | Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; | Значительно выраженные стойкие дефицитарные расстройства, эндогенные изменения личности, резистентные к терапии с | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------|---|--|---------|
| | | | | | МКФ: В 110 - 199, В 510 - 539, В 610 - 639 | отсутствием критики к состоянию, возможным снижением или отсутствием контроля функции тазовых органов, приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора | |
| 5.4 | | Расстройства настроения (аффективные расстройства) | | F30 - F39 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 5.4. Количественная оценка стойких нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при аффективных расстройствах (маниакальных, депрессивных, смешанных) основывается преимущественно на анализе их структуры, выраженности и стойкости, частоты и длительности эпизодов, эффективности проводимого лечения, полноты, стойкости и длительности ремиссий, объективизируемых клинически и экспериментально-психологически. Учитываются также преморбидные особенности личности и ее реакция на болезнь, эффективность компенсаторных механизмов, уровень критики и адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, бытовой, социально-средовой).</p> | | | | | | | |
| 5.4.1 | | | | | Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199 | Незначительные аффективные расстройства, общей продолжительностью не более 6 месяцев в год, купирующиеся фармакотерапией, со стойкой ремиссией, | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|----------|
| | | | | | существенно не влияющие на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности | |
| 5.4.2 | | | | Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199 | Умеренные аффективные расстройства, стойкие затяжные или частые, общей продолжительностью от 6 до 10 месяцев в год, существенно затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности | 40 - 60 |
| 5.4.3 | | | | Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199 | Выраженные аффективные расстройства, стойкие затяжные или частые, общей продолжительностью 10 и более месяцев в год, приводящие к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности | 70 - 80 |
| 5.4.4 | | | | Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199 | Значительно выраженные аффективные | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------|---|---|--|
| | | | | | | расстройства, стойкие затяжные или частые, общей продолжительностью 10 и более месяцев в год, приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора | |
| 5.5 | | Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства | | F40 F48 | - | | |
| <p>Примечание к подпункту 5.5. Количественная оценка стойких нарушений психических функций граждан в возрасте 18 лет и старше при невротических расстройствах основывается преимущественно на анализе их длительности и динамики (реакции, состояние, патологическое развитие личности), типологии, выраженности и стойкости психопатологической симптоматики, эффективности терапии, объективизируемых клинически и экспериментально-психологически. Учитываются также преморбидные особенности личности, эффективность компенсаторных механизмов и состояние адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, бытовой, социально-средовой).</p> | | | | | | | |
| 5.5.1 | | | Фобические тревожные расстройства Другие тревожные расстройства | F40 F41 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---|-----|---|--|---------|
| | | | Обсессивно-компульсивное расстройство | F42 | | | |
| | | | Реакция на тяжелый стресс и нарушения адаптации | F43 | | | |
| | | | Диссоциативные (конверсионные) расстройства | F44 | | | |
| | | | Соматоформные расстройства | F45 | | | |
| | | | Другие невротические расстройства | F48 | | | |
| 5.5.1.1 | | | | | Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199 | Невротические реакции или состояния с незначительной симптоматикой невротического круга (неврастенической, фобической, тревожно-депрессивной, обсессивно-компульсивной, истероконверсионной и прочими), существенно не влияющие на адаптацию в основных сферах | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | жизнедеятельности | |
| 5.5.1.2 | | | | Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199 | Невротические состояния с умеренными стойкими расстройствами невротического круга (неврастеническими, фобическими, тревожно-депрессивными, обсессивно-компульсивными, истероконверсионными и прочими), с тенденцией к ипохондризации, существенно затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности | 40 - 60 |
| 5.5.1.3 | | | | Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199 | Невротические состояния с выраженными стойкими и резистентными к терапии расстройствами невротического круга (неврастеническими, фобическими, тревожно-депрессивными, обсессивно-компульсивными) | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | | | ными, истероконверсионными и прочими), с возможным переходом в патологическое развитие личности, приводящие к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности | |
| 5.5.1.4 | | | | | Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 510 - 539, В 610 - 639 | Патологическое развитие личности со значительно выраженной, стойкой и резистентной к терапии истероконверсионной симптоматикой (амавроз, псевдопаралич по типу геми- или параплегии, астазия-абазия, псевдодеменция, нарушение функции тазовых органов), с отсутствием критики к состоянию, приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|--|--|
| 5.6 | | Органические, включая симптоматические, психические расстройства | | F00 F09 | - | | |
| <p>Примечание к подпункту 5.6. Количественная оценка стойких нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при церебрально-органической патологии основывается преимущественно на анализе нозологической принадлежности, стадии и типа течения заболевания; структуры, выраженности и стойкости психопатологической симптоматики: нарушений со стороны психических процессов (когнитивных и эмоционально-волевых), органических изменений личности, психотических, аффективных, неврозоподобных, пароксизмальных и иных расстройств, объективизируемых клинически и экспериментально-психологически. Учитываются также эффективность терапии, клинический и социальный прогноз; преморбидные особенности, уровень критики и компенсаторные возможности личности, состояние адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, бытовой, социально-средовой).</p> | | | | | | | |
| 5.6.1 | | | Деменция при болезни Альцгеймера Сосудистая деменция Деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках Деменция неуточненная Органический амнестический синдром, не | F00 F01 F02 F03 F04 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|----------------------------------|---|---|--------------|
| | | | <p>вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами</p> <p>Другие психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью.</p> <p>Расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга</p> <p>Органическое или симптоматическое психическое расстройство неуточненное</p> | <p>F06</p> <p>F07</p> <p>F09</p> | | | |
| 5.6.1.1 | | | | | Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199 | Стойкие незначительные умеренные астенические, незначительные | и 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | | когнитивные, аффективные, невротоподобные расстройства, органические изменения личности, редкие пароксизмальные расстройства, снижение интеллекта до уровня незначительной интеллектуальной недостаточности (IQ = 65 - 69 баллов), существенно не влияющие на адаптацию в основных сферах жизнедеятельности | |
| 5.6.1.2 | | | | | Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199 | Стойкие выраженные астенические, умеренные когнитивные, аффективные, невротоподобные, галлюцинаторные, бредовые расстройства, органические изменения личности, средней частоты пароксизмальные расстройства, снижение интеллекта до уровня | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | умеренной интеллектуальной недостаточности (IQ = 50 - 64 баллов), существенно затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности | |
| 5.6.1.3 | | | | Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 510 - 539, В 610 - 639 | Стойкие значительно выраженные астенические, выраженные когнитивные, аффективные, невротоподобные, галлюцинаторные, бредовые расстройства, органические изменения личности, частые пароксизмальные расстройства, снижение интеллекта до уровня выраженной интеллектуальной недостаточности (IQ = 35 - 49 баллов), снижение контроля функции тазовых органов, приводящие к частичной дезадаптации в основных сферах | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|-----------|--|---|----------|
| | | | | | | жизнедеятельности | |
| 5.6.1.4 | | | | | Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 510 - 539, В 610 - 639 | Стойкое значительно выраженное снижение когнитивных процессов и интеллекта (IQ < 34) в сочетании с другой психопатологической симптоматикой или без нее, отсутствие контроля функции тазовых органов, приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора | 90 - 100 |
| 5.7 | | Эпизодические и пароксизмальные расстройства | | G40 - G47 | | | |

Примечание к подпункту 5.7.

Количественная оценка выраженности нарушений психических функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше при эпилепсии и эпилептических синдромах основывается на оценке возраста начала заболевания, генеза, локализации эпилептического очага, вида, частоты и тяжести эпилептических припадков; типа течения заболевания (прогредиентный, доброкачественный, ремиттирующий и прочее), объема и эффективности проводимой противоэпилептической терапии, наличия резистентности к ней, длительности межприступного периода. Частота эпилептических приступов должна быть верифицирована в медицинской организации, оценка производится на протяжении календарного года, обязательным условием является наличие противоэпилептической терапии.

Необходимо также учитывать наличие, структуру и степень выраженности личностных изменений, обусловленных болезнью, симптоматики психопатологического и патопсихологического уровня реагирования (аффективной (дисфории), психоорганической, психотической, невротоподобной, психопатоподобной и другой), а также уровень социальной адаптации в основных сферах жизнедеятельности (производственной, семейной, бытовой, социально-средовой).

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 5.7.1 | | | | | Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199 | Легкие приступы до 3 в день, тяжелые - 1 раз в 2 месяца и реже; незначительная психопатологическая симптоматика без заметных изменений личности; отсутствие снижения или незначительное снижение интеллекта (IQ = 65 - 69 баллов), существенно не сказывающиеся на адаптации в основных сферах жизнедеятельности | 10 - 20 |
| 5.7.2 | | | | | Нарушение психических функций; МКФ: В 110 - 199 | Легкие приступы (3 - 4 в день) в сочетании с умеренными изменениями личности, умеренной патопсихологической симптоматикой; тяжелые приступы - 1 - 2 в месяц; выраженные дисфории - 1 раз и реже в месяц; сумеречные | 40 - 50 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | расстройства сознания или особые состояния сознания - 1 раз и реже в 1,5 месяца; эпилептический статус, серийные приступы - 1 раз в 3 месяца и/или умеренные изменения личности, умеренная патопсихологическая симптоматика; умеренное снижение интеллекта (IQ = 50 - 64 балла), затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности | |
| 5.7.3 | | | | Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции МКФ: В 110 - 199, В 510 - 539, В 610 - 639 | Легкие приступы 5 и более в день при наличии выраженной патопсихологической симптоматики и изменений личности, приводящие к дезадаптации; тяжелые приступы - 3 раза в месяц, сумеречные расстройства сознания или особые состояния сознания - 1 раз в месяц, выраженные дисфории - 2 - 3 раза в месяц, эпилептический статус, | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | | | серийные приступы - 1 раз в 2 месяца и/или выраженная патопсихологическая симптоматика, выраженные изменения личности, симптоматика психотического регистра, выраженное снижение интеллекта (IQ = 35 - 49 баллов), нарушение контроля функции тазовых органов, приводящие к дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности (IQ = 35 - 49) | |
| 5.7.4 | | | | | Нарушения психических функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 510 - 539, В 610 - 639 | Тяжелые припадки - 4 и более в месяц, 2 и более сумеречных расстройства сознания или особых состояния сознания, 4 и более эпизодов выраженной дисфории, 1 и более эпистатус в месяц в сочетании со значительно выраженной патопсихологической, психопатологической | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|------------|---|---|--|
| | | | | | | симптоматикой (в том числе психотического регистра), значительно выраженное снижение интеллекта (IQ < 34); отсутствие контроля функции тазовых органов, приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора | |
| 6 | Болезни нервной системы (класс VI) и поражения нервной системы, представленные в других классах | | | G00 G99 | - | | |

Примечание к [пункту 6](#).

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленная заболеваниями нервной системы, основывается преимущественно на оценке степени выраженности двигательных нарушений (параличи, парезы, атаксия, гиперкинезы), затрудняющих опору и передвижение, способность осуществлять простые и сложные виды движений, а также на оценке наличия и степени выраженности психических, речевых и языковых, сенсорных нарушений функций организма. Учитываются также и другие факторы патологического процесса: клиническая форма, тип и тяжесть течения заболевания, активность процесса, длительность и частота обострений, наличие и курабельность пароксизмальных

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|---------------------------|---|--|---------|
| состояний; распространенность патологического процесса, наличие осложнений, факторы клинического и реабилитационного прогноза. | | | | | | | |
| 6.1 | | Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин | | T90 T98 | - | | |
| 6.1.1 | | | Последствия травм головы (последствия ушиба головного мозга) Последствия воспалительных заболеваний центральной нервной системы Последствия цереброваскулярных болезней | T90 G09 I69 | | | |
| 6.1.1.1 | | | | | Нарушения психических, языковых, и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) | Незначительные нарушения статодинамических функций: легкий гемипарез, легкий парез, парапарез; легкий атактический синдром и другие легкие очаговые нарушения; | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299, В 710 - 789 | незначительные нарушения психических, языковых и речевых функций (дизартрия, афазия), сенсорных функций | |
| 6.1.1.2 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299, В 710 - 789 | Умеренные нарушения статодинамических функций: легкий тетрапарез, умеренный гемипарез; умеренный парапарез; умеренный атактический синдром и другие умеренные очаговые нарушения; умеренные нарушения психических, языковых и речевых функций (дизартрия, афазия), сенсорных функций | 40 - 60 |
| 6.1.1.3 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной | Выраженные нарушения статодинамических функций: умеренный тетрапарез, выраженный гемипарез, выраженный парапарез, выраженный парез; выраженный атактический синдром и другие выраженные | 70 - 80 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|---|--|----------|
| | | | | системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299; В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 610 - 639 | очаговые нарушения; выраженные нарушения психических, языковых и речевых функций (дизартрия, афазия), сенсорных функций; нарушение контроля функции тазовых органов | |
| 6.1.1.4 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299; В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 610 - 639 | Значительно выраженные нарушения статодинамической функции: значительно выраженный парапарез (либо параплегия), значительно выраженный гемипарез (либо плегия); выраженный/значительно выраженный тетрапарез (тетраплегия); значительно выраженная статическая и динамическая атаксия (самостоятельное передвижение невозможно); значительно выраженные нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|-------|--|------------------------|---|---|---|--|---------|
| | | | | | | функций; отсутствие контроля функции тазовых органов. Вегетативное состояние | |
| 6.2 | | Наследственная атаксия | | G11 | | | |
| 6.2.1 | | | Врожденная непрогрессирующая атаксия Атаксия Фридрейха (ранняя мозжечковая атаксия) Мозжечковая атаксия с нарушением репарации ДНК Другая наследственная атаксия | G11.0 G11.01 G11.3 G11.8 | | | |
| 6.2.2 | | | | | Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения | Незначительные нарушения координации и равновесия, целевой моторики; незначительные легкие сенситивно-мозжечковые нарушения, выявляемые только при | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | <p>функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 410 - 429</p> | <p>выполнении специальных тестов, не нарушающие адаптацию и функционирование человека. Незначительные нарушения функций организма</p> | |
| 6.2.3 | | | | | <p>Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 410 - 429</p> | <p>Умеренные нарушения координации и равновесия, целевой моторики; умеренные сенситивно-мозжечковые нарушения, выявляемые при выполнении обычных движений, нарушающие опору и передвижение. Умеренные нарушения функций организма</p> | 40 - 60 |
| 6.2.4 | | | | | <p>Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с</p> | <p>Выраженные нарушения координации и равновесия, целевой моторики; выраженные сенситивно-мозжечковы</p> | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|-------|---|---|----------|
| | | | | | движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 410 - 429 | е нарушения (значительно затрудняется передвижение, выполнение обычных движений). Выраженные нарушения функций организма | |
| 6.2.5 | | | | | Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 410 - 429 | Значительно выраженные нарушения координации и равновесия, целевой моторики; значительно выраженные сенситивно-атактические нарушения. Значительно выраженные нарушения функций организма | 90 - 100 |
| 6.3 | | | Болезнь Штрюмпелля (наследственная спастическая) | G11.4 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|---|--|---|---|---------|
| | | | параплегия) - изолированная и осложненная формы | | | | |
| 6.3.1 | | | | | Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 399, В 210 - 299; В 710 - 789, В 798, В 799 | Легкий парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 4 баллов) без ограничения объема активных движений, нарушения опоры и передвижения, без деформаций стоп и формирования контрактур. Незначительные нарушения функций организма | 10 - 30 |
| 6.3.2 | | | | | Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 399, В 210 - 299; В 710 - 789, В 798, В 799 | Умеренный парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 3 баллов) с умеренным нарушением способности к передвижению, формирование деформации стоп, контрактур в суставах. Умеренные нарушения функций организма | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|-----------------------|-----|---|--|---------|
| 6.3.3 | | | | | Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 399, В 210 - 299; В 710 - 789, В 798, В 799 | Выраженный парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 2 баллов) с выраженным нарушением способности к передвижению, с формированием деформации стоп, контрактур в суставах. Выраженные нарушения функций организма | 70 - 80 |
| 6.4 | | | Спинальные амиотрофии | G12 | | | |
| 6.4.1 | | | | | Нарушения языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций дыхательной системы, пищеварительной системы; МКФ: В 310 - 340, В 398; В 710 - 789, В 798, В 799, В 440 - 450, В 510 - 539 | Периферический легкий тетрапарез, умеренный парапарез и/или умеренный парез проксимального отдела обеих нижних конечностей (снижение мышечной силы до 3 баллов). Умеренные бульбарные расстройства. Деформации скелета (сколиоз, кифосколиоз) с умеренными нарушениями функций дыхательной системы | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|----------|
| 6.4.2 | | | | | Нарушения языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 310 - 340, В 398; В 710 - 789, В 798, В 799; В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639 | Генерализация атрофического процесса: выраженный нижний парапарез, умеренный верхний парапарез. Деформации скелета (сколиоз, кифосколиоз) с выраженными нарушениями функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Выраженные бульбарные расстройства. Нарушение функции тазовых органов | 70 - 80 |
| 6.4.3 | | | | | Нарушения языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, функций пищеварительной системы, нарушения | Генерализация атрофического процесса: значительно выраженный периферический тетрапарез. Тяжелые деформации скелета (сколиоз, кифосколиоз), нарушения функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем, достигающих | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|-------------------|--|---|---------|
| | | | | | мочевыделительной функции; МКФ: В 310 - 340, В 398; В 710 - 789, В 798, В 799; В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639 | значительно выраженной степени. Значительно выраженные бульбарные и псевдобульбарные нарушения. Отсутствие контроля функции тазовых органов | |
| 6.5 | | Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения | | G20 G26 | - | | |
| 6.5.1 | | | Болезнь Паркинсона Вторичный паркинсонизм Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках. | G20 G21 G22 | | | |
| 6.5.2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Незначительные, легкие моторные и немоторные симптомы паркинсонизма. 1 и 2 стадии болезни по шкале Хен-Яра. Шкала Шваба-Ингланда 90 - 100% | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---|---|---------|
| 6.5.3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Умеренные моторные и/или немоторные симптомы паркинсонизма. 3 стадия болезни по шкале Хен-Яра. Шкала Шваба-Ингланда 70 - 80% | 40 - 60 |
| 6.5.4 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Выраженные моторные и/или немоторные симптомы паркинсонизма. Умеренные продолжительные и флуктуации и болезненные дискинезии, частично или не контролируемые оптимальной консервативной терапией. 4 стадия болезни по шкале Хен-Яра. Шкала Шваба-Ингланда 50 - 60%. На период подбора режима программирования при глубокой стимуляции глубоких структур головного мозга; наличие осложнений | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|-----|--|---|----------|
| | | | | | | после оперативного вмешательства, приводящих к выраженным нарушениям | |
| 6.5.5 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Значительно выраженные моторные и/или немоторные симптомы паркинсонизма. 5 стадия болезни по шкале Хен-Яра. Шкала Шваба-Ингланда 0 - 40% | 90 - 100 |
| 6.6 | | | Другие дегенеративные болезни базальных ганглиев | G23 | | | |
| | | | Дистония | G24 | | | |
| | | | Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения. | G25 | | | |
| | | | Экстрапирамидные и двигательные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках | G26 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|---|---------|
| 6.6.1 | | | | | Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 710 - 789, В 798, В 799 | Легкие фокальные и генерализованные гиперкинезы не изменяющие физиологическое положение тела, общая целенаправленность движений и действий сохранена. Наличие незначительных нарушений психических функций | 10 - 30 |
| 6.6.2 | | | | | Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 710 - 789, В 798, В 799 | Умеренные фокальные и генерализованные гиперкинезы, изменяющие физиологическое положение тела и нарушающие последовательность и целенаправленность движений и действий. Наличие незначительных/умеренных нарушений психических функций | 40 - 60 |
| 6.6.3 | | | | | Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с | Выраженные фокальные и генерализованные гиперкинезы, с нарушением равновесия, | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|-------|--|---|---|------------|--|--|----------|
| | | | | | движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 710 - 789 | последовательности и целенаправленности движений и действий. Наличие умеренных/выраженных нарушений психических функций | |
| 6.6.4 | | | | | Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 710 - 789, В 798, В 799 | Значительно выраженные генерализованные гиперкинезы не контролируемые медикаментозным лечением, с фиксированным патологическим положением тела. Наличие выраженных/значительно выраженных нарушений психических функций | 90 - 100 |
| 6.7 | | Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы | | G35 G37 | - | | |
| 6.7.1 | | | Рассеянный склероз Другая форма острой | G35 G36 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---|-----|---|--|---------|
| | | | диссеминированной демиелинизации. Другие демиелинизирующие болезни центральной нервной системы | G37 | | | |
| 6.7.1.1 | | | | | Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 310 - 340, В 398 - 399, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 610 - 639 | Отсутствие признаков активности заболевания в соответствии с критериями, в том числе - по данным МРТ. Отсутствие или незначительные нарушения функций организма (включая легкие атактические нарушения) в том числе - на фоне терапии ПИТРС | 10 - 30 |
| 6.7.1.2 | | | | | Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением | Умеренные парезы верхних и/или нижних конечностей, умеренные бульбарные нарушения; умеренные атактические | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 310 - 340, В 398 - 399, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 610 - 639 | нарушения, частичная атрофия зрительных нервов с умеренными нарушениями сенсорных функций; умеренные нарушения функций тазовых органов, в том числе - на фоне терапии ПИТРС | |
| 6.7.1.3 | | | | | Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 310 - 340, В 398 - 399, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 610 - 639 | Выраженные парезы верхних и/или нижних конечностей, выраженные бульбарные нарушения; выраженные атактические нарушения, нарушение контроля функции тазовых органов, в том числе - на фоне терапии ПИТРС | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|-------|--|--|----------|
| 6.7.1.4 | | | | | Нарушения языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; нарушение функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 610 - 639 | Значительно выраженные парезы или параличи верхних и/или нижних конечностей; значительно выраженные бульбарные нарушения, атактические нарушения, отсутствие контроля функции тазовых органов, в том числе - на фоне терапии ПИТРС | 90 - 100 |
| 6.8 | | | Наследственная идиопатическая невропатия | и G60 | | | |
| 6.8.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций (осязания; тактильной, болевой, температурной, | Легкий парез нижних конечностей без нарушения опоры и передвижения (снижение мышечной силы до 4 баллов) | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | <p>вибрационной и других видов чувствительности); МКФ: В 250 - 299, В 710 - 789</p> | | |
| 6.8.2 | | | | | <p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций (осязания; тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности); МКФ: В 250 - 299, В 710 - 789</p> | <p>Умеренный парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 3 баллов); изменение походки ("степаж"); незначительная деформация стоп</p> | 40 - 60 |
| 6.8.3 | | | | | <p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций (осязания; тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности); МКФ: В 250 - 299, В 710 - 789</p> | <p>Выраженный парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 2 баллов), деформация стоп, нарушающая опору и передвижение, нарушение координации движений</p> | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---------|--|---|--|------------|---|--|---------|
| | | | | | чувствительности); МКФ: В 250 - 299, В 710 - 789 | | |
| 6.9 | | Болезни нервно-мышечного синапса и мышц | | G70 G73 | - | | |
| 6.9.1 | | | Myasthenia gravis и другие нарушения нервно-мышечного синапса | G70 | | | |
| 6.9.1.1 | | | | | Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной, дыхательной систем; МКФ: В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 440 - 450 | Локальные формы заболевания (глазная), генерализованная и бульбарная формы с незначительными нарушениями функций организма: полная компенсация при лечении АХЭП или АХЭП в сочетании с глюкокортикоидами или незначительная мышечная слабость и патологическая утомляемость, проявляющаяся только при многократных повторных движениях или длительном статическом | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | | напряжении отдельных групп мышц туловища, конечностей, окулярных и кранио-бульбарных мышц. Положительный результат тимэктомии, позволяющий контролировать заболевание, регресс симптомов | |
| 6.9.1.2 | | | | | Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной, дыхательной систем; МКФ: В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 440 - 450 | Умеренно выраженная мышечная слабость и патологическая утомляемость мышц туловища и (или) проксимальных сегментов конечностей, кранио-бульбарных мышц на фоне базисной терапии с колебаниями и нарастанием симптомов в течение суток, усиливающаяся при физической нагрузке, с учетом удовлетворительного эффекта тимэктомии, приводящие к умеренным нарушениям функций организма | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|----------|
| 6.9.1.3 | | | | | Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной, дыхательной систем; МКФ: В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 440 - 450 | Выраженная мышечная слабость и патологическая утомляемость мышц туловища и (или) проксимальных сегментов конечностей, кранио-бульбарных мышц на фоне недостаточно эффективной базисной терапии, тимомтимэктомии и лучевой терапии (при злокачественной тимоме), приводящие к выраженным нарушениям функций организма | 70 - 80 |
| 6.9.1.4 | | | | | Нарушения языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной, дыхательной систем; МКФ: В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299, В 710 - 789, В | Значительно выраженная мышечная слабость и патологическая утомляемость мышц туловища, конечностей, дыхательных и (или) кранио-бульбарных мышц (генерализованная форма), быстро прогрессирующее течение при неэффективной | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|---|-----|--|---|---------|
| | | | | | 798, В 799, В 510 - 539, В 440 - 450 | терапии, приводящие к значительно выраженному нарушению функций организма, что требует постоянного применения интубации трахеи с ИВЛ или без нее, использование зондового питания и необходимость в постоянной посторонней помощи и уходе | |
| 6.10 | | | Первичные поражения мышц (мышечные дистрофии) | G71 | | | |
| 6.10.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функции сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 710 - 789, В 410 - 429 | Снижение мышечной силы до 4 баллов, активные движения в суставах верхних и/или нижних конечностей сохранены в полном объеме. Незначительные нарушения функций организма | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|----------|
| 6.10.2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функции сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 710 - 789, В 410 - 429 | Снижение мышечной силы до 3 баллов, умеренное ограничение амплитуды активных движений в суставах верхних и (или) нижних конечностей, гипотрофия мышц тазового пояса и плечевого пояса. Умеренные нарушения функций организма | 40 - 60 |
| 6.10.3 | | | | | Нарушения психических, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функции сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 710 - 789, В 410 - 429 | Снижение мышечной силы до 2 баллов, выраженное ограничение амплитуды активных движений верхних и (или) нижних конечностей; выраженная гипотрофия мышц тазового пояса и плечевого пояса. Выраженные нарушения функций организма | 70 - 80 |
| 6.10.4 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с | Снижение мышечной силы до 1 балла с невозможностью самостоятельного передвижения. Значительно | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|----------|--|---|------------------------------|-----------|--|---|---------|
| | | | | | движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 310 - 340, В 710 - 789, В 410 - 429 | выраженные нарушения функций организма | |
| 6.11 | | Церебральный паралич и другие паралитические синдромы | | G80 - G83 | | | |
| 6.11.1 | | | Детский церебральный паралич | G80 | | | |
| 6.11.1.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340; В 210 - 299, В 710 - 789, В | Незначительные нарушения статодинамических функций: легкий спастический парепарез, легкий гемипарез (мышечная сила 4 балла) с сохранением активных движений в суставах верхних и нижних конечностей в полном объеме, либо имеет место тугоподвижность или | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------|---|--|
| | | | | | 798, В 799 | легкая контрактура суставов, легкая деформация стоп(ы) и/или кистей(ти) вследствие повышенного тонуса; незначительная гипотрофия мышц и укорочение конечности(ей). Незначительная туловищная (статическая) атаксия, легкая мышечная гипотония с незначительным переразгибанием в суставах, некоординированной походкой; незначительные нарушения мелкой и целевой моторики. Незначительный псевдобульбарный синдром, не затрудняющий фонацию и глотание; отсутствие нарушений, либо незначительные нарушения языковых и речевых функций (дизартрия). Незначительные | |
|--|--|--|--|--|------------|---|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | | нарушения психических функций (незначительное когнитивное снижение, IQ = 65 - 69 баллов) | |
| 6.11.1.2 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799 | Умеренные нарушения статодинамических функций: легкий тетрапарез, умеренный спастический парапарез, умеренный гемипарез (мышечная сила 3 балла) с умеренными контрактурами суставов, умеренной деформацией стоп(ы) и/или кистей(и); умеренной гипотрофией мышц и укорочением конечности. Умеренный спастико-гиперкинетический синдром: умеренные ассиметричные спастико-гиперкинетические парезы, активные движения в суставах умеренно ограничены (в большей степени вследствие гиперкинезов); Умеренная туловищная | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | <p>(статическая) атаксия, умеренная мышечная гипотония с переразгибанием в суставах, некоординированной походкой: в медленном темпе, затруднены сложные виды движений; умеренные нарушения мелкой и целевой моторики. Умеренный псевдобульбарный синдром (дизартрия, дисграфия, дислексия, дисфония, дисфагия) с нарушением фонации и глотания, с умеренными языковыми и речевыми нарушениями (дизартрия). Сочетание двигательных нарушений с умеренным когнитивным снижением и/или умеренным снижением интеллекта (IQ = 50 - 64 баллов)</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---|---------|
| 6.11.1.3 | | | | | <p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 610 - 639</p> | <p>Выраженные нарушения статодинамических функций: умеренный тетрапарез, выраженный спастический парапарез, выраженный гемипарез (мышечная сила 2 балла) с выраженными контрактурами суставов, с выраженной деформацией стоп(ы) и/или кистей(ти); с фиксированным порочным положением стоп и/или кистей, затрудняющим опору и передвижение, схват и удержание предметов. Выраженный спастико-гиперкинетический синдром: выраженные ассиметричные спастико-гиперкинетические парезы, значительно ограничивающие активные движения в суставах. Выраженная мышечная гипотония, туловищная (статическая) атаксия,</p> | 70 - 80 |
|----------|--|--|--|--|---|---|---------|

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---|----------|
| | | | | | | <p>препятствующая вертикализации, и самостоятельному передвижению. Выраженный псевдобульбарный синдром с нарушение фонации и глотания, выраженными языковыми и речевыми нарушениями (дизартрия). Сочетание двигательных нарушений с выраженным когнитивным снижением и/или снижением интеллекта до уровня умеренной умственной отсталости (IQ = 35 - 49 баллов). Нарушение контроля функции тазовых органов</p> | |
| 6.11.1.4 | | | | | <p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением</p> | <p>Значительно выраженные нарушения статодинамических функций: выраженный или значительно выраженный тетрапарез, нижний спастический парапарез,</p> | 90 - 100 |

| | |
|--|---|
| (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 210 - 299, В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 610 - 639 | значительно выраженный гемипарез или гемиплегия (мышечная сила 1 балл), нижняя параплегия (мышечная сила 0 баллов) с множественными комбинированными контрактурами суставов конечностей; фиксированным порочным положением стоп и/или кистей; нарушение координации движений и равновесия, значительно затрудняющих вертикализацию, опору и передвижение. Либо - отсутствие произвольных движений в конечностях, туловище, фиксированное патологическое положение тела (в положении лежа), с незначительными нецеленаправленными движениями (поворот набок с помощью). Значительно |
|--|---|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | значительно выраженная динамическая атаксия, значительно выраженная мышечная гипотония, препятствующая точным движениям, схвату и удержанию предметов, формированию вертикальной позы и произвольных движений. Значительно выраженный псевдобульбарный синдром (отсутствие функций жевания, глотания, анатрия), отсутствие устной речи. Значительно выраженное когнитивное снижение и/или снижение интеллекта до уровня тяжелой или глубокой умственной отсталости (IQ < 34 баллов). Отсутствие контроля функции тазовых органов | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|-------------------|---|--|---------|
| 6.12 | | | Гемиплегия Параплегия и тетраплегия Другие паралегические синдромы | G80 G81 G82 | | | |
| 6.12.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789 | Верхние конечности: легкий (4 балла) парапарез, легкий дистальный или умеренный (3 балла) проксимальный парапарез, умеренный или выраженный монопарез в том числе дистального или проксимального отдела верхней конечности; Нижние конечности: легкий парапарез, легкий проксимальный или умеренный дистальный парапарез, умеренный или выраженный монопарез, в том числе дистального или проксимального отдела нижней конечности, приводящие к незначительному нарушению | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | статодинамической функции | |
| 6.12.2 | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789 | Верхние конечности: умеренный парапарез, умеренный дистальный, выраженный (2 балла) проксимальный парапарез, значительно выраженный (1 балл) монопарез, дистальная моноплегия; Нижние конечности: умеренный парапарез, выраженный дистальный, умеренный проксимальный парапарез, значительно выраженный монопарез, моноплегия, незначительный тетрапарез; умеренный гемипарез (снижение мышечной силы до 3 баллов); легкий тетрапарез, приводящие к умеренному нарушению статодинамической функции | 40 - 60 |
| 6.12.3 | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и | Верхние конечности: выраженный парапарез, выраженный | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|---|---|----------|
| | | | | | связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789 | дистальный, значительно выраженный проксимальный парапарез; нижние конечности: выраженный парапарез, значительно выраженный дистальный, выраженный проксимальный парапарез; выраженный гемипарез (снижение мышечной силы до 2 баллов); умеренный тетрапарез, приводящие к выраженному нарушению статодинамической функции | |
| 6.12.4 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789 | Значительно выраженный гемипарез, значительно выраженный трипарез, выраженный тетрапарез, значительно выраженный парапарез рук, значительно выраженный проксимальный парапарез ног, | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--|---|--|----------------|--------------|--|--|---------|
| | | | | | | параплегия рук, ног, гемиплегия, триплегия, тетраплегия (снижение мышечной силы до 1 балла) со значительно выраженными нарушениями статодинамической функции | |
| 7 | Болезни глаза и его придаточного аппарата (класс VII) | | | N00 - N59 | | | |
| <p>Примечание к пункту 7.</p> <p>Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций глаза и его придаточного аппарата, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается на характере и степени выраженности нарушения зрительных функций, основные из которых: острота зрения в условных единицах (ед.) и поле зрения в градусах (°).</p> <p>Состояние зрительных функций определяется с учетом ранжирования их показателей, содержащихся в МКБ-10. Степень нарушения органа зрения оценивается по состоянию функции лучше видящего (или единственного) глаза с максимально переносимой коррекцией и с применением контрольных методов исследования. При необходимости углубленного обследования используются данные электрофизиологических и других специальных морфофункциональных методов исследования (оптическая когерентная томография сетчатки, определение остроты зрения - вызванные зрительные потенциалы).</p> <p>Учитываются также другие факторы патологического процесса: форма и стадия течения, активность процесса, время наступления зрительного дефекта, степень адаптации к нему, вид и особенности коррекции (очковая, контактная, интраокулярная).</p> | | | | | | | |
| 7.1 | | | Острота зрения | | | | |
| 7.1.1 | | | | | Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229 | Острота зрения (лучше видящим или единственным глазом в условиях максимальной | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|----------|
| | | | | | | переносимой коррекции) > 0,3 | |
| 7.1.2 | | | | | Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229 | Острота зрения (лучше видящим или единственным глазом в условиях максимальной переносимой коррекции) коррекцией) более 0,1 до 0,3 (включительно) | 40 - 60 |
| 7.1.3 | | | | | Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229 | Острота зрения (лучше видящим глазом с коррекцией) 0,1 - 0,05 | 70 - 80 |
| 7.1.4 | | | | | Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229 | Острота зрения (лучше видящим глазом с коррекцией) 0,04 - 0 Острота зрения (лучше видящего или единственным глазом с оптимальной коррекцией) 0 - 0,04 | 90 - 100 |
| 7.2 | | | Концентрическое сужение полей зрения (по 8 основным меридианам от точки фиксации); контрольно со смещенным | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|---|--|---|---|----------|
| | | | центром фиксации в темпоральную сторону на 15 градусов, кампиметрия | | | | |
| 7.2.1 | | | | | Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229 | Концентрическое сужение поля зрения, лучше видящего или единственного глаза от 60° до 40° (включительно) без абсолютных скотом в остаточных полях зрения. | 10 - 30 |
| 7.2.2 | | | | | Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229 | Концентрическое сужение поля зрения, лучше видящего или единственного глаза менее 40° до 20° (включительно) | 40 - 60 |
| 7.2.3 | | | | | Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229 | Концентрическое сужение поля зрения, лучше видящего или единственного глаза менее 20° до 10° (включительно) | 70 - 80 |
| 7.2.4 | | | | | Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229 | Концентрическое сужение поля зрения, лучше видящего или единственного глаза | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|---|--|--|---|----------|
| | | | | | | менее 10° | |
| 7.3 | | | Скотомы в центральном поле зрения (град.) | | | | |
| 7.3.1 | | | | | Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229 | Относительные парацентральные несливные скотомы | 10 - 30 |
| 7.3.2 | | | | | Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229 | Единичные, сливные абсолютные центральные скотомы до 5 градусов и сливные абсолютные парацентральные скотомы или кольцевидные скотомы при концентрическом сужении полей зрения лучше видящего или единственного глаза от 55 до 40 градусов (включительно) | 40 - 60 |
| 7.3.3 | | | | | Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229 | Центральные абсолютные скотомы более 5 до 10 лучше видящего или единственного глаза | 70 - 80 |
| 7.3.4 | | | | | Нарушение сенсорных функций (зрение); МКФ: В 210 - 229 | Центральные абсолютные скотомы более 10 лучше видящего или | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|---|---|---------|
| | | | | | | единственного глаза | |
| 8 | Болезни уха и сосцевидного отростка (класс VIII) | | | H60 - H95 | | | |
| <p>Примечание к пункту 8. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций уха и сосцевидного отростка, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается преимущественно на оценке характера и степени выраженности нарушения функции слуха (степени тугоухости) лучше слышащего (единственного) уха (по международной классификации тугоухости). Учитываются также и другие факторы патологического процесса: форма и стадия течения заболевания, время наступления слухового дефекта, степени адаптивности к нему, вид и особенности осложнений, сочетание с нарушением речи и психических функций и другие. При необходимости углубленного обследования используются данные электрофизиологических и других специальных морфофункциональных методов исследования (аудиоимпедансометрия, отоакустическая эмиссия, вызванные слуховые потенциалы).</p> | | | | | | | |
| 8.1 | | | Болезни уха и сосцевидного отростка (потеря слуха (глухота), тугоухость, за исключением профессионально обусловленных) | H60 - H95 | | | |
| 8.1.1 | | | | | Нарушения сенсорных, языковых и речевых функций; МКФ: В 230 - 349 (слух), В 310 - 340 | Врожденная или приобретенная в детстве глухота или тугоухость IV степени с речевыми нарушениями | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|---|----------|
| 8.1.2 | | | | | Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 230 - 349 (слух) | Тугоухость I - IV степени, односторонняя Тугоухость I - II степени, двусторонняя | 10 - 30 |
| 8.1.3 | | | | | Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 230 - 349 (слух) | Тугоухость III и IV степени, двусторонняя Глухота двусторонняя | 40 - 60 |
| 8.1.4 | | | | | Нарушения психических, сенсорных функций; МКФ: В 230 - 349 (слух), В 110 - 139, В 140 - 189 | Глухонемота, сопровождающаяся психическими нарушениями (незначительными, умеренными, выраженными) | 70 - 80 |
| 8.1.5 | | | | | | Глухонемота, сопровождающаяся значительно выраженными нарушениями функций психических функций | 90 - 100 |
| 8.2 | | | Профессионально обусловленная потеря слуха (глухота), тугоухость | | | | |
| 8.2.1 | | | | | Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 230 - 349 (слух) | Тугоухость I - III степени, двусторонняя | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--------------|--|---|---|----------|
| 8.2.2 | | | | | Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 230 - 349 (слух) | Тугоухость IV степени, двусторонняя, глухота двусторонняя | 40 - 60 |
| 8.3 | | Комбинированное нарушение зрения и слуха | | | | | 40 |
| 8.3.1 | | | Слепоглухота | | | | |
| 8.3.1.1 | | | | | Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 210 - 229 (зрение), В 230 - 349 (слух) | Двусторонняя тугоухость III степени в сочетании с высокой степенью слабовидения (острота зрения лучше видящим глазом с максимально переносимой коррекцией 0,1 - 0,05) | 80 |
| 8.3.1.2 | | | | | Нарушение сенсорных функций; МКФ: В210 - 229 (зрение), В 230 - 349 (слух) | Высокая степень слабовидения (острота зрения (лучше видящим глазом с максимально переносимой коррекцией в пределах 0,1 - 0,05) в сочетании с глухотой | 90 - 100 |
| 8.3.1.3 | | | | | Нарушение сенсорных функций; МКФ: В210 - 229 | Полная (тотальная) или практическая слепоглухота | 100 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|-----------|--|--|-----|
| | | | | | (зрение), В 230 - 349 (слух) | | |
| 8.3.1.4 | | | | | Нарушение сенсорных функций; МКФ: В210 - 229 (зрение), В 230 - 349 (слух) | Полная (тотальная) или практическая слепота в сочетании с тугоухостью III - IV степени | 100 |
| 9 | Болезни системы кровообращения (класс IX) и патология с поражением преимущественно органов системы кровообращения, представленная в других классах | | | I00 - I99 | | | |

Примечание к [пункту 9](#).

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций сердечно-сосудистой системы организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных болезнями системы кровообращения и патологией с поражением преимущественно органов системы кровообращения, основывается на оценке степени выраженности следующих клинико-функциональных проявлений: недостаточность кровообращения; гипертонический синдром, легочная гипертензия; степень нарушений сердечного ритма. Учитываются также и другие факторы патологического процесса: форма и тяжесть течения патологического процесса, частота и тяжесть обострений, распространенность, включение органов-мишеней, наличие осложнений.

| | | | | | | | |
|-------|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 9.1 | | Хронические ревматические болезни | | I05 - I09 | | | |
| 9.1.1 | | Другие болезни сердца | Ревматические поражения митрального клапана Неревматические поражения аортального клапана Неревматические поражения трехстворчатого клапана Сочетанное поражение митрального и аортального клапанов Другие ревматические болезни сердца Неревматические поражения митрального | I05 I06 I07 I08 I09 I34 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---|-----|--|---|---------|
| | | | клапана | | | | |
| | | | Неревматические поражения аортального клапана | I35 | | | |
| | | | Неревматические поражения трехстворчатого клапана | I36 | | | |
| | | | Поражение клапана легочной артерии | I37 | | | |
| 9.1.1.1 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429 | Ревматические и неревматические болезни клапана/клапанов сердца, клапана легочного ствола; ревматический миокардит, эндокардит и перикардит без признаков воспалительного процесса, с незначительными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (стенокардия I, II ФК, легкие нарушения сердечного ритма, снижение сердечного выброса) с ХСН 0 или I стадии | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 9.1.1.2 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429 | Ревматические и неревматические болезни клапана/клапанов сердца; клапана легочного ствола; ревматический миокардит, эндокардит и перикардит активного течения, с умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (стенокардия III ФК, легочная гипертензия 2-й степени, умеренные нарушения сердечного ритма, снижение сердечного выброса) с ХСН IIА стадии | 40 - 60 |
| 9.1.1.3 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429 | Ревматические и неревматические болезни клапана/клапанов сердца; клапана легочного ствола; ревматический миокардит, эндокардит и перикардит активного течения, с выраженными нарушениями функций | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|----------|
| | | | | | | сердечно-сосудистой системы (легочная гипертензия 3-й степени, стенокардия III ФК, тяжелые нарушения сердечного ритма, снижение ФВ левого желудочка менее 30%) с ХСН IIБ стадии | |
| 9.1.1.4 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429 | Ревматические и неревматические болезни клапана/клапанов сердца; клапана легочного ствола; ревматический миокардит, эндокардит и перикардит активного течения, со значительно выраженными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы (легочная гипертензия 3-й степени, стенокардия IV ФК, тяжелые нарушения сердечного ритма, снижение ФВ левого желудочка менее 30%) с ХСН III стадии | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|-----------|---|---|---------|
| 9.2 | | Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением | | I10 - I15 | | | |
| 9.2.1 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429 | Артериальная гипертензия 1 - 3 степени, гипертоническая болезнь II стадии без нарушения функций органов-мишеней. | 10 - 30 |
| 9.2.2 | | | | | Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции, нарушение психических, сенсорных функций; МКФ: В 410 - 429, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 210 - 299 | Артериальная гипертензия 1 - 3 степени, гипертоническая болезнь III стадии с умеренными нарушениями функций органов-мишеней | 40 - 60 |
| 9.2.3 | | | | | Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции, нарушение психических, сенсорных функций; | Артериальная гипертензия 1 - 3 степени, гипертоническая болезнь III стадии с выраженными нарушениями функций | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---------|--|----------------------------|-------------|-----------|---|---|----------|
| | | | | | МКФ: В 410 - 429, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 210 - 299 | органов-мишеней | |
| 9.2.4 | | | | | Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции, нарушение психических, сенсорных функций; МКФ: В 410 - 429, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 210 - 299 | Артериальная гипертензия 1 - 3 степени, гипертоническая болезнь III стадии со значительно выраженными нарушениями функций органов-мишеней | 90 - 100 |
| 9.3 | | Ишемическая болезнь сердца | | I20 - I25 | | | |
| 9.3.1 | | | Стенокардия | I20 | | | |
| 9.3.1.1 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429 | Незначительные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: стенокардия или безболевая ишемия миокарда I, II ФК (75 - 100 Вт); ХСН 0 или I стадии | 10 - 30 |
| 9.3.1.2 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; | Умеренные нарушения функции сердечно-сосудистой | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|-----|--|--|----------|
| | | | | | МКФ: В 410 - 429 | системы: стенокардия или безболевая ишемия миокарда, ФК III (50 Вт) при наличии ХСН I, II А стадии | |
| 9.3.1.3 | | | | | Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 410 - 429, В 610 - 639 | Выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: стенокардия или безболевая ишемия миокарда ФК III (50 Вт) при наличии ХСН IIБ стадии | 70 - 80 |
| 9.3.1.4 | | | | | Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 410 - 429, В 610 - 639 | Значительно выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: стенокардия и безболевая ишемия ФК IV (25 Вт) при наличии ХСН IIБ или III стадии | 90 - 100 |
| 9.4 | | | Хроническая ишемическая болезнь сердца | I25 | | | |
| | | | Предсердно-желудочковая (атриовентрикулярная) блокада и блокада левой ножки пучка (Гиса) | I44 | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------|--|--|
| | | | Сердечная недостаточность | I50 | | |
| | | | Кардиомиопатия | I42 | | |
| | | | Пароксизмальная тахикардия | I47 | | |
| | | | Фибрилляция и трепетание предсердий | I48 | | |
| | | | Другие нарушения сердечного ритма | I49 | | |
| | | | Нарушения системы кровообращения после процедур, не классифицированные в других рубриках | I97 | | |
| | | | Наличие сердечных и сосудистых имплантатов и трансплантатов | Z95 | | |
| | | | Последствия травмы внутригрудных органов | T91.4 | | |
| | | | Врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения | Q20 - Q28 | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|-------|--|--|----------|
| 9.4.1 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429 | Незначительные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН I стадии. | 10 - 30 |
| 9.4.2 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429 | Умеренные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН IIА стадии | 40 - 60 |
| 9.4.3 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429 | Выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН IIБ стадии | 70 - 80 |
| 9.4.4 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429 | Значительно выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН III стадии | 90 - 100 |
| 9.5 | | | Наличие трансплантированного сердца | Z94.1 | | | |
| | | | Наличие трансплантированных сердца и легкого | Z94.3 | | | |
| Первичное освидетельствование | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|----------|
| 9.5.1 | | | | | Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439 | Состояние после трансплантации сердца или одновременно сердца и легкого в течение первых 2 лет | 90 - 100 |
| 9.5.2 Повторное освидетельствование (после 2-х летнего наблюдения) | | | | | | | |
| 9.5.2.1 | | | | | Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439 | По истечении 2-летнего срока при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма | 40 - 60 |
| 9.5.2.2 | | | | | Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 110 - 139, В | По истечении 2-летнего срока при наличии осложнений с выраженными нарушениями функций организма | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---|-----------------------------|--|---|----------|
| | | | | | 140 - 189, В 198, В 199, В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439 | | |
| 9.5.2.3 | | | | | Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439 | По истечении 2-летнего срока при наличии осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма | 90 - 100 |
| 9.6 | | | Первичная легочная гипертензия Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности | I27.0 I27.8 I27.9 | | | |
| 9.6.1 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 450 | Незначительные нарушения функций организма на фоне эффективной специфической терапии: легочная гипертензия ФК I | 10 - 30 |
| 9.6.2 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем; | Умеренные нарушения функций организма на фоне специфической | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|---|------------|---|--|----------|
| | | | | | МКФ: В 410 - 429, В 440 - 450 | терапии: легочная гипертензия ФК II | |
| 9.6.3 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 450 | Выраженные нарушения функций организма на фоне специфической терапии: легочная гипертензия ФК III | 70 - 80 |
| 9.6.4 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 450 | Значительно выраженные нарушения функций организма на фоне специфической терапии: легочная гипертензия ФК IV | 90 - 100 |
| 9.7 | | Болезни артерий, артериол и капилляров | | I70 - I79 | | | |
| 9.7.1 | | | Атеросклероз Другие болезни периферических сосудов (хроническая артериальная недостаточность, облитерирующий артериит сосудов конечностей, а также состояния после | I70 I73 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|-------------------|--|---|---|---------|
| | | | реvascularизации) | | | | |
| 9.7.1.1 | | | | | Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410 - 429, В 710 - 789 | I, II А степень ишемии при наличии сегментарных окклюзий или стенозов (более 65%) артерий конечностей, без клинических проявлений. Лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) - 0,75 и более. После хирургической реваскуляризации при полном восстановлении кровообращения (компенсации кровообращения) | 10 - 30 |
| 9.7.1.2 | | | | | Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410 - 429, В 710 - 789 | II Б степень ишемии при наличии сегментарных окклюзий или стенозов артерий (свыше 65%), ЛПИ менее 0,75 - 0,25 После хирургической реваскуляризации с сохраняющимся дистальным блоком, с субкомпенсацией кровообращения | 40 - 60 |
| 9.7.1.3 | | | | | Нарушения функций сердечно-сосудистой, | III или IV степень ишемии, ЛПИ менее | 70 - 80 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | <p>дыхательной систем; нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 449, В 710 - 789</p> | <p>0,25. После хирургической реваскуляризации с сохраняющимся дистальным блоком, с ограниченными трофическими нарушениями (язва, некроз), декомпенсацией кровообращения; Ампутационные культы бедра/голеней одной конечности и ПБ, III степенью ишемии другой конечности; при наличии медицинских противопоказаний для протезирования; ишемия культы бедра; при сопутствующих заболеваниях с выраженными нарушениями функций организма (ХСН ПБ, III стадии, ДН III стадии)</p> | |
| 9.7.1.4 | | | | <p>Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением</p> | <p>III или IV степень ишемии, включая двусторонние трофические нарушения, ЛПИ менее 0,25 при наличии противопоказаний для</p> | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|---------------------------------|-----|---|---|---------|
| | | | | | (статодинамических) функций; МКФ: В 410 - 429, В 710 - 789 | оперативных вмешательств. Ампутационные культы обеих бедер; пороки или болезни культей; при невозможности пользования протезами из-за сопутствующих заболеваний; ишемии культей | |
| 9.8 | | | Аневризма и расслоение аорты | I71 | | | |
| | | | Другие формы аневризмы | I72 | | | |
| 9.8.1 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429 | Незначительное локальное расширение сосуда ("малые аневризмы"); после имплантации стент-графтов с полной компенсацией кровообращения. Отсутствие или незначительные нарушения функций организма | 10 - 30 |
| 9.8.2 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, и скелетных | Наличие "большой" (более 5 см) аневризмы аорты и/или крупных артерий таза с клиническими | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | связанных с проявлениями при движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410 - 429, В 710 - 789 | проявлениями при наличии медицинских противопоказаний к хирургическому лечению. После резекции "больших" аневризм, протезирования аорты и крупных артерий таза или имплантации стент-графтов с субкомпенсацией кровообращения | |
| 9.8.3 | | | | | Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410 - 429, В 710 - 789 | Крупные аневризмы брюшной аорты и/или крупных артерий таза при наличии медицинских противопоказаний к хирургическому лечению; После резекции "больших" аневризм, протезирования аорты и крупных артерий таза или имплантации стент-графтов с послеоперационными осложнениями и декомпенсацией кровообращения | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|-----------|---|---|---------|
| 9.9 | | Болезни вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, не классифицированные в других рубриках, проявляющиеся хронической венозной недостаточностью | | I80 - I88 | | | |
| 9.9.1 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429 | Хронические заболевания вен, соответствующие 2 - 3 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен | 10 - 30 |
| 9.9.2 | | | | | Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) | Хронические заболевания вен с язвенным дефектом со значительными трофическими нарушениями на одной конечности или язвенный дефект без | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | <p>функций; МКФ: В 410 - 429, В 710 - 789</p> | <p>значительной продукции отделяемого секрета на обеих конечностях, соответствующих 4 - 5 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен Двустороннее поражение со значительными трофическими нарушениями, без язвенных дефектов, соответствующих 4 - 5 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен с умеренными нарушениями статодинамических функций</p> | |
| 9.9.3 | | | | | <p>Нарушение функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с</p> | <p>Хронические заболевания вен с язвенными дефектами со значительной продукцией отделяемого секрета и</p> | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|-------|--|--|---------|
| | | | | | движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410 - 429, В 710 - 789 | трофическими нарушениями на обеих нижних конечностях, соответствующих 4 - 6 классу клинических проявлений международной классификации хронических болезней вен с выраженными нарушениями статодинамических функций | |
| 9.10 | | | Лимфоотек, не классифицированный в других рубриках (лимфедема) | 189.0 | | | |
| 9.10.1 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410 - 429, В 710 - 789, В 798, В 799 | Лимфедема ХЛН I степени с увеличением объема конечности (больше чем на 3 см) с незначительными нарушениями функций организма | 20 - 30 |
| 9.10.2 | | | | | Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения | Лимфедема с ХЛН II степени (увеличением объема на 4 - 6 см) | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|-----------|---|--|---------|
| | | | | | нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410 - 429, В 710 - 789, В 798, В 799 | обеих нижних конечностей или III степени (увеличение объема на 6 - 10 см) одной конечности со значительными трофическими нарушениями, с умеренными нарушениями функций организма | |
| 9.10.3 | | | | | Нарушения функций сердечно-сосудистой системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410 - 429, В 710 - 789, В 798, В 799 | Лимфедема с ХЛВН III, IV степени обеих нижних конечностей со значительными трофическими нарушениями, значительной продукцией отделяемого секрета, с выраженными осложнениями и нарушениями функций организма | 70 - 80 |
| 10 | Болезни органов дыхания (класс X) и патология с поражением преимущественно | | | J00 - J99 | | | |

| | | | | | | | |
|------|---|--|---|-----------|--|--|--|
| | органов дыхания, представленная в других классах болезней | | | | | | |
| 10.1 | | | Хронические болезни нижних дыхательных путей (исключая астму) | J40 - J47 | | | |
| | | | Болезни легкого, вызванные внешними агентами | J60 - J70 | | | |
| | | | Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань | J80 - J84 | | | |
| | | | Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей | J85 - J86 | | | |
| | | | Другие болезни органов дыхания | J95 - J99 | | | |
| | | | Единственное легкое (врожденное, после | Z92.4 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------|---|---|---------|
| | | | пультонэктомии) Саркоидоз Врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания | D86 Q 30 - Q 34 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 10.1. Степень тяжести дыхательной недостаточности оценивается исходя из газометрических показателей - парциального давления кислорода крови (PaO₂) и сатурации крови кислородом (SaO₂): ДН I степени - PaO₂ 79 - 60 мм.рт.ст., SaO₂ - 90 - 94%; ДН II степени - PaO₂ 59 - 55 мм.рт.ст., SaO₂ - 89 - 85%; ДН III степени - PaO₂ < 55 мм.рт.ст., SaO₂ < 85%. Учитываются также и другие (клинические) факторы патологического процесса: форма и тяжесть течения, наличие и частота обострений, объем и эффективность базовой терапии, распространенность патологического процесса, включение органов-мишеней, необходимость подавления иммунитета, наличие осложнений.</p> | | | | | | | |
| 10.1.1 | | | | | Нарушение функции дыхательной системы; МКФ: В 440 - 449 | Легкая или среднетяжелая форма течения заболевания, последствия оперативных вмешательств, с бронхиальной обструкцией на фоне базисной терапии (GOLD 1: ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, ОФВ1 >= 80%) без хронической дыхательной недостаточности (ДН 0) либо с признаками ДН I степени | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|----------|
| 10.1.2 | | | | | Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, нарушение психических функций; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 449, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199 | Среднетяжелая форма течения заболевания, последствия оперативных вмешательств, с бронхиальной обструкцией на фоне базисной терапии (GOLD 2: ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, 50% >= ОФВ1 < 80%), ДН II степени; преходящей или постоянной легочной гипертензией (ХСН 0 или ХСН I стадии) | 40 - 60 |
| 10.1.3 | | | | | Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, нарушение психических функций; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 449, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199 | Среднетяжелая и тяжелая форма течения заболевания, последствия оперативных вмешательств, с бронхиальной обструкцией на фоне базисной терапии (GOLD 3: ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, 30% >= ОФВ1 < 50%) с ДН II, III степени, ХСН IIА стадии | 70 - 80 |
| 10.1.4 | | | | | Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой | Тяжелая форма течения заболевания, последствия | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|-------|-----|---|--|---------|
| | | | | | системы, нарушение психических функций; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 449; В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199 | оперативных вмешательств с бронхиальной обструкцией (GOLD 4: ОФВ1/ФЖЕЛ < 70%, ОФВ1 < 30%), наличие осложнений, ДН III степени, ХСН IБ, III стадии | |
| 10.2 | | | Астма | J45 | | | |
| 10.2.1 | | | | | Нарушение функции дыхательной системы; МКФ: В 410 - 429 | Незначительные нарушения функции дыхательной системы: легкое или среднетяжелое течение заболевания (на фоне базисной терапии низкими или средними дозами ингаляционных кортикостероидов), ДН 0 или ДН I стадии | 10 - 30 |
| 10.2.2 | | | | | Нарушения функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 449 | Среднетяжелое течение заболевания (на фоне базисной терапии средними дозами ингаляционных кортикостероидов), ДН II степени с преходящей или постоянной легочной гипертензией (ХСН 0 или ХСН I | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--------------------------------------|-------|---|---|----------|
| | | | | | | стадии) | |
| 10.2.3 | | | | | Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем, нарушение психических функций; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 449, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199 | Тяжелое течение заболевания (на фоне базисной терапии высокими дозами ингаляционных кортикостероидов) с ДН II, III степени, ХСН II А стадии | 70 - 80 |
| 10.2.4 | | | | | Нарушение функции дыхательной, сердечно-сосудистой систем, нарушение психических функций; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 449, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199 | Тяжелое течение заболевания на фоне базисной терапии с ДН III степени, ХСН IIБ и III стадии | 90 - 100 |
| 10.3 | | | Наличие трансплантированного легкого | Z94.2 | | | |
| 10.3.1 | | | | | Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 440 - 450, В 410 - 429, В 430 - 439 | При первичном освидетельствовании после трансплантации легкого в течение первых 2 лет | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|---|----------|
| 10.3.2 | | | | | | При повторном освидетельствовании по истечении 2-летнего срока после трансплантации легких при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма. | 40 - 60 |
| 10.3.3 | | | | | | По истечении 2-летнего срока после трансплантации легких при наличии осложнений с выраженными нарушениями функций организма | 70 - 80 |
| 10.3.4 | | | | | Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439 | По истечении 2-летнего срока после трансплантации легких при наличии осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|---|-----------|---|---|---------|
| 10.4 | | | Респираторные нарушения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках | J95 | | | |
| 10.4.1 | | | | | Нарушения функций дыхательной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 440 - 449, В 310 - 340, В 398, В 399 | Наличие функционирующей постоянной трахеостомы, сохранная либо малоразборчивая речь. ДН 0 или ДН I степени | 40 - 60 |
| 10.4.2 | | | | | Нарушения функций дыхательной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 440 - 449, В 310 - 340, В 398, В 399 | Наличие функционирующей постоянной трахеостомы с выраженными нарушениями языковых и речевых функций, вплоть до потери экспрессивной речи, наличием ДН II или ДН III степени и других осложнений | 70 - 80 |
| 11 | Болезни органов пищеварения (класс XI) и патология с | | | K00 - K93 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|------------------------------|--|--|--|
| | поражением преимущественно органов пищеварения, представленная в других классах болезней | | | | | | |
| <p>Примечание к пункту 11. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций пищеварительной системы организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается на оценке формы и тяжести заболевания, наличия и частоты обострений, распространенности патологического процесса, включения органов-мишеней, наличия осложнений, а также на данных лабораторных и инструментальных методов исследования.</p> | | | | | | | |
| 11.1 | | Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей Другие врожденные аномалии (пороки развития) органов пищеварения | | K00 - K14 Q38 - 45 | | | |
| 11.1.1 | | | Челюстно-лицевые аномалии (включая аномалии прикуса) | K07 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|-----------|---|---|---------|
| | | | Расщелина губы и неба (заячья губа и волчья пасть) | Q35 - Q37 | | | |
| 11.1.1.1 | | | | | Нарушения функций пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 510 - 539, В 310 - 340, В 398, В 399 | Последствия комплексного лечения челюстно-лицевых аномалий, врожденной расщелины губы, мягкого и твердого неба в виде незначительных нарушений языковых речевых функций и функций пищеварительной системы | 10 - 30 |
| 11.1.1.2 | | | | | Нарушения функций пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 510 - 539, В 310 - 340, В 398, В 399 | Утрата части нижней или верхней челюсти, контрактура челюсти, с нарушением структуры носа, придаточной пазухи (пазух); последствия перенесенных оперативных вмешательств по поводу врожденной расщелины губы, мягкого и твердого неба с умеренными нарушениями нарушений языковых речевых функций и | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|
| | | | | | | функций пищеварительной системы | |
| 11.2 | | Болезни пищевода, желудка и двенадцатипе рстной кишки Другие болезни органов пищеварения Другие врожденные аномалии органов пищеварения | | K20 - K31 K90 - 93 Q38 - 45 | | | |
| 11.2.1 | | | Врожденные аномалии (пороки развития) пищевода Приобретенное отсутствие других отделов пищеварительного тракта (пищевода или его части) Наличие другого уточненного функционального | Q39 Z90.4 Z96.8 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|-----|---|---|---------|
| | | | имплантата (пищевода, замена пищевода) | | | | |
| | | | Непроходимость пищевода | K22 | | | |
| 11.2.1.1 | | | | | Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539 | Незначительное нарушение функций пищеварительной системы после реконструктивных операций на пищеводе | 10 - 30 |
| 11.2.1.2 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439 | Умеренное нарушение функций организма после реконструктивных операций на пищеводе | 40 - 60 |
| 11.2.1.3 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439 | Выраженное нарушение функции пищеварительной системы после реконструктивных операций на пищеводе | 70 - 80 |
| 11.2.2 | | | Другие врожденные аномалии (пороки развития) верхней | Q40 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---|---------|
| | | | <p>части пищеварительного тракта</p> <p>Врожденные отсутствие, атрезия и стеноз тонкого и толстого кишечника</p> <p>Приобретенное отсутствие части желудка</p> <p>Приобретенное отсутствие других отделов пищеварительного тракта</p> <p>Синдромы оперированного желудка</p> <p>Состояние, связанное наложением кишечного анастомоза</p> | <p>Q41 - Q42</p> <p>Z90,3</p> <p>Z90.4</p> <p>K91.1</p> <p>Z98.0</p> | | | |
| 11.2.2.1 | | | | | Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539 | Наличие легкого синдрома оперированного желудка или кишечника (демпинг-синдром, синдром приводящей | 10 - 20 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | | петли, короткой кишки и другие синдромы) без потери массы тела, незначительные нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы - 100 - 200 мкг\г, незначительные нарушения - уровень компенсации (гликированный гемоглобин HbA1c < 6,5%; гликемия натощак 4 - 8 ммоль\л) | |
| 11.2.2.2 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439 | Наличие средней тяжести синдрома оперированного желудка или кишечника (демпинг-синдром, синдром приводящей петли, короткой кишки и другие синдромы) с мальдигестией и мальабсорбцией, умеренными нарушениями метаболизма, наличие экзокринной недостаточности по фекальной эластазе (от 100 до 200 мкг/г) на | 40 - 50 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | | фоне заместительной терапии, умеренные нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы 60 - 100 мкг\г; умеренные нарушения эндокринной недостаточности (HbA1c < 7,5 - 9% гликемия более 8 ммоль\л) с учетом нутритивного статуса. | |
| 11.2.2.3 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439 | Наличие тяжелого синдрома оперированного желудка или кишечника (демпинг-синдром, синдром приводящей петли, короткой кишки и другие синдромы) с выраженной мальдигестией, мальабсорбцией и нарушениями метаболизма, наличие экзокринной недостаточности по фекальной эластазе (менее 100 мкг/г) на фоне заместительной терапии; выраженные | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------------------|---|---------------------------|--|---|---------|
| | | | | | | нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы - менее 50 мкг\г; выраженные нарушения HbA1c более 9%; гликемия более 9 ммоль\л) с учетом нутритивного статуса | |
| 11.3 | | Неинфекцион ный энтерит и колит | | K50 - K52 | | | |
| 11.3.1 | | | Болезнь Крона (регионарный энтерит) Язвенный колит Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты | K50 K51 K52 | | | |
| 11.3.1.1 | | | | | Нарушение функции пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539 | Хроническое течение заболевания (рецидив воспалительного процесса до 2 раз в год), клиниколабораторная и/или эндоскопическая ремиссия (1 год и более) с отсутствием клинических симптомов | 10 - 20 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | | заболевания, лабораторных и эндоскопических признаков воспалительной активности, либо с минимальной активностью процесса, в том числе на фоне постоянного приема противовоспалительной терапии, отсутствие или незначительно выраженные внекишечные проявления | |
| 11.3.1.2 | | | | | Нарушения функций пищеварительной системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 430 - 439 | Рецидивирующее течение (обострения 2 - 3 раза в год); хроническое непрерывное течение заболевания (левосторонний колит, терминальный илеит, в том числе в сочетании с поражением толстой кишки) клиниколабораторная и/или эндоскопическая умеренная активность заболевания на фоне проведения базисной терапии, с умеренными | 40 - 50 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | | нарушениями функций пищеварительной системы; наличием кишечных осложнений (стриктуры, межкишечные и прямокишечные свищи, ректовагинальные свищи), внекишечных проявлений умеренной тяжести, состояние после хирургического лечения с формированием стомы или тонкокишечного резервуара | |
| 11.3.1.3 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы; системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения психических функций; МКФ: В 510 - 539, В 410 - 429, В 430 - 439, | Рецидивирующее течение (обострения 4 - 5 раз год); хроническое непрерывное течение заболевания с поражением всего кишечника (панколит, распространенный илеит) и/или эндоскопическая выраженная активность процесса на фоне проведения базисной терапии; свищевая, стенозирующая формы заболевания, а также | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|----------|
| | | | | | В 710 - 789, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 540 - 559 | наличие инфильтрата, ведущие к выраженным нарушениям функций пищеварительной системы; наличием стойких локальных и внекишечных проявлений средней тяжести, необходимость проведения постоянной цитостатической и/или биологической терапии, терапии селективными иммунодепрессантами | |
| 11.3.1.4 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения психических функций; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 510 - 539, В 410 - 429, В 430 - 439, В 710 - 789, В 110 - 139, В 140 - 189, В | Терминальная стадия заболевания с тотальным поражением кишечника, значительно выраженными нарушениями пищеварения (мальабсорбция и малдигестия тяжелой степени, кахексия), других органов и систем организма при неэффективности базисной терапии, малигнизации, последствиях массивной резекции кишечника | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|--|----------------|--|--|---------|
| | | | | | 198, В 199, В 540 - 559 | | |
| 11.4 | | Другие болезни кишечника | | K55 - K63 | | | |
| 11.4.1 | | | Кишечные сращения (спайки) с непроходимостью Брюшинные спайки | K56.5 K66.0 | | | |
| 11.4.1.1 | | | | | Нарушение функции пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539 | Спаечная болезнь с редкими (1 - 4 раза в год) приступами кишечной непроходимости, купирующимися консервативно (в амбулаторных условиях) | 10 - 20 |
| 11.4.1.2 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439 | Спаечная болезнь с приступами кишечной непроходимости 5 и более раз в год, купирующимися консервативными методами терапии в условиях стационара или требующие оперативного вмешательства | 40 - 50 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|------------------|--|--|---|---------|
| 11.4.1.3 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439 | Непрерывно рецидивирующее прогрессирующее течение спаечной болезни, требующее стационарного лечения, не поддающиеся консервативной терапии и требующие оперативного вмешательства | 70 - 80 |
| 11.5 | | Болезни печени Другие врожденные аномалии органов пищеварения | | K70 - K77 B15 - B19 Q38 - Q45 | | | |
| 11.5.1 | | | Вирусный гепатит | B15 - B19 | | | |
| 11.5.1.1 | | | | | Нарушения функций пищеварительной системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 430 - 439 | Хронический гепатит с лабораторными показателями цитолиза, холестаза, мезенхимального воспаления и печеночной недостаточности 1 - 2 | 10 - 20 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | | степени; с отсутствием или незначительными клиническими проявлениями. Отсутствие фиброза либо незначительные признаки фиброза (F0 или F1 по шкале METAVIR) | |
| 11.5.1.2 | | | | | Нарушения функций пищеварительной системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 430 - 439 | Прогрессирование хронического гепатита с лабораторными показателями цитолиза, холестаза, мезенхимального воспаления и печеночной недостаточности 3 степени; с умеренными клиническими проявлениями на фоне базисной терапии. Умеренные или выраженные признаки фиброза (F2 или F3 по шкале METAVIR) | 40 - 50 |
| 11.5.2 | | | Алкогольный фиброз и склероз печени. Алкогольный цирроз печени. | K70.2 K70.3 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|-------|---|---|---------|
| | | | Токсическое поражение печени с фиброзом и циррозом печени | K71.1 | | | |
| | | | Фиброз и цирроз печени | K74 | | | |
| | | | Врожденный цирроз печени | Q44 | | | |
| 11.5.2.1 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: 510 - 539, В 540 - 559, В 410 - 429, В 430 - 439, В 110 - 139, В 140 - 189 | Цирроз печени (A0, F4 по шкале METAVIR) компенсированный неактивный (класс А по Чайлд-Пью). Отсутствие или незначительные нарушения функций организма | 10 - 20 |
| 11.5.2.2 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: 510 - 539, В 540 | Цирроз печени (A1-2, F4 по шкале METAVIR) компенсированный (класс А по Чайлд-Пью) с умеренными нарушениями функций организма | 40 - 50 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|--|----------|
| | | | | | - 559, В 410 - 429, В 430 - 439, В 110 - 139, В 140 - 189 | | |
| 11.5.2.3 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: 510 - 539, В 540 - 559, В 410 - 429, В 430 - 439, В 110 - 139, В 140 - 189 | Цирроз печени (A1-3, F4 по шкале METAVIR) субкомпенсированный (класс В по Чайлд-Пью) с выраженными нарушениями функций организма | 70 - 80 |
| 11.5.2.4 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: 510 - 539, В 540 - 559, В 410 - 429, В 430 - 439, В 110 - 139, В 140 - 189 | Цирроз печени (A1-3, F4 по шкале METAVIR) декомпенсированный (класс С по Чайлд-Пью) со значительно выраженными нарушениями функций организма | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|------------------------------------|--|---|--|----------|
| 11.5.3 | | | Наличие трансплантированной печени | | | | |
| 11.5.3.1 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189 | При первичном освидетельствовании после трансплантации печени в течение первых 2 лет | 90 - 100 |
| 11.5.3.2 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; психических функций; | При повторном освидетельствовании по истечении 2-летнего срока после трансплантации печени при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|--|----------|
| | | | | | МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189 | | |
| 11.5.3.3 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции; психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189 | По истечении 2-летнего срока после трансплантации печени при наличии осложнений с выраженными нарушениями функций организма | 70 - 80 |
| 11.5.3.4 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной | По истечении 2-летнего срока после трансплантации печени при наличии осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|--------------------|--|---|---------|
| | | | | | функции; психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189 | | |
| 11.6 | | Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы | | K80 - K87 | | | |
| 11.6.1 | | | Хронический панкреатит алкогольной этиологии. Другие хронические панкреатиты | K86.0 K86.1 | | | |
| 11.6.1.1 | | | | | Нарушение функции пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539 | Отсутствие или незначительные нарушения функции пищеварительной системы | 10 - 20 |
| 11.6.1.2 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 510 - 539, В | Умеренные нарушения экзо- и эндокринной функции поджелудочной железы | 40 - 50 |

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------|---|---|---------|
| | | | | | 540 - 559 | | |
| 11.6.1.3 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559 | Выраженные нарушения экзо- и эндокринной функции поджелудочной железы | 70 - 80 |
| 12 | Болезни кожи и подкожной клетчатки (класс XII) | | | L00 - L99 | | | |
| <p>Примечание к пункту 12. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций кожи и подкожной клетчатки, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается преимущественно на оценке степени выраженности нарушения функции кожи. Учитываются также и другие факторы патологического процесса: форма и тяжесть течения, активность процесса, наличие и частота обострений, распространенность патологического процесса, необходимость подавления иммунитета, наличие осложнений с поражением органов и систем организма.</p> | | | | | | | |
| 12.1 | | Буллезные нарушения | | L10 - L14 | | | |
| 12.1.1 | | | Пузырчатка (пемфигус) Пемфигоид | L10 L12 | | | |
| 12.1.1.1 | | | | | Нарушения функции кожи и связанных с ней систем, функций системы крови и иммунной системы; | Единичные высыпания на коже и слизистых оболочках с незначительными нарушениями функций | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------------------|-----------------------------------|-----------|---|--|---------|
| | | | | | МКФ: В 810 - 849, В 430 - 439 | организма | |
| 12.1.1.2 | | | | | Нарушения функции кожи и связанных с ней систем, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 810 - 849, В 430 - 439 | Распространенное поражение кожи (более 2 анатомических областей) и/или слизистых оболочек, в том числе внутренних органов, с умеренными нарушениями функций организма, резистентность к проводимой системной терапии | 40 - 60 |
| 12.2 | | Дерматит и экзема | | L20 - L30 | | | |
| 12.2.1 | | | Аллергический контактный дерматит | L23 | | | |
| 12.2.1.1 | | | | | Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849 | Ограниченный дерматит, обострения до 2 раз в год на фоне проводимого лечения | 10 |
| 12.2.1.2 | | | | | Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849 | Распространенный дерматит, обострения более 2 раз в год | 20 - 30 |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|----------------------|-----------|--|---|---------|
| 12.2.2 | | | Атопический дерматит | L20 | | | |
| 12.2.2.1 | | | | | Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849 | Ограниченная или распространенная форма заболевания с площадью поражения кожи до 50%, обострения до 2 раз в год на фоне проводимого лечения | 10 |
| 12.2.2.2 | | | | | Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849 | Распространенная форма с площадью поражения кожи 50% и более, обострения 3 и более раза в год, склонность к торпидному течению, резистентность к проводимой терапии | 40 |
| 12.3 | | Папулосквамозные нарушения | | L40 - L45 | | | |
| 12.3.1 | | | Псориаз | L40 | | | |
| Примечание к подпункту 12.3.1. Количественная оценка нарушений функций организма при артропатическом псориазе подробно описана в пункте 13.1 | | | | | | | |
| 12.3.1.1 | | | | | Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849 | Псориаз с площадью поражения до 50% с незначительным нарушением функций | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------------|--------------------|--------------|--|--|---------|
| | | | | | | организма | |
| 12.3.1.2 | | | | | Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849 | Частые (более 2 раз в год) обострения или непрерывно рецидивирующее течение заболевания при площади поражения кожи более 50%, резистентность к проводимой терапии. Частые (более 2 раз в год) обострения или непрерывно рецидивирующее течение ладонно-подошвенного псориаза; резистентность к проводимой терапии | 40 - 60 |
| 12.4 | | Болезни придатков кожи | | L60 - L75 | | | |
| 12.4.1 | | | Алопеция тотальная | L63.0 | | | |
| 12.4.1.1 | | | | | Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849 | Тотальное облысение, с отсутствием бровей и ресниц | 30 |
| 12.5 | | Другие болезни кожи и подкожной | | L80 - L99 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------|---|--|--|---|---------|
| | | клетчатки | | | | | |
| 12.5.1 | | | <p>Локализованная склеродермия (morphea)</p> <p>Линейная (полосовидная) склеродермия туловища и/или конечностей</p> <p>Прогрессирующая гемиатрофия лица Парри-Ромберга - глубокая линейная склеродермия</p> | <p>L94.0</p> <p>L94.1</p> <p>L94.1</p> | | | |
| 12.5.1.1 | | | | | Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849 | Поверхностные формы склеродермии без нарушений или с незначительными нарушениями кожи и связанных с ней систем | 10 - 30 |
| 12.5.1.2 | | | | | Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849 | Глубокая форма склеродермии, при вовлечении в процесс кожи и подкожной клетчатки, фасций, мышц, костей с образованием рубцов (вплоть до укорочения конечности и образования | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|---|--|--------------|--|--|---------|
| | | | | | | контрактур), сопровожающиеся умеренными нарушениями функций организма (в зависимости от локализации | |
| 12.6 | | Врожденные аномалии и пороки развития кожи | | Q80 - Q89 | | | |
| 12.6.1 | | | Врожденный буллезный эпидермолиз | Q81 | | | |
| 12.6.1.1 | | | | | Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849 | Ограниченные формы | 10 - 30 |
| 12.6.1.2 | | | | | Нарушения функций кожи и связанных с ней систем, нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной | Поражения кожи (в том числе активных поверхностей - кистей, стоп), слизистых оболочек внутренних органов, приводящие к умеренным нарушениям функций организма | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|-----------|---|--|---------|
| | | | | | системы; МКФ: В 810 - 849, В 710 - 789, В 210 - 279, В 510 - 539 | | |
| 12.6.1.3 | | | | | Нарушения функций кожи и связанных с ней систем; нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; сенсорных функций, нарушение функций пищеварительной системы, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 810 - 849, В 710 - 789, В 210 - 279, В 510 - 539; В 410 - 429, В 610 - 639 | Поражения кожи, слизистых оболочек внутренних органов приводящие к выраженным нарушениям функций организма | 70 - 80 |
| 13 | Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | | | M00 - M99 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--|--|--|--|--|--|
| | (класс XIII) | | | | | | |
| <p>Примечание к пункту 13. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций костно-мышечной системы и соединительной ткани основывается преимущественно на оценке степени выраженности нарушений функций органов и систем организма, степени выраженности нарушений функции суставов (наличие и степень контрактуры, деформаций суставов), позвоночника (степень ограничения подвижности позвоночника); с учетом рентгенологических изменений в суставах и позвоночнике, рекомендованных валидированных методов оценки клинико-лабораторных показателей активности заболевания; характеристики течения и степени тяжести заболевания. Необходимо учитывать также постоянную потребность (объем и виды) в противовоспалительной и иммуносупрессивной терапии (сочетание препаратов нескольких фармакотерапевтических групп), на фоне которой достигается и сохраняется состояние ремиссии заболевания.</p> | | | | | | | |
| 13.1 | | Воспалительные полиартропатии Артрозы | | M05 - M14 M15 - M19 | | | |
| 13.1.1 | | | Серопозитивный ревматоидный артрит Синдром Фелти Ревматоидный артрит с вовлечением других органов и систем Другие серопозитивные ревматоидные артриты | M05 M05.0 M05.3 M05.8 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|---|---|---|---------|
| | | | <p>Серопозитивные ревматоидные артриты неуточненные</p> <p>Другие ревматоидные артриты</p> <p>Серонегативный ревматоидный артрит</p> <p>Болезнь Стилла, резвившаяся у взрослых</p> <p>Другие уточненные ревматоидные артриты</p> <p>Юношеский артрит с системным началом</p> | <p>M05.9</p> <p>M06</p> <p>M06.0</p> <p>M06.1</p> <p>M06.8</p> <p>M08.2</p> | | | |
| 13.1.1.1 | | | | | <p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной,</p> | <p>Отсутствие или незначительное нарушение функции организма: ФК I; рентгенологическая стадия I; отсутствие или I степень активности заболевания; отсутствие системных проявлений заболевания; отсутствие</p> | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | осложнений заболевания и/или проводимой терапии | |
| 13.1.1.2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, | Умеренное нарушение функции организма: ФК II; рентгенологическая стадия II; II степень активности заболевания; отсутствие системных проявлений заболевания; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к умеренно выраженным нарушениям функций организма | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | | |
| 13.1.1.3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - | Выраженное нарушение функции организма: ФК II - III; рентгенологическая стадия II - IV; II - III степень активности заболевания; наличие системных проявлений заболевания; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к выраженным нарушениям функций организма | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---|----------|
| | | | | | 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | | |
| 13.1.1.4 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | Значительно выраженные нарушения функции организма: ФК IV (обоих тазобедренных, или более двух крупных суставов в функционально невыгодном состоянии); рентгенологическая стадия III - IV; вне зависимости от активности заболевания на фоне терапии; наличие системных проявлений заболевания; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к значительным нарушениям функций организма | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|------------------|---|---|---------|
| 13.1.2 | | | Псориатические и энтеропатические артропатии | M07.0 - M07.3 | | | |
| 13.1.2.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | Отсутствие или незначительное нарушение функции организма, отсутствие или незначительное нарушение функции суставов и/или энтезисов и/или позвоночника; отсутствие или низкая активность заболевания; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|--|---------|
| 13.1.2.2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | Умеренное нарушение функции суставов и/или энтезисов и/или позвоночника; Умеренная активность заболевания; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к умеренным нарушениям функций организма | 40 - 60 |
| 13.1.2.3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) | Выраженное нарушение функции суставов и/или энтезисов и/или позвоночника; умеренная или высокая активность заболевания; | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849</p> | <p>наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к выраженным нарушениям функций организма</p> | |
| 13.1.2.4 | | | | <p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы</p> | <p>Значительно выраженное нарушение функции суставов и/или энтезисов и/или позвоночника; вне зависимости от активности заболевания на фоне терапии; множественные эрозии суставов (более 5) остеонекрозов крупных суставов, при наличии</p> | 90 - 100 | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|-------------------------------------|---|--|---------|
| | | | | | <p>крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849</p> | <p>осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к значительно выраженным нарушениям функций организма. Отсутствие ответа на терапию</p> | |
| 13.1.3 | | | <p>Подагра Болезнь отложения кристаллов пирофосфата кальция дигидрата</p> | <p>M10 M11</p> | | | |
| 13.1.3.1 | | | | | <p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой</p> | <p>Отсутствие или незначительное нарушение функции суставов; отсутствие тофусов; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии</p> | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | | |
| 13.1.3.2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной | Умеренное нарушение функции суставов; Хроническое течение артрита; тофусная форма (подкожные тофусы); наличие осложнений заболевания и/или проводимой медикаментозной терапии, приводящей к умеренным нарушениям функций организма | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | <p>функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849</p> | | |
| 13.1.3.3 | | | | | <p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440</p> | <p>Выраженное нарушение функции суставов; хроническое течение артрита; тофусная форма (подкожные и внутрикостные тофусы); наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к выраженным нарушениям функций организма</p> | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|----------|
| | | | | | - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | | |
| 13.1.3.4 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | Значительно выраженное нарушение функции суставов; Хроническое течение артрита; тофусная форма (множественные внутрикостные тофусы, с поражением крупных суставов); наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к значительно выраженным нарушениям функций организма | 90 - 100 |

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|---------|------------|---|---|--|---------|
| 13.1.4 | | | Артрозы | M15 M19 | - | | | |
| 13.1.4.1 | | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | Нарушение функции суставов; НФС 1; рентгенологическая стадия I - II; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии | 10 - 30 |
| 13.1.4.2 | | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и | Умеренное нарушение функции суставов; НФС II; | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639 В 810 - 849 | с рентгенологическая стадия II - III; наличие осложнений заболевания и/или от проводимой терапии, приводящей к умеренным нарушениям функций организма | |
| 13.1.4.3 | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, | Выраженное нарушение функции суставов; НФС III; Генерализованная форма заболевания; рентгенологическая стадия III - IV; наличие осложнений заболевания и/или от проводимой терапии, | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---|----------|
| | | | | | сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | приводящей к выраженным нарушениям функций организма | |
| 13.1.4.4 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, | Значительно выраженное нарушение функции суставов; НФС - IV; генерализованная форма заболевания; рентгенологическая стадия III - IV; наличие осложнений заболевания и/или от проводимой терапии, приводящей к значительным нарушениям функций организма | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|---|------------|---|--|--|
| | | | | | мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | | |
| 13.2. | | Системные поражения соединительной ткани | | M30 M36 | - | | |
| 13.2.1 | | | Системная красная волчанка | M32 | | | |
| | | | Дерматополимиозит | M33 | | | |
| | | | Болезнь Бехчета | M35.2 | | | |
| | | | Системные васкулиты | M30 | | | |
| | | | Гранулематоз Вегенера | M31.4 | | | |
| | | | Гигантоклеточный артериит ревматической полимиалгией. | M31.5 | | | |
| | | | Сухой синдром | M35.0 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|-------|--|---|---------|
| | | | (Шегрена) Диффузный эозинофильный фасциит | M35.4 | | | |
| | | | Рецидивирующий панникулит Вебера-Крисчена | M35.6 | | | |
| | | | Другие уточненные системные поражения соединительной ткани | M35.8 | | | |
| 13.2.1.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с | Ремиссия или низкая активность заболевания без нарастания активности заболевания; отсутствие повреждения органов и систем организма вследствие заболевания; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | | |
| 13.2.1.2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, | Умеренная активность заболевания; прогрессирование заболевания; склонность к генерализации; с вовлечением в процесс внутренних органов и систем организма, приводящей к умеренным нарушениям функций организма | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|----------|
| | | | | | В 610 - 639, В 810 - 849 | | |
| 13.2.1.3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | Высокая активность заболевания; быстрое прогрессирование заболевания; склонность к генерализации; вовлечение в процесс органов и систем организма; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к выраженным нарушениям функций организма | 70 - 80 |
| 13.2.1.4 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и | Высокая активность заболевания; быстрое прогрессирование | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|----------------------------|---------------------|---|---|---------|
| | | | | | связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | заболевания; склонность к генерализации; наличие повреждения органов и систем вследствие заболевания; наличие жизнеугрожающих осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к значительно выраженным нарушениям функций организма | |
| 13.2.2 | | | Системная красная волчанка | M32 | | | |
| 13.2.2.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) | Низкая активность заболевания; отсутствие признаков повреждения органов и систем организма вследствие заболевания; | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849</p> | <p>отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии</p> | |
| 13.2.2.2 | | | | <p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы</p> | <p>Средняя активность заболевания; наличие повреждения органов и систем организма вследствие заболевания, наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к умеренным нарушениям функций организма</p> | 40 - 60 | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | | |
| 13.2.2.3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций | Высокая активность заболевания; наличие повреждения органов и систем вследствие заболевания, наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к выраженным нарушениям функций организма | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|--|----------|
| | | | | | кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | | |
| 13.2.2.4 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В | Прогрессирующее течение заболевания; Высокая активность заболевания, наличие полиорганных нарушений органов и систем организма вследствие заболевания; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к значительно выраженным нарушениям функций организма | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|---|---|---|---------|
| | | | | | 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | | |
| 13.2.3 | | | Дерматополимиозит Юношеский дерматомиозит Другие дерматомиозиты Полимиозит Дерматополимиозит неуточненный | M33 M33.0 M33.1 M33.2 M33.9 | | | |
| 13.2.3.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций | Незначительная степень нарушения функции пораженных органов и систем организма, вызванных заболеванием, активность процесса I степени | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | <p>кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849</p> | | |
| 13.2.3.2 | | | | | <p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В</p> | <p>Умеренная активность процесса, с поражением органов и систем организма, наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к умеренным нарушениям функций организма</p> | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | | |
| 13.2.3.3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | Высокая активность процесса, с поражением органов и систем организма, наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к выраженным нарушениям функций организма | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|-----------------------------------|-----------------------|--|--|----------|
| 13.2.3.4 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | Нарушения функции пораженных органов и систем организма, независимо от активности заболевания, наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящей к значительным нарушениям функций организма | 90 - 100 |
| 13.2.4 | | | Системный склероз, склеродермия | M34 | | | |
| | | | Прогрессирующий системный склероз | M34.0 | | | |
| | | | Синдром CREST | M34.1 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|---|---|--|---------|
| | | | <p>Системный склероз, вызванный лекарственными средствами и химическими соединениями</p> <p>Другие формы системного склероза</p> <p>Системный склероз неуточненный</p> <p>Другие системные поражения соединительной ткани</p> <p>Другие перекрестные синдромы</p> <p>Диффузный (эозинофильный) фасциит</p> | <p>M34.2</p> <p>M34.8</p> <p>M34.9</p> <p>M35</p> <p>M35.1</p> <p>M35.4</p> | | | |
| 13.2.4.1 | | | | | <p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций,</p> | <p>Очень ранняя стадия заболевания;</p> <p>Отсутствие активности; незначительное поражение кожи; синдром Рейно без дигитальных трофических</p> | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849</p> | <p>нарушений; отсутствие поражения внутренних органов; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии</p> | |
| 13.2.4.2 | | | | <p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной</p> | <p>Начальная стадия заболевания; низкая активность заболевания, с повреждением органов и систем организма, приводящим к умеренным нарушениям функций организма; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии</p> | 40 - 60 | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | | |
| 13.2.4.3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; | Стадия развернутых клинических проявлений заболевания; умеренная активность заболевания, с повреждением органов и систем организма, наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящие к выраженным нарушениям функций организма | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|----------------------------------|--|---|----------|
| | | | | | МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | | |
| 13.2.4.4 | | | | | | Терминальная стадия вне зависимости от активности заболевания, с повреждением органов и систем организма, наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящие к значительно выраженным нарушениям функций организма | 90 - 100 |
| 13.2.5 | | | Спондилопатии Анкилозирующий спондилит Другие воспалительные спондилопатии. | M45 M48 M45 M46 | - | | |

КонсультантПлюс: примечание.
 В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду код МКБ-10 M46.8, а не M48.6.

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|-------|---|--|---------|
| | | | Другие уточненные воспалительные спондилопатии | M48.6 | | | |
| 13.2.5.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Незначительное нарушение функции организма; незначительное нарушение функции позвоночника и/или суставов; отсутствие или низкая степень активности заболевания; ФК I; отсутствие внескелетных проявлений заболевания; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии | 10 - 30 |
| 13.2.5.2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций | Умеренное нарушение функции позвоночника и/или суставов, при сохраняющейся умеренной или высокой степени активности заболевания; ФК II; наличие внескелетных | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849</p> | <p>проявлений заболевания с умеренными нарушениями функций организма; отсутствие осложнений заболевания и/или проводимой терапии</p> | |
| 13.2.5.3 | | | | <p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной</p> | <p>Выраженное нарушение функции позвоночника и/или суставов, при сохраняющейся умеренной или высокой активности заболевания; ФК III; наличие внескелетных проявлений заболевания; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии; приводящие к</p> | 70 - 80 | |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | выраженным нарушением функций организма | |
| 13.2.5.4 | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; функций кожи и связанных с ней систем; | Значительно выраженные нарушения функции организма, значительно выраженные нарушения функции позвоночника/суставов; ФК IV; наличие внескелетных проявлений заболевания; наличие осложнений заболевания и/или проводимой терапии, приводящие к значительно выраженным нарушениям функций организма | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|--|------------|--|--|--|
| | | | | | МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 849 | | |
| 13.3 | | Дорсопатии | | M40 M54 | - | | |
| <p>Примечание к подпункту 13.3. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений статодинамической функции организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных дорсопатиями основывается на оценке клинико-функциональных проявлений заболевания и данных рентгенологического обследования степени деформации (сколиоз, кифосколиоз), ограничения подвижности позвоночника, нарушения функции других органов и систем организма (костно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем), выраженности вторичного дегенеративно-дистрофического поражения позвоночника, наличия неврологической симптоматики. Учитываются также результаты хирургической коррекции, ее эффективность, осложнения, сопутствующие заболевания.</p> | | | | | | | |
| 13.3.1 | | | Деформирующие дорсопатии | M40 M43 | - | | |
| | | | Сколиоз | M41 | | | |
| | | | Остеохондроз позвоночника. | M42 | | | |
| | | | Другие деформирующие дорсопатии | M43 | | | |
| | | | Поражение межпозвоночных дисков шейного отдела | M50 M54 | - | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 13.3.1.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 729, В 750 - 789 | Сколиоз и кифосколиоз II - III степени с незначительными ограничениями подвижности позвоночника. Отсутствие нарушений функций внутренних органов | 10 - 30 |
| 13.3.1.2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, пищеварительной системы; мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 729, В 750 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 610 - 639 | Сколиоз и кифосколиоз III - IV степени с умеренным ограничением подвижности позвоночника, деформацией грудной клетки, при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма. Состояние после реконструктивных операций с протяженной фиксацией не менее двух отделов позвоночника | 40 - 60 |
| 13.3.1.3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением | Сколиоз и кифосколиоз IV степени с выраженным ограничением подвижности | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------|---|----------------|--|--|---------|
| | | | | | (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, пищеварительной системы; мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 610 - 639 | позвоночника, с грубой деформацией грудной клетки, при наличии выраженных нарушений функций внутренних органов | |
| 13.4 | | Остеопатии и хондропатии | | M80 - M94 - | | | |
| | | Нарушение плотности кости | | M80 - M85 - | | | |
| 13.4.1 | | | Остеопороз патологическим переломом с | M80 | | | |
| | | | Остеопороз патологического перелома без | M81 | | | |
| 13.4.1.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) | Отсутствие переломов длинных трубчатых костей. Отсутствие деформаций или имеют место незначительные (менее | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710 - 729, В 750 - 789, В 540 - 559 | 7 - 10°) деформации оси конечности/или позвоночника, без нарушения или с незначительным нарушением их функций. Z-критерий соответствует остеопении или остеопорозу. Лабораторные показатели фосфорно-кальциевого обмена с незначительными отклонениями. Rg-признаки остеопороза отсутствуют | |
| 13.4.1.2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710 - 729, В 750 - 789, В 540 - 559 | Патологические переломы длинных трубчатых костей 1 раз в 2 - 3 года с длительным сроком консолидации, деформацией оси конечности более 10°, но менее 20°; вторичная деформация оси позвоночника (сколиоз II и III степени), Z-критерий | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | | соответствует тяжелому остеопорозу. Лабораторные показатели фосфорно-кальциевого обмена - умеренные изменения. Выявляются начальные Rg-признаки остеопороза | |
| 13.4.1.3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710 - 729, В 750 - 789, В 540 - 559 | Патологические переломы длинных трубчатых костей более 1 раза в год, спонтанные переломы. Длительные сроки консолидации. Выраженная (20° и более) деформация оси конечности, возникновение ложных суставов, вторичная деформация оси позвоночника с умеренным нарушением их функций. Z-критерий соответствует тяжелому остеопорозу (очень высокий риск переломов). Лабораторные показатели фосфорно-кальциевого | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---------------------------|-----|--|---|----------|
| | | | | | | обмена - умеренные, выраженные и значительно выраженные изменения | |
| 13.4.1.4 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710 - 729, В 750 - 789, В 540 - 559 | Возникновение спонтанного перелома длинных трубчатых костей при незначительных двигательных и физических нагрузках, включая вес собственного тела. Невозможность вертикализации из-за высокого риска возникновения спонтанного перелома | 90 - 100 |
| 13.4.2 | | | Остеомиелит (хронический) | M86 | | | |
| 13.4.2.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических), системы крови и иммунной системы, функций кожи и связанных с ней систем; | Редкие обострения (1 раз в год и реже), непродолжительные (менее 3 недель) | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | МКФ: В 710 - 789, В 430 - 439, В 810 - 849 | | |
| 13.4.2.2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических), системы крови и иммунной системы, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789; В 430 - 439; В 810 - 849 | Обострения свищевой формы остеомиелита средней частоты (до 2 раз в год), средней продолжительности (не менее 4 недель) | 40 - 60 |
| 13.4.2.3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, пищеварительной системы, нарушение мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В | Рецидивирующий остеомиелит: обострения частые (3 - 4 раза в год), длительные (более 4 недель). Формирование умеренных или выраженных контрактур в смежных суставах. Наличие осложнений | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|-------------|-----|---|---|---------|
| | | | | | 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 610 - В 639, В 810 - 849 | | |
| 13.4.3 | | | Остеонекроз | M87 | | | |
| 13.4.3.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789 | Односторонний некроз головки бедра в III - IV, рентгенологической стадии с НФС III степени в пораженном суставе (исход в деформирующий артроз) | 40 - 60 |
| 13.4.3.2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789 | Односторонний и двусторонний некроз головки бедра во II рентгенологической стадии (остеонекроза и остеолизиса) на период иммобилизации | 70 - 80 |
| 13.5 | | | Эндопротезы | | | | |
| 13.5.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789 | Состояние после одностороннего и двустороннего эндопротезирования тазобедренных и коленных суставов; без осложнений эндопротезирования | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|---|---------|
| 13.5.2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789 | Осложнения эндопротезирования с умеренными нарушениями функции организма | 40 - 60 |
| 13.5.3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ - В 710 - 789 | Осложнения эндопротезирования с выраженными нарушениями функции организма | 70 - 80 |
| 14 | Болезни мочеполово й системы (класс XIV) и патология с поражением преимуществ венно органов мочеполово й системы, представлен ная в других классах болезней | | | | | | |

Примечание к [пункту 14](#).

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений мочевыделительной функции организма граждан в возрасте 18 лет и старше, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается преимущественно на оценке степени выраженности нарушения функции почек в соответствии с классификацией хронической болезни почек (далее - ХБП). В основе стратификации стадий ХБП лежит уровень СКФ. Учитываются также и другие факторы патологического процесса: форма и тяжесть течения заболевания, наличие и частота обострений, распространенность патологического процесса, включение органов-мишеней, необходимость подавления иммунитета, наличие осложнений (вторичный пиелонефрит, мочекаменная болезнь и прочие).

| | | | | | | |
|------|--------------------------------------|------------|---|--|--|--|
| 14.1 | Гломерулярные болезни | N00 N08 | - | | | |
| | Тубулоинтерстициальные болезни почек | N10 N16 | - | | | |
| | Почечная недостаточность | N17 N19 | - | | | |
| | Мочекаменная болезнь | N20 N23 | - | | | |
| | Другие болезни почки и мочеточника | N25 N29 | - | | | |
| | Другие болезни мочевой системы | N30 - 39 | | | | |
| | Помощь, включающая | Z49 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--------------|---|--|---------|
| | | гемодиализ | | | | | |
| | | Приобретенное отсутствие почки | | Z90.5 | | | |
| | | Агенезия и другие редукционные дефекты почки | | Q60 N30.1 | | | |
| | | Интерстициальный цистит (хронический) | | N30.2 | | | |
| 14.1.1 | | | | | Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 610 - В 639 | ХБП 1 стадии, СКФ более 90 мл/мин/1,73 м ² ; ХБП 2 стадии, СКФ в пределах 89 - 60 мл/мин/1,73 м ХБП 3А стадии, СКФ 59 - 45 мл/мин/1,73 м ² | 10 - 30 |
| 14.1.2 | | | | | Нарушения мочевыделительной функции, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 610 - 639, В | ХБП 3Б стадии, СКФ 44 - 30 мл/мин/1,73 м ² . Нефротический/нефритический синдромы при неэффективности лечения с умеренно | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|---|---|----------|
| | | | | | 430 - 439 | выраженными нарушениями функций организма | |
| 14.1.3 | | | | | Нарушения мочевыделительной функции, функций системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой системы, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 430 - 439, В 540 - 559, В 410 - 429; В 440 - 449 | ХБП 4 стадии, СКФ 29 - 15 мл/мин/1,73 м ² , подготовка к диализу. ХБП 5 стадии (СКФ ниже 15 мл/мин/1,73 м ²) при отсутствии осложнений диализа | 70 - 80 |
| 14.1.4 | | | | | Нарушения мочевыделительной функции, функций системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой системы, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 430 - 439, В 540 - 559, В 410 - 429; В 440 - 449 | ХБП 5 стадии, СКФ ниже 15 мл/мин/1,73 м ² , при наличии осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|-----------------------------------|-------|--|--|----------|
| 14.2 | | | Наличие трансплантированной почки | Z94.0 | | | |
| 14.2.1 | | | | | Нарушение мочевыделительной системы, нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559 | При первичном освидетельствовании - состояние после трансплантации почки | 90 - 100 |
| 14.2.2 | | | | | Нарушения мочевыделительной функции, нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, | По истечении 2-летнего срока после трансплантации почки | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|---|---|----------|
| | | | | | В 198, В 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559 | | |
| 14.2.3 | | | | | Нарушения мочевыделительной системы, нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559 | По истечении 2-летнего срока после трансплантации почки при наличии осложнений с выраженными нарушениями функций организма | 70 - 80 |
| 14.2.4 | | | | | Нарушения мочевыделительной системы, нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, | По истечении 2-летнего срока после трансплантации почки при наличии осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|-------|--|---|---------|
| | | | | | В 198, В 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559 | | |
| 14.3 | | | Приобретенное отсутствие почки. | Z90.5 | | | |
| | | | Агенезия и другие редуccionные дефекты почки | Q60 | | | |
| 14.3.1 | | | | | Нарушения мочевыделительной функции, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 610 - 639, В 430 - 439 | Отсутствие нарушений или незначительные нарушения мочевыделительной функции единственной почки (проявления ХБП 1, 2 стадии) | 10 - 30 |
| 14.3.2 | | | | | Нарушения мочевыделительной функции, функций системы крови и иммунной системы МКФ: В 610 - 639, В 430 - 439 | Умеренные нарушения мочевыделительной функции единственной почки (проявления ХБП 3 стадии) | 40 - 60 |
| 14.3.3 | | | | | Нарушения мочевыделительной функции, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 610 - 639, В 430 - 439 | Выраженные нарушения мочевыделительной функции единственной почки (проявления ХБП 4 стадии) | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|--------|---|--|--|--|--|--|----------|
| 14.3.4 | | | | | Нарушения мочевыделительной функции, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 610 - 639, В 430 - 439 | Значительно выраженные нарушения мочевыделительной функции единственной почки (проявления ХБП 5 стадии) | 90 - 100 |
| 14.4 | | | Врожденные аномалии (пороки развития) половых органов. Агенезия и аплазия матки. Врожденное отсутствие влагалища | Q50 - Q56 Q51.0 Q52.0 | | | |
| 14.4.1 | | | | | Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 610 - 639; В 640 - 679 | Агенезия и аплазия матки, врожденное отсутствие влагалища, без пластической операции, после достижения 14 - летнего возраста | 30 |
| 15 | Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|---|---|--------------------|---|---|---------|
| | причин (класс XIX), а также отдельные состояния, возникающи е в перинатальн ом периоде (Болезни класса XVI) | | | | | | |
| 15.1 | | Термические и химические ожоги глаза и других внутренних органов | | T26 T28 | - | | |
| 15.1.1 | | | Термический ожог пищевода Химический ожог пищевода | T28.1 T28.6 | | | |
| 15.1.1.1 | | | | | Нарушения функции пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559 | Последствия ожога пищевода с рубцовым сужением пищевода II степени после проведенного лечения с затруднением прохождения только твердой пищи, без потери массы тела | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---|----------|
| 15.1.1.2 | | | | | Нарушения функции пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559 | Последствия ожога пищевода с рубцовым сужением пищевода III степени (субкомпенсация) с необходимостью планового бужирования. Наличие искусственного пищевода с умеренным нарушением функций пищеварительной системы | 40 - 60 |
| 15.1.1.3 | | | | | Нарушения функции пищеварительной, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 440 - 449 | Последствия ожога пищевода с рубцовым сужением пищевода III степени и выше (декомпенсация) с нарушением приема пищи (зондовое питание, наличие гастростомы и питание через нее); наличие осложнений (свищи) с выраженными нарушениями функций организма | 70 - 80 |
| 15.1.1.4 | | | | | Нарушения функции пищеварительной, дыхательной, эндокринной систем и | Декомпенсация пищеварения (кахексия); неустранимые тяжелые | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---|-------|---|---|--|
| | | | | | метаболизма МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 440 - 449 | последствия болезни; неэффективность многоэтапных реконструктивно-восста новительных хирургических вмешательств | |
| 15.1.2 | | Последствия термических и химических ожогов и отморожений | | T95 | | | |
| 15.1.2.1 | | | Последствия термических и химических ожогов и отморожений | T95 | | | |
| | | | Последствия термического и химического ожога и отморожения головы и шеи | T95.0 | | | |
| | | | Последствия термического и химического ожога и отморожения туловища | T95.1 | | | |
| | | | Последствия термического и химического ожога и отморожения | T95.2 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|-------|--|--|---------|
| | | | верхней конечности Последствия термического и химического ожога и отморожения нижней конечности | T95.3 | | | |
| 15.1.2.2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639, В 810 - 849 | Последствия термических поражений III степени на ограниченных участках туловища и конечностей с вовлечением одного-двух смежных суставов ("стягивающие рубцы") и формированием умеренной контрактуры в функционально выгодном положении | 10 - 30 |
| 15.1.2.3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, | Последствия термических поражений III степени с вовлечением одного-двух смежных суставов ("стягивающие рубцы") и формированием выраженной контрактуры в функционально | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | пищеварительной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639, В 810 - 849 | невыгодном положении. Наличие осложнений с умеренными нарушениями функций организма | |
| 15.1.2.4 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639, В 810 - 849 | Последствия термических поражений III степени с вовлечением 2 и более суставов ("стягивающие рубцы") и формированием резко выраженных контрактур и/или анкилозов в функционально невыгодном положении. Наличие осложнений с выраженными нарушениями функций организма | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------|---|--------------------|---|---|----------|
| 15.1.2.5 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 210 - 299, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639, В 810 - 849 | Последствия распространенных термических поражений III степени и виде множественных порочных установок крупных суставов и ригидных деформаций скелета. Наличие осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма | 90 - 100 |
| 15.1.3 | | Последствия травм головы | | T90 | | | |
| 15.1.3.1 | | | Последствия открытого ранения головы Последствия перелома черепа и костей лица | T90.1 T90.2 | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|-----|--|---|---------|
| 15.1.3.1 .1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Дефект костей черепа размером 3 х 3 см и менее с пластикой и без нее | 10 - 30 |
| 15.1.3.1 .2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Дефект костей черепа размером более 3 х 3 см при наличии пульсации с ТМО в области дефекта | 40 - 60 |
| 15.1.3.1 .3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Значительный дефект костей черепа размером 10 х 10 см и более | 70 - 80 |
| 15.1.4 | | Последствия травм шеи и туловища | | T91 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---|---------|
| 15.1.4.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Последствия неосложненных переломов с позвоночника с незначительным или умеренным ограничением объема движений позвоночника, без неврологической симптоматики. Наличие стабильной металлоконструкции небольшой протяженности (в пределах одного отдела позвоночника) | 10 - 30 |
| 15.1.4.2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения мочевыделительной функции, функций пищеварительной системы; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 610 - 639, В 510 - 539 | Последствия осложненных переломов с позвоночника с наличием неврологической симптоматики, достигающей умеренной степени, нестабильность металлоконструкции любой протяженности после проведенного оперативного лечения | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|----------------|---|---|----------|
| 15.1.4.3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 610 - 639 | Последствия осложненных переломов с позвоночника с выраженной неврологической симптоматикой | 70 - 80 |
| 15.1.4.4 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 610 - 639 | Последствия осложненных переломов с позвоночника с полным анатомическим прерыванием спинного мозга, со значительно выраженной неврологической симптоматикой, нарушением функции тазовых органов | 90 - 100 |
| 15.1.5 | | | Последствия травм верхней конечности Дефекты, | T92 Q71 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | | укорачивающие верхнюю конечность | | | | |
| Последствия травм плечевого сустава | | | | | | | |
| 15.1.5.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Ограничение движения плечевого сустава, включая плечевой пояс (отведение и/или сгибание плеча от 90° до 120° с соответствующим ограничением отведения и ротационных движений). Нестабильность одного плечевого сустава, включая редкие вывихи плеча. Псевдоартроз плечевой кости стабильный. Анкилоз плечевого сустава в функционально выгодном положении (угол отведения 45°, при сгибании руки до 30 - 45°) при хорошо подвижном плечевом поясе | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---|----------|
| 15.1.5.2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Нестабильность плечевого сустава тяжелой степени, включая "болтающийся" сустав (тяжелый дефект проксимального отдела плеча). Псевдоартроз нестабильный плечевой кости. Культя верхней конечности на уровне плеча или в локтевом суставе | 40 - 60 |
| 15.1.5.3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Культя плеча после вычленения с частью плечевого пояса | 70 - 80 |
| 15.1.5.4 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В | Двусторонние культы верхних конечностей на любом уровне (плечо, предплечье, кисть) | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | 798, В 799 | | |
| Последствия травм локтевого сустава | | | | | | | |
| 15.1.5.5 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Ограничение движения в локтевом суставе незначительная степень (разгибание/сгибание до 0 - 30 - 120° при неограниченной ротации предплечья). Анкилоз локтевого сустава в функционально выгодном положении (сгибание 70° - 110°, пронация 0 - 10°). Анкилоз проксимального лучелоктевого сустава с установкой предплечья в функционально выгодном или невыгодном положении. Псевдоартроз костей предплечья стабильный (локтевой или лучевой кости, или обеих костей с тугоподвижностью) | 10 - 30 |
| 15.1.5.6 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с | Анкилоз обеих локтевых суставов в функционально невыгодном положении. | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | | движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Анкилоз проксимального лучелоктевого сустава с установкой предплечья в функционально невыгодном положении "Болтающийся" локтевой сустав. Культи верхней конечности на уровне предплечья или кисти | |
| 15.1.5.7 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Анкилоз обоих локтевых суставов в функционально невыгодном положении | 70 - 80 |
| 15.1.5.8 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Двусторонние культи верхних конечностей на любом уровне (плечо, предплечье, кисть) | 90 - 100 |

| Последствия травм лучезапястного сустава | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|---------|
| 15.1.5.9 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Ограничение подвижности кистевого сустава, незначительная/умеренн ая степень (разгибание/сгибание до 30 - 40°) одностороннее/двусторо нное. Анкилоз одного кистевого сустава в функционально выгодном (разгибание 15°) или невыгодном положении | 10 - 30 |
| 15.1.5.1 0 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Ограничение подвижности в обоих кистевых суставах выраженной степени. Анкилоз обоих кистевых суставов в функционально невыгодном положении | 40 - 60 |
| Последствия травм пальцев кистей рук | | | | | | | |
| 15.1.5.1 1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с | Отсутствие дистальной фаланги и части основной первого пальца кисти. | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Отсутствие первого пальца кисти, в том числе с первым лучом кисти. Отсутствие одного трехфалангового пальца кисти, в том числе с соответствующей пястной костью. Отсутствие двух или трех (исключая первый) трехфаланговых пальцев кисти. Отсутствие одного или двух пальцев (любых, включая I) на одной кисти | |
| 15.1.5.1 2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Отсутствие двух трехфаланговых пальцев кисти с отсутствием первого пальца. Отсутствие трех трехфаланговых пальцев кисти с отсутствием первого пальца. Отсутствие первых пальцев обеих кистей. Отсутствие всех пальцев одной кисти. Полное отсутствие всех трехфаланговых | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|----------------|--|--|----------|
| | | | | | | пальцев одной кисти | |
| 15.1.5.1 3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Отсутствие всех трехфаланговых пальцев с сохраненными II - V пястными костями на обеих кистях | 70 - 80 |
| 15.1.5.1 4 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Отсутствие всех пальцев обеих кистей | 90 - 100 |
| 15.1.6 | | | Последствия травм нижней конечности Дефекты, укорачивающие нижнюю конечность | T93 Q72 | | | |
| Последствия травм тазобедренного сустава, культы на уровне бедра | | | | | | | |
| 15.1.6.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с | Ограничение движения в тазобедренных суставах: одностороннее | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | незначительной/умеренной степени или двустороннее незначительной степени | |
| 15.1.6.2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Ограничение движения в тазобедренных суставах: выраженной степени одного или умеренной степени в обоих, Культи одной нижней конечности, пригодная для типичного протезирования | 40 - 60 |
| 15.1.6.3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Ограничение движения выраженной степени обоих тазобедренных суставов. Культи одной нижней конечности на любом уровне бедра при ампуточной культе другой нижней конечности на уровне голени. Двусторонние ампуточные культи на уровне нижней и средней трети бедер. Двусторонние ампуточные культи | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|--|----------|
| | | | | | | на уровне голени и стоп | |
| 15.1.6.4 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Анкилоз обоих тазобедренных суставов в функционально невыгодном положении со значительно выраженным нарушением статодинамической функции. Культи обеих нижних конечностей на уровне верхней трети бедер | 90 - 100 |
| Последствия травм коленного сустава | | | | | | | |
| 15.1.6.5 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Ограничение движения в одном или обоих коленных суставах незначительной/умеренной степени. Анкилоз коленного сустава в функционально выгодном положении (положение сгибания от 10 - 15°) | 10 - 30 |
| 15.1.6.6 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с | Анкилоз обоих коленных суставов в функционально невыгодном положении | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | <p>движением (статодинамических) функций МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799</p> | <p>с умеренными нарушениями статодинамических функций. Культи одной нижней конечности на любом уровне голени при опороспособности и подвижности другой нижней конечности</p> | |
| 15.1.6.7 | | | | | <p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799</p> | <p>Анкилоз обоих коленных суставов в функционально невыгодном положении с выраженными нарушениями статодинамических функций. Культи одной нижней конечности на любом уровне голени при частичной потере опороспособности и подвижности другой нижней конечности. Культи обеих нижних конечностей на любом уровне голени</p> | 70 - 80 |
| <p>Последствия травм голеностопного сустава, пальцев ног, стоп, культи стоп</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 15.1.6.8 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, 799 | Анкилоз голеностопного сустава и в функционально выгодном/невыгодном положении (сгибание/разгибание 0° - 5°) одно- или двустороннее. Анкилоз пальцев одной или обеих стоп в функционально выгодном положении или деформация пальцев одной или обеих стоп. Культя стопы односторонняя: по Лисфранку; в области плюсневых костей по Шарпу. Отсутствие всех пальцев обеих стоп | 10 - 30 |
| 15.1.6.9 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Культя стопы односторонняя: по Пирогову; по Шопару. Культи обеих стоп: по Лисфранку, Шарпу II - III | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|---|-----|--|---|---------|
| 15.1.6.1 0 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Культя обеих стоп: по Пирогову | 70 - 80 |
| 15.1.7 | | | Последствия травм, захватывающих несколько областей тела | T94 | | | |
| 15.1.7.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Отсутствие обеих верхних конечностей на любом уровне (кистей, предплечий, плеч). Отсутствие одной верхней конечности и отсутствие одной нижней конечности вне зависимости от стороны поражения. Культя одной верхней конечности на любом уровне плеча и культя одной нижней конечности на любом уровне бедра вне зависимости от стороны поражения. Культи обеих верхних и | 100 |

| | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|-----|---|--|--------|---------|
| | | | | | | обеих конечностей | нижних | |
| 15.1.8 | | Перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника и костей таза (отдаленные последствия) | | T94 | | | | |
| 15.1.8.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 610 - 639 | Стабильное тазовое кольцо, дегенеративные изменения крестцово-подвздошны х суставов с незначительными нарушениями функций организма | | 10 - 30 |
| 15.1.8.2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций | Деформации тазового кольца, осложненные повреждением тазовых органов (уретры, мочевого пузыря, прямой кишки) с умеренными | | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539; В 610 - 639 | нарушениями функций организма | |
| 15.1.8.3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 610 - 639 | Деформации тазового кольца, осложненные повреждением тазовых органов (уретры, мочевого пузыря, прямой кишки) с выраженными нарушениями функций организма | 70 - 80 |

Приложение N 2
к классификациям и критериям,
используемым при осуществлении
медико-социальной экспертизы
федеральными государственными
учреждениями медико-социальной
экспертизы, утвержденным приказом
Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от 27 августа 2019 г. N 585н

**КОЛИЧЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА
ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ СТОЙКИХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ
ОРГАНИЗМА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТРАВМ ИЛИ ДЕФЕКТАМИ
(В ПРОЦЕНТАХ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКЕ СТОЙКИХ НАРУШЕНИЙ ФУНКЦИЙ
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА)**

Сокращения слов, используемых в настоящем приложении:

АХЭП - антихолинэстеразные препараты;

БЦЖ - вакцина против туберкулеза, приготовленная из штамма ослабленной живой туберкулезной палочки;

БЭН - белково-энергетическая недостаточность;

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека;

ВК - врачебная комиссия;

ВРВ - варикозно расширенные вены;

ВРВП - варикозно расширенные вены пищевода;

ДН - дыхательная недостаточность;

ИФР - инсулиноподобный фактор роста;

ИМТ - индекс массы тела;

МБТ - микобактерии туберкулеза;

МКФ - Международная классификация функционирования, ограничений

жизнедеятельности и здоровья;

МПКТ - минеральная плотность костной ткани;

МРТ - магнитно-резонансная томография;

НПВП - нестероидные противовоспалительные препараты;

НЯК - неспецифический язвенный колит;

ОНР - общее недоразвитие речи;

ПГ - портальная гипертензия;

ПИТРС - препараты, изменяющие течение рассеянного склероза;

ПНД - психоневрологический диспансер;

ПТФБ - посттромбофлебитическая болезнь;

СНР - системное недоразвитие речи;

СТГ - соматотропный гормон;

ТМО - твердая мозговая оболочка;

ФА - фенилаланин;

ФК - функциональный класс;

ФКУ - фенилкетонурия;

ХАН - хроническая артериальная недостаточность;

ХБП - хроническая болезнь почек;

ХВН - хроническая венозная недостаточность;

ХДН - хроническая дыхательная недостаточность;

ХЕ - хлебная единица;

ХСН - хроническая сердечная недостаточность;

ЦНС - центральная нервная система.

| N п/п | Классы болезней (по МКБ-10) | Блоки болезней (по МКБ-10) | Наименования болезней, травм или дефектов и их последствия | Рубрика МКБ-10 (код) | Виды стойких расстройств функций организма ребенка в возрасте до 18 лет. Рубрика МКФ | Клинико-функциональная характеристика стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами | Количественная оценка (%) |
|---|---|----------------------------|---|----------------------|--|--|---------------------------|
| 1 | Некоторые инфекционные и паразитарные болезни (класс I) | | | A00 - B99 | | | |
| <p>Примечание к пункту 1.</p> <p>Количественная оценка степени нарушений функции организма ребенка в возрасте до 18 лет (дыхательной, сердечно-сосудистой, других систем организма) при туберкулезе различной локализации зависит от клинической формы заболевания, рентгенологической стадии, периода и фазы процесса, наличия (отсутствия) выделения микобактерии туберкулеза (МБТ+ или МБТ- соответственно), течения заболевания (осложненного и неосложненного), характера и вида осложнений (в том числе от проводимой химиотерапии), а также от эффективности проводимого лечения и формирования резистентности к нему.</p> | | | | | | | |
| 1.1 | | | Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически или гистологически | A15 A16 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 1.1.1 | | | | | Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 440 - 449, В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные нарушения функции дыхательной системы при эффективном окончании основного курса лечения, в периоде потери активности (рубцевание, обызвествление) без признаков бактериовыделения (МБТ-), без остаточных изменений и осложнений. Отсутствие дыхательной недостаточности или ДН I степени | 10 - 30 |
| 1.1.2 | | | | | Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 440 - 449, В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения функции дыхательной системы при отсутствии положительной клинико-рентгенологической динамики на фоне химиотерапии; при сохранении бактериовыделения | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | | (МБТ+) в периоде потери активности; и/или при наличии остаточных изменений после излеченного туберкулеза органов дыхания (локальный пневмофиброз, фиброзно-очаговые изменения). С ДН II степени, преходящей или постоянной легочной гипертензией (ХСН 0 или ХСН I стадии). Наличие МБТ+ 6 и более месяцев | |
| 1.1.3 | | | | | Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 440 - 449, В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения функции дыхательной системы при неэффективности химиотерапии; при сохранении бактериовыделения (МБТ+) в периоде потери активности; и/или при наличии остаточных изменений после излеченного туберкулеза (пневмосклероз, цирроз, | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|---|---------------------|--|--|----------|
| | | | | | | бронхоэктазы) и осложнений. Наличие ДН II, III степени и ХСН IIА стадии | |
| 1.1.4 | | | | | Нарушения функций дыхательной системы, сердечно-сосудистой системы, пищеварительной системы; МКФ: В 440 - 449, В 410 - 429, В 510 - 539 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженные нарушения функций организма вследствие наличия полиорганных осложнений (амилоидоз, полисерозиты, кахексия и так далее). Наличие ДН III степени и ХСН IIБ или III стадии | 90 - 100 |
| 1.2 | | | Туберкулез нервной системы | A17 | | | |
| | | | Туберкулез других органов | A18 | | | |
| | | | Милиарный (диссеминированный, генерализованный) туберкулез легких | A19 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 1.2.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные нарушения функций организма вследствие проявлений туберкулеза различной локализации в периоде потери активности (рубцевание, обызвествление; МБТ-); при эффективном окончании основного курса лечения. Отсутствие дыхательной недостаточности или наличие ДН I степени | 10 - 30 |
| 1.2.2 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения функций организма вследствие проявлений туберкулеза различной | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | <p>связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899</p> | <p>с локализации (МБТ+ или МБТ-) и /или осложнений. Наличие ДН II степени, преходящая или постоянная легочная гипертензия (ХСН 0 или ХСН I стадии)</p> | |
| 1.2.3 | | | | <p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой,</p> | <p>Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения функций организма вследствие проявлений туберкулеза различной локализации (МБТ+ или МБТ-) и/или осложнений. Проявления множественной или широкой лекарственной</p> | 70 - 80 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | <p>дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899</p> | <p>устойчивости к микобактериям туберкулеза. Наличие ДН II, III степени, ХСН ПА стадии</p> | |
| 1.2.4 | | | | <p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции</p> | <p>Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженные нарушения функций организма вследствие проявлений туберкулеза различной локализации с полиорганными осложнениями (амилоидоз, полисерозиты, кахексия и прочее); Неэффективность или резистентность к терапии. Наличие ДН III степени и ХСН IIБ или III</p> | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|-------------------------|------------|--|--|---------|
| | | | | | кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899 | стадии | |
| 1.3 | | | Последствия туберкулеза | В90 | | | |
| 1.3.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной локализации и неуточненного туберкулеза (фиброзные, фиброзно-очаговые, буллезно-дистрофические изменения, плевропневмосклероз, пневмоцирроз, последствия хирургических вмешательств и прочее, | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899 | МБТ-) при отсутствии дыхательной недостаточности либо наличии ДН I стадии | |
| 1.3.2 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной локализации и неуточненного туберкулеза (фиброзные, фиброзно-очаговые, буллезно-дистрофические изменения, плевропневмосклероз, пневмоцирроз, последствия хирургических вмешательств, и прочее, МБТ-). Наличие ДН II степени, преходящая или постоянная легочная гипертензия (ХСН 0 | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899 | или ХСН 1 стадии) | |
| 1.3.3 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной локализации и неуточненного туберкулеза (фиброзные, фиброзно-очаговые, распространенные буллезно-дистрофические изменения, плевропневмосклероз, пневмоцирроз, последствия хирургических вмешательств и прочее, МБТ-). Наличие ДН II III степени, ХСН ПА стадии | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|-------|--|---------------------------------------|--|-----|--|--|----------|
| 1.3.4 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженные нарушения функций организма вследствие отдаленных проявлений последствий излеченного туберкулеза различной локализации и неуточненного туберкулеза (распространенные фиброзные, фиброзно-очаговые, буллезно-дистрофические изменения, значительной протяженности плевропневмосклероз, пневмоцирроз, последствия хирургических вмешательств и прочее, МБТ-). Наличие ДН III степени, ХСН IIB или III стадии | 90 - 100 |
| 1.4 | | Осложнения после введения вакцины БЦЖ | | Y58 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|-------|---|--|---------|
| 1.4.1 | | | Ятрогенный туберкулезный остит (БЦЖ-остит) | Y58.0 | | | |
| 1.4.1.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 710 - 799, В 430 - 439 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после завершения лечения при наличии незначительных нарушений функций организма | 10 - 30 |
| 1.4.1.2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 710 - 799, В 430 - 439 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после завершения лечения при наличии умеренных нарушений функций организма; 0 - 7 лет: на период длительного (более 6 месяцев) лечения, включающего специфическую противотуберкулезную терапию двумя и более препаратами | 40 - 60 |
| 1.4.1.3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после завершения | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|---|-----------------------|--|---|---------|
| | | | | | связанных с движением (статодинамических) функций; функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 710 - 799, В 430 - 439 | лечения при наличии выраженных нарушений функций организма | |
| 1.5 | | | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) Бессимптомный инфекционный статус | B20 B24 Z21 | - | | |
| 1.5.1 | | | | | Нарушения функции системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: бессимптомный инфекционный статус, вызванный вирусом иммунодефицита человека. ВИЧ-инфекция: стадия 3 (субклиническая); стадия 4А (вторичных заболеваний), фаза ремиссии (спонтанная, после АРТ, на фоне АРТ). Отсутствие или | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | незначительные нарушения функций организма | |
| 1.5.2 | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ВИЧ-инфекция: стадия 4А (вторичных заболеваний), фаза прогрессирования. Умеренные нарушения функций организма | 40 - 60 |
| 1.5.3 | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ВИЧ-инфекция: стадия 4Б (вторичных заболеваний) | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|----------|
| | | | | | связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199 | независимо от фазы заболевания. Выраженные нарушения функций организма | |
| 1.5.4 | | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ВИЧ-инфекция: стадия 4В (вторичных заболеваний) независимо от фазы заболевания; терминальная стадия. Значительно выраженные нарушения функций организма | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|------------|---|--|--|
| | | | | | системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199 | | |
| 2 | Новообразования (класс II) | | | C00 D48 | - | | |

Примечание к [пункту 2](#).

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при злокачественных новообразованиях зависит от клинико-морфологических факторов прогноза; локализации и размера опухоли (до 2 см, от 2 до 5 см, 5 см и более); анатомической формы роста (эндофитная, экзофитная, смешанная); темпа роста опухоли, степени прорастания стенки органа (степень инвазии); гистологического варианта и степени дифференцировки опухоли (высокодифференцированная, средней степени дифференцировки, низкодифференцированная, недифференцированная); наличия и распространенности поражения лимфатических узлов; наличия или отсутствия отдаленных метастазов (в лимфатические узлы или другие органы); стадии опухолевого процесса (клиническая классификация по системе TNMG до лечения, классификация pTNM - по результатам хирургического вмешательства и/или гистологического исследования). Количественная оценка нарушенных функций организма при опухолях эмбриональной и герминогенной природы, лимфогрануломатозе и других основывается как на классификации TNMG, так и на Международной системе стадирования, одобренной Международным обществом детских онкологов (SIOP - International Society of Pediatric Oncology): INSS (1993) при нейробластоме; PRETEXT и POSTTEXT (2017) при гепатобластоме; ABC (2001) при ретинобластоме; SIOP (1992) при нефробластоме; FIGO (1988) при герминогенной опухоли яичников; Lugano - для герминогенных опухолей яичек; Ann-Arbor (1971) при лимфогрануломатозе; PNHLS (2015) - для неходжинских лимфом. Также необходимо учитывать стадию заболевания до и после оперативного вмешательства, до и после проведения неoadьювантной химиотерапии; оценку гистологического типа опухоли. При количественной оценке степени выраженности нарушенных функций большое значение имеет наличие генетических маркеров, определяющих неблагоприятный онкопрогноз: амплификация гена N-MYC и делеция короткого плеча первой хромосомы (нейробластома); мутация гена RB1 (ретинобластома); мутация генов WT1, WT2 и WT3 (нефробластома); наличие изохромосомы i в 12p (герминогенная опухоль) и

прочее - по результатам молекулярно-генетического исследования. Учитываются также общебиологические факторы (пол, возраст, соматический фон), вид и объем лечения (химиотерапия, гормонотерапия, хирургическое лечение, лучевая терапия, перфузия противоопухолевыми препаратами, различные комбинации видов лечения), наличие осложнений как самого заболевания, так и проводимого лечения.

| | | | | | | | |
|-------|--|---------------------------------|--|------------|--|---|---------|
| 2.1 | | Злокачественные новообразования | | C00 C97 | - | | |
| 2.1.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при первичном освидетельствовании с любым видом и формой злокачественного новообразования с учетом классификации по системе TNMG (и/или по международной системе стадирования) на весь период лечения при отсутствии осложнений и наличии положительного результата от проводимого лечения | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---|---|----------|
| | | | | | МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899 | | |
| 2.1.2 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при первичном освидетельствовании с любым видом и формой злокачественного новообразования с учетом классификации по системе TNMG (и/или по международной системе стадирования) на весь период лечения при наличии осложнений; при резистентности опухоли к комбинированному лечению или его неэффективности | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899 | | |
| 2.1.3 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после завершения лечения и достижения стойкой ремиссии (5 лет и более) с благоприятным онкопрогнозом | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899 | | |
| 2.1.4 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после завершения лечения при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | В 810 - 899 | | |
| 2.1.5 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: в период проведения лечения и после завершения его при наличии осложнений с выраженными нарушениями функций организма | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|----------|
| 2.1.6 | | | | | <p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899</p> | <p>Для детей в возрасте 0 - 17 лет: в период проведения лечения и после завершения его при наличии рецидива, метастазов, продолженного роста опухоли после радикального лечения и других осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма</p> | 90 - 100 |
|-------|--|--|--|--|--|--|----------|

Примечание к подпунктам 2.1.3 - 2.1.6.

При повторном освидетельствовании количественная оценка нарушенных функций организма ребенка в возрасте до 18 лет проводится с учетом эффективности проведенного лечения, наличия ремиссии или возникновения рецидивов, метастазов, осложнений, продолженного роста опухоли после радикального лечения, наличия противопоказаний к оперативному лечению и возможности проведения только паллиативного вмешательства, а также с учетом неэффективности проводимой терапии (химиотерапия, лучевая терапия и их комбинации).

| | | | | | | | |
|-----|--|--|-----------------------------------|------------|---|--|--|
| 2.2 | | | Доброкачественные новообразования | D00 D48 | - | | |
|-----|--|--|-----------------------------------|------------|---|--|--|

Примечание к подпункту 2.2.

Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при доброкачественных новообразованиях зависит от локализации и размера опухоли, темпа роста опухоли, гормональной активности, наличия рецидива или продолженного роста после удаления, степени влияния на близлежащие органы (сдавление, смещение); возможности радикального удаления, результатов проведенной операции (осложнение, дефицит структур, нарушение функции органа), гистологической структуры опухоли. Маркером неблагоприятного клинического и реабилитационного прогноза являются опухоли внутричерепной локализации с быстрым ростом, вызывающие сдавление и дислокацию ствола мозга; неэффективность лечения (продолженный рост опухоли), невозможность хирургического лечения.

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 2.2.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: доброкачественные опухоли различной локализации при: небольших размерах или отсутствии роста (медленном росте), опухоли без влияния на функцию смежных структур и/или органов; гормонально неактивные опухоли; опухоли после проведенного | 10 - 30 |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------|

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899 | радикального оперативного лечения при отсутствии признаков рецидива или продолженного роста опухоли | |
| 2.2.2 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: доброкачественные опухоли различной локализации при: больших размерах опухоли с влиянием на положение и функцию смежных органов, требующих оперативного лечения; при быстром росте опухоли с появлением влияния на положение и функцию смежных органов и невозможности радикального ее устранения (возможность лишь | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899 | частичного удаления); гормонально активные опухоли, приводящие к умеренным нарушениям функций организма; после проведенного оперативного лечения (радикального или нерадикального) при наличии умеренных нарушений функций организма | |
| 2.2.3 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: доброкачественные опухоли различной локализации (преимущественно головного и спинного мозга) при: быстром росте опухоли с выраженным влиянием на положение и функцию смежных органов и невозможности радикального ее удаления; гормонально активные опухоли, приводящие к выраженным нарушениям функций | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|----------|
| | | | | | ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 899 | организма; после проведенного оперативного лечения (радикального или нерадикального) при наличии продолженного роста опухоли; при наличии выраженных нарушений функций организма | |
| 2.2.4 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; функции кожи и связанных с | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженные нарушения функций организма, невозможность радикального оперативного лечения или после проведенного оперативного лечения | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------|--|--|--|
| | | | | | ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639, В 810 - 849, В 898 - 899 | | |
| 3 | Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм (класс III), и патология других органов и систем организма, вовлекающая иммунный механизм, и представленная в других классах болезней | | | D50 D89 | - | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------|---|---|---------|
| <p>Примечание к пункту 3. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный механизм, зависит от вида и тяжести течения заболевания (по данным клинико-лабораторного обследования), частоты и тяжести кризов, наличия и вида кровоизлияний во внутренние органы, а также в полости крупных суставов (некритические или жизнеугрожающие), от поражения органов-мишеней, вида, объема и эффективности проводимого лечения (в том числе от регулярного применения стимуляторов гемопоэза, переливания компонентов крови или трансплантации костного мозга), резистентности к проводимой терапии; наличия осложнений (в том числе от проводимой терапии), от степени нарушения функции других органов и систем организма, прогноза заболевания.</p> | | | | | | | |
| 3.1 | | Другие болезни крови и кроветворных органов | | D70 D77 | - | | |
| 3.1.1 | | | Гипоспленизм (аспления послеоперационная, атрофия селезенки) Врожденные аномалии селезенки (аспления) | D73.0 Q89.0 | | | |
| 3.1.1.1 | | | | | Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные нарушения функций организма при отсутствии селезенки | 10 - 30 |
| 3.1.1.2 | | | | | Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: наличие рецидивирующих | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---------------|-----|---|--|---------|
| | | | | | | инфекционных заболеваний, приводящих к осложнениям с умеренными нарушениями функций организма | |
| 3.1.2 | | | Агранулоцитоз | D70 | | | |
| 3.1.2.1 | | | | | Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при отсутствии осложнений после проведенного эффективного лечения и достижения стойкой длительной ремиссии | 10 - 30 |
| 3.1.2.2 | | | | | Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: рецидивирующее течение заболевания, наличие инфекционных осложнений с умеренными нарушениями функций организма на фоне постоянной базисной терапии | 40 - 60 |
| 3.1.2.3 | | | | | Нарушение функций системы крови и иммунной системы; | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: рецидивирующее | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---------|--|---|--|----------------------------------|---|--|----------|
| | | | | | МКФ: В 430 - 439 | течение заболевания, наличие инфекционных осложнений с выраженными нарушениями функций организма на фоне постоянной базисной терапии | |
| 3.1.2.4 | | | | | Нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: рецидивирующее тяжелое течение заболевания, наличие инфекционных осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма на фоне постоянной базисной терапии. Необходимость трансплантации гемопоэтических стволовых клеток | 90 - 100 |
| 3.2 | | Гемолитическ е анемии Серповидно-кл еточные нарушения Другие | | D55 D59 D57 D61 | - | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------|--|-----|--|--|---------|
| | | апластические анемии | | | | | |
| | | Другие анемии | | D64 | | | |
| 3.2.1 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: нетяжелая степень апластической анемии (отсутствие необходимости в регулярных трансфузиях эритроцитарной массы и/или тромбоконцентрата); легкая форма гемолитической анемии (гемолитических кризов нет или они редкие, с интервалом в несколько лет); длительная ремиссия после спленэктомии по поводу гемолитической анемии; при серповидно-клеточных нарушениях - редкие (не чаще 2 раз в месяц) болевые кризы, купируемые НПВП (общий режим) | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|---|---------|
| 3.2.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: тяжелая степень апластической анемии, гемолитическая анемия средней тяжести (наличие гемолитических кризов средней частоты - 1 - 2 раза в год) на фоне постоянной базисной терапии с развитием анемии, требующей заместительной терапии, направленной на стабилизацию гемоглобина; при серповидно-клеточных нарушениях - частые (еженедельные) болевые кризы, купируемые ненаркотическими анальгетиками, требующие соблюдения домашнего режима или обращений за неотложной помощью | 40 - 60 |
| 3.2.3 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: сверхтяжелая степень апластической анемии; | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|--|-------|---|---|----------|
| | | | | | дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, нарушение психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199 | тяжелая форма гемолитической анемии (частые гемолитические кризы - более 2 раз в год); наличие осложнений заболевания и проводимого постоянного базисного лечения; при серповидно-клеточных нарушениях - частые (еженедельные) болевые кризы, купируемые анальгетиками (включая наркотические) и/или требующие госпитализации | |
| 3.3 | | | Наличие другого трансплантированного органа или ткани (костного мозга) | Z94.8 | | | |
| Первичное освидетельствование | | | | | | | |
| 3.3.1 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после трансплантации костного мозга на срок 5 лет (период лечения) | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199 | | |
| Повторное освидетельствование (через 5 лет после трансплантации костного мозга) | | | | | | | |
| 3.3.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|---|----------|
| 3.3.3 | | | | | Нарушения функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии осложнений с выраженными нарушениями функций организма | 70 - 80 |
| 3.3.4 | | | | | Нарушения функции системы крови и иммунной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|------------|--|--|--|
| | | | | | В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199 | | |
| 3.4 | | Нарушения свертываемости и крови, пурпура и другие геморрагические состояния | | D65 D69 | - | | |
| <p>Примечание к подпункту 3.4. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных геморрагической коагулопатией, тромбоцитопатией и пурпурой, основывается на оценке тяжести заболевания, которая коррелирует с частотой и объемом заместительной терапии, частотой и разновидностью кровотечений, а также с эффективностью проводимой терапии.</p> | | | | | | | |
| 3.4.1 | | | Наследственный дефицит фактора VIII (гемофилия А) | D66 | | | |
| | | | Наследственный дефицит фактора IX (гемофилия В) | D67 | | | |
| | | | Болезнь Виллебранда | D68.0 | | | |
| | | | Наследственный дефицит фактора XI (гемофилия С) | D68.1 | | | |
| | | | Наследственный дефицит фактора I | D68.2 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------------------------|--|--|--|
| | | | <p>(фибриногена); наследственный дефицит фактора II (гипопротромбинем ия); наследственный дефицит фактора V (лабильного); наследственный дефицит фактора VII (стабильного); наследственный дефицит фактора X (Стюарта-Прауэра);</p> <p>наследственный дефицит фактора XII (Хагемана); наследственный дефицит фактора XIII (фибринстабилизи рующего); дисфибриногемия (врожденная), гипопротромбинем ия; Болезнь Оврена</p> <p>Геморрагические нарушения, обусловленные циркулирующими в крови</p> | <p>D68.3</p> <p>D68.3</p> | | | |
|--|--|--|---|---------------------------|--|--|--|

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---|-------|---|---|---------|
| | | | антикоагулянтами Ингибиторы к факторам свертывания крови Приобретенный дефицит фактора свертывания Различные комбинации врожденного дефицита II, VII, IX и X факторов свертывания | D68.4 | | | |
| 3.4.1.1 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: легкая форма заболевания при отсутствии кровотечений либо с редкими (не более 1 раза в год) кровотечениями, требующими обращения в медицинскую организацию, не требующих заместительной терапии и/или не приводящими к развитию анемии; отсутствие кровоизлияний в | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | | <p>суставы и/или мышцы/внутренние органы; нерегулярное использование концентратов факторов свертывания крови и/или препаратов крови с профилактической целью (при оперативных вмешательствах или травмах). Для гемофилии А и В - минимальная степень активности факторов свертывания VIII/IX 5% и более</p> | |
| 3.4.1.2 | | | | | <p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы,</p> | <p>Для детей в возрасте 0 - 17 лет: легкая и среднетяжелая форма заболевания с редкими (не более 3 раз в год) кровотечениями, требующими заместительной терапии и/или с развитием анемии; кровоизлияния в суставы и/или мышцы/внутренние органы не более 1 раза в год. Для гемофилии А и В -</p> | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199 | минимальная степень активности факторов свертывания VIII/IX от 2 до 5% | |
| 3.4.1.3 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: среднетяжелая и тяжелая форма заболеваний с частыми повторными (от 1 до 6 раз в год) кровотечениями, требующими заместительной терапии и госпитализации; кровоизлияния в суставы и/или мышцы/внутренние органы не более 2 - 3 раз в год. Наличие гемофилической артропатии 1 и более крупных суставов; наличие умеренной/выраженной контрактуры одного крупного сустава. | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|---|----------|
| | | | | | | Для гемофилии А и В - минимальная степень активности факторов свертывания VIII/IX менее 1 - 2%. Регулярное использование концентратов факторов свертывания крови и/или препаратов крови с профилактической целью | |
| 3.4.1.4 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: тяжелые формы заболеваний с частыми повторными (6 и более раз в год) кровотечениями, со склонностью к частым (более 3 раз в год) тяжелым кровотечениям (в том числе спонтанным) на фоне постоянной терапии; кровоизлияния в суставы и/или мышцы более 3 раз в год и/или кровоизлияния во внутренние органы более 2 раз в год, и/или любой эпизод | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|---|--|---|---|--|
| | | | | | В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199 | внутричерепного кровоизлияния и/или повторные эпизоды почечных кровотечений. Для гемофилии А и В - минимальная степень активности факторов свертывания VIII/IX менее 1%. Наличие ингибиторной гемофилии с титром ингибитора > 0,6 БЕ | |
| 3.4.2 | | | Качественные дефекты тромбоцитов: тромбастения, болезнь Гланцманна, болезнь Бернара-Сулье, синдром Скотта, дефицит/дефект мобилизации пулов хранения тромбоцитов, дефект сигнальных путей тромбоцитов, другие формы. Другие первичные тромбоцитопении МҮН9-ассоциирова | D69.1 D69.4 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|---|---------|
| | | | <p>нная тромбоцитопения, семейная тромбоцитопения с предрасположеннос тью к миелодисплазии, синдром "серых" тромбоцитов, средиземноморская макротромбоцитопе ния и другие</p> | | | | |
| 3.4.2.1 | | | | | <p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439; В 710 - 789, В 410 - 429,</p> | <p>Для детей в возрасте 0 - 17 лет: легкая форма заболевания при отсутствии кровотечений либо с редкими (не более 1 раза в год) кровотечениями, требующими обращения в медицинскую организацию; не требующих заместительной терапии и/или не приводящими к развитию анемии; отсутствие кровоизлияний в суставы и/или мышцы/внутренние</p> | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199 | органы; нерегулярное использование концентратов факторов свертывания крови и/или препаратов крови с профилактической целью (при оперативных вмешательствах или травмах); для гемофилии А и В - активность факторов свертывания VIII/IX более 5% (учитывается минимальная степень активности факторов свертывания VIII/IX) | |
| 3.4.2.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: легкая и среднетяжелая форма заболевания с редкими (не более 3 раз в год) кровотечениями, требующих заместительной терапии и/или с развитием анемии; кровоизлияния в суставы и/или мышцы/внутренние органы не более 1 раза в год; для гемофилии А и | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | <p>мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439; В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199</p> | <p>В - активность факторов свертывания VIII/IX от 2 до 5% (учитывается минимальная степень активности факторов свертывания VIII/IX)</p> | |
| 3.4.2.3 | | | | <p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439; В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199</p> | <p>Для детей в возрасте 0 - 17 лет: среднетяжелая и тяжелая форма заболеваний с повторными (более 1 до 6 раз в год) кровотечениями, требующими заместительной терапии и/или госпитализации; кровоизлияния в суставы и/или мышцы/внутренние органы не более 2 - 3 раз в год; наличие хронического синовита и/или артропатии одного крупного сустава; для гемофилии А и В - активность факторов свертывания VIII/IX 1 - 2% (учитывается</p> | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|----------|
| | | | | | | минимальная степень активности факторов свертывания VIII/IX); регулярное использование концентратов факторов свертывания крови и/или препаратов крови с профилактической и гемостатической целью | |
| 3.4.2.4 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439; В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: тяжелые формы заболеваний с частыми повторными (6 и более раз в год) кровотечениями, со склонностью к частым (более 3 раз в год) тяжелым кровотечениям (в том числе спонтанным); кровоизлияния в суставы и/или мышцы более 3 раз в год и/или кровоизлияния во внутренние органы более 2 раз в год, и/или любой эпизод внутричерепного кровоизлияния и/или повторные эпизоды почечных | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|---|-------|--------------------|---|--|
| | | | | | - 639, В 110 - 199 | <p>кровотечений; признаки хронического синовита и/или артропатии более чем одного крупного сустава; для гемофилии А и В - активность факторов свертывания VIII/IX менее 1% (учитывается минимальная степень активности факторов свертывания VIII/IX); наличие ингибиторной гемофилии с титром ингибитора > 0,6 БЕ</p> | |
| 3.4.3 | | | <p>Первичная тромбофилия дефицит Антитромбина носительство FV Leiden (аномалия фактора V-мутация Лейдена); мутация гена протромбина FII G20210A; недостаточность антитромбина, протеинов С и S</p> <p>Другая тромбофилия;</p> | D68.5 | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|---|---------|
| | | | синдром антикардиолипина, антифосфолипидный синдром, наличие волчаночного антикоагулянта | | | | |
| 3.4.3.1 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439; В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: легкая форма заболевания при отсутствии тромбоза в анамнезе, требующая первичной фармакологической антитромботической профилактики только в ситуациях присоединившегося высокого тромботического риска (тяжелый инфекционный процесс, крупные хирургические вмешательства и прочее) | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|---------|
| 3.4.3.2 | | | | <p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439; В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199</p> | <p>Для детей в возрасте 0 - 17 лет: среднетяжелая форма заболевания с однократным случаем спровоцированного тромбоза (не идиопатический тромбоз), не приводящая к развитию ПТФБ, требующая курса вторичной фармакологической профилактики</p> | 40 - 60 |
| 3.4.3.3 | | | | <p>Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций</p> | <p>Для детей в возрасте 0 - 17 лет: тяжелая форма заболевания с повторными спровоцированными тромбозами (не более 2-х случаев) или с 1 случаем не</p> | 70 - 80 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|---|---|----------|
| | | | | сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439; В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199 | спровоцированного тромбоза (идиопатический вариант); требующая курса вторичной профилактики. Дефицит протеина C/S/антитромбина от 12 до 50% у детей в возрасте старше 1 года | |
| 3.4.3.4 | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: тяжелая и крайне тяжелая форма заболевания с более чем 2 случаями спровоцированного тромбоза (не идиопатический тромбоз) и/или более чем с 1 случаем идиопатического тромбоза, и/или с 2 и более случаями тромбоза сосудов ЦНС, внутренних органов, тромбоэмболии легочной артерии вне | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---|------------------|---|--|---------|
| | | | | | функций; МКФ: В 430 - 439; В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199 | зависимости от наличия/отсутствия видимой причины для тромбоза; значительно выраженные нарушения функций организма. Дефицит протеина C/S антитромбина менее 12% у детей в возрасте старше 1 года | |
| 3.4.4 | | | Пурпура и другие геморрагические состояния Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура | D69 D69.3 | | | |
| 3.4.4.1 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: легкая форма заболевания (снижение тромбоцитов от 30 000 до 50 000/мкл), лечение преимущественно в амбулаторных условиях | 10 - 30 |
| 3.4.4.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: среднетяжелая форма заболевания (стойкое снижение тромбоцитов от 20 000 до 30 000/мкл) с необходимостью | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | стационарного лечения, применения гормональной, цитостатической терапии, терапии агонистами тромбоцитиновых рецепторов (далее - ТПО) и/или необходимости переливания компонентов крови реже 1 раза в месяц | |
| 3.4.4.3 | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: тяжелая форма заболевания (стойкое снижение тромбоцитов от 10 000 до 20 000/мкл) с необходимостью стационарного лечения, применения гормональной, цитостатической терапии, терапии агонистами ТПО и/или необходимости переливания компонентов крови не реже 1 раза в месяц; наличие кровоизлияний во внутренние органы | 70 - 80 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|----------|
| | | | | 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199 | | |
| 3.4.4.4 | | | | Нарушение функции системы крови и иммунной системы; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 710 - 789, В 410 - 429, В 440 - 449, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: тяжелая форма заболевания, стойкое снижение тромбоцитов менее 10 000/мкл с необходимостью стационарного лечения, применения гормональной, цитостатической терапии или терапии агонистами ТПО длительно (до 6 месяцев и более) и/или необходимостью переливания компонентов крови чаще 1 раза в 1 месяц; кровоизлияния во внутренние органы, спонтанные кровотечения, опасные для жизни | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|--|---------|
| 3.5 | | Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм | | D80 D89 | - | | |
| 3.5.1 | | | Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител Комбинированные иммунодефициты Иммунодефициты, связанные с другими значительными дефектами Обычный переменный иммунодефицит Другие иммунодефициты Дефект в системе комплемента | D80 D81 D82 D83 D84 D84.1 | | | |
| 3.5.1.1 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 430 - 439 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: без клинической симптоматики или с редкими (до 3 - 4 раз в | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | год), недлительными (10 - 14 дней) инфекционными заболеваниями различной этиологии, поддающимися базисной терапии; минимальные изменения данных лабораторно-иммунологического обследования (согласно заключению иммунолога). Отсутствие осложнений или осложнения с незначительными нарушениями функций организма | |
| 3.5.1.2 | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 610 - | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: наличие инфекционных осложнений с умеренными нарушениями функций организма на фоне постоянной базисной терапии | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|---------|---|--|--|-----------|---|---|---------|
| | | | | | 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199 | | |
| 3.5.1.3 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: наличие инфекционных осложнений с выраженными нарушениями функций организма на фоне постоянной базисной терапии | 70 - 80 |
| 4 | Болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ (класс IV) и патология органов эндокринной системы, | | | E00 - E90 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---|--------------------|---|--|---------|
| | представлен ная в других классах | | | | | | |
| <p>Примечание к пункту 4. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при болезнях эндокринной системы, расстройствах питания и нарушениях обмена веществ зависит от характера и степени выраженности клинической симптоматики заболевания, результатов клинических и инструментальных методов исследования, а также возможности компенсации нарушенных функций с применением современных методов лечения и реабилитации. Особенностью эндокринной патологии детского возраста является компенсация на фоне своевременно начатой заместительной терапии, но в то же время, склонность к хроническому прогрессирующему течению эндокринопатий при отсутствии компенсации на фоне заместительной терапии, что вызывает стойкое нарушение функций организма, нарушение физического, полового и психомоторного развития ребенка уже на ранних сроках развития (до 3 лет).</p> | | | | | | | |
| 4.1 | | Болезни щитовидной железы | | E00 E07 | - | | |
| 4.1.1 | | | Врожденный гипотиреоз с диффузным зобом Врожденный гипотиреоз без зоба | E03.0 E03.1 | | | |
| 4.1.1.1 | | | | | Нарушения психических, речевых и языковых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные нарушения психических и других функций организма на фоне адекватной заместительной терапии: 0 - 3 года: | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, 399; В 710 - 789, В 798, В 799, В 540 - 559, В 410 - 429 | незначительное отставание физического, психомоторного и раннего речевого развития; 4 - 15 лет: IQ = 70 - 79 баллов (детский, WPPSI или WISC); 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов (взрослый WAIS) | |
| 4.1.1.2 | | | | Нарушения психических, речевых и языковых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, 399; В 710 - 789, В 798, В 799, В 540 - 559, В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения психических и других функций организма на фоне адекватной заместительной терапии: 0 - 3 года: умеренное отставание физического, психомоторного и раннего речевого развития; 4 - 15 лет: IQ = 55 - 69 баллов (детский, WPPSI или WISC); 16 - 17 лет: IQ = 55 - 64 баллов (взрослый WAIS) | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|----------|
| 4.1.1.3 | | | | <p>Нарушения психических, речевых и языковых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, 399; В 710 - 789, В 798, В 799, В 540 - 559, В 410 - 429</p> | <p>Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения психических и других функций организма на фоне адекватной заместительной терапии: 0 - 3 года: выраженное отставание физического, психомоторного и раннего речевого развития 4 - 17 лет: IQ = 35 - 55 баллов)</p> | 70 - 80 |
| 4.1.1.4 | | | | <p>Нарушения психических, речевых и языковых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой</p> | <p>Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженные нарушения психических и других функций организма на фоне адекватной заместительной терапии: 0 - 3 года: значительно выраженное отставание физического, психомоторного и</p> | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------|----------------------------------|------------|---|--|---------|
| | | | | | системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, 399; В 710 - 789, В 798, В 799, В 540 - 559, В 410 - 429 | раннего речевого развития, 4 - 17 лет: IQ < 35 баллов | |
| 4.2 | | Сахарный диабет | | E10 E14 | - | | |
| <p>Примечание к подпункту 4.2. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных сахарным диабетом 1 типа (далее - СД) в детском возрасте, учитывает длительность и характер течения заболевания в различные возрастные периоды, лабильность течения, наличие осложнений, а также способность самостоятельно осуществлять контроль за течением и терапией заболевания, то есть подсчет хлебных единиц (ХЕ), оценку адекватности количества вводимого инсулина. технику введения инсулина, оценку потребности в инсулине короткого действия на 1 ХЕ в различное время суток с возможностью коррекции его дозы в зависимости от исходного уровня гликемии; обученность ребенка производить измерения уровня глюкозы при помощи глюкометра с последующим анализом зарегистрированных показателей (ведение дневника самоконтроля). Данные навыки оцениваются, исходя из уровня эмоционально-волевой зрелости, состояния когнитивных процессов и уровня интеллектуального развития ребенка (на основании заключения ВК медицинской организации с привлечением психолога, по показаниям - психиатра) и в среднем формируются при длительности заболевания не менее 3 лет.</p> | | | | | | | |
| 4.2.1 | | | Инсулинзависимый сахарный диабет | E10 | | | |
| 4.2.1.1 | | | | | Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии сформированного устойчивого самоконтроля за течением заболевания и | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | осуществлением терапии при компенсации сахарного диабета и/или при незначительном нарушении функции со стороны органов-мишеней и отсутствии осложнений | |
| 4.2.1.2 | | | | Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 899 | Для детей в возрасте 0 - 14 лет: при первичном освидетельствовании: впервые установленный диагноз; при повторном освидетельствовании: достижение полной или частичной эффективности проводимой терапии (адекватность инсулинотерапии, в том числе помповой), в возрастном периоде, в котором невозможен самостоятельный контроль за течением заболевания и осуществлением инсулинотерапии | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|---|---------|
| 4.2.1.3 | | | | | <p>Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 899</p> | <p>Для детей в возрасте 15 - 17 лет: при первичном освидетельствовании: впервые установленный диагноз; при повторном освидетельствовании при наличии одного или нескольких показателей: - лабильного течения диабета (колебания гликемии в пределах 10 ммоль/л и более в течение 10 дней по данным глюкометра), в том числе на фоне помповой инсулинотерапии; наличие 1 и более верифицированных осложнений при длительности заболевания 3 и более лет с незначительными нарушениями функций организма; верифицированного осложнения (осложнений) с умеренными нарушениями функций организма:</p> | 40 - 60 |
|---------|--|--|--|--|--|---|---------|

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | при отсутствии сформированного устойчивого самоконтроля за течением заболевания и осуществлением терапии при длительности заболевания не менее 3 лет (по заключению ВК медицинской организации) | |
| 4.2.1.4 | | | | Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 899 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при повторном освидетельствовании и при наличии верифицированного осложнения (осложнений) с выраженными нарушениями функций организма | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---------|--|---|---|-------|--|--|---------|
| 4.3 | | Другие нарушения внутренней секреции поджелудочной железы | | E16 | | | |
| 4.3.1 | | | Другие формы гипогликемии (гиперинсулинизм) | E16.1 | | | |
| 4.3.1.1 | | | | | Нарушение психических, речевых и языковых функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 710 - 799, В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: редкие (2 - 3 раза в год) легкие гипогликемии при отсутствии или наличии незначительных нарушений функций организма; 0 - 3 года: незначительное нарушения физического, психомоторного, раннего речевого развития; 4 - 17 лет: незначительные когнитивные нарушения | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|---|---------|
| 4.3.1.2 | | | | | Нарушение психических, речевых и языковых функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 710 - 799, В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: гипогликемии средней частоты (1 - 2 раза в месяц) с развитием умеренных нарушений функций организма; 0 - 3 года: умеренное нарушение физического, психомоторного, раннего речевого развития; 4 - 17 лет: умеренные когнитивные нарушения | 40 - 60 |
| 4.3.1.3 | | | | | Нарушение психических, речевых и языковых функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 710 - 799, В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: частые тяжелые гипогликемии (более 2 раз в месяц), требующие помощи других лиц, с развитием выраженных нарушений функций организма. 0 - 3 года: выраженное нарушения физического, психомоторного, раннего речевого развития; 4 - 17 лет: выраженные | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|---|--------------|--|--|---------|
| | | | | | | когнитивные нарушения | |
| 4.4 | | Нарушения других эндокринных желез | | E20 E35 | - | | |
| 4.4.1 | | | Гипопаратиреоз Гипопаратироидизм, возникший после медицинских процедур | E20 E89.2 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 4.4.1. Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при гипопаратиреозе зависит от частоты и вида тетаний (судорожных сокращений скелетных мышц; дыхательных мышц и мышц желудочно-кишечного тракта), а также от степени выраженности изменений фосфорно-кальциевого обмена при измерении показателей в условиях стационара (содержание кальция - общего и ионизированного, фосфора и паратгормона в сыворотке крови; уровень кальция и фосфора в моче).</p> | | | | | | | |
| 4.4.1.1 | | | | | Нарушения психических, речевых и языковых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные нарушения функций организма на фоне постоянной заместительной терапии при наличии редких тетаний преимущественно скелетных мышц, отсутствие или наличие незначительных | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 540 - 559, В 610 - 639 | изменений показателей фосфорно-кальциевого обмена (при измерении в условиях стационара); 0 - 3 года: незначительное отставание физического, психомоторного, раннего речевого развития. | |
| 4.4.1.2 | | | | | Нарушения психических, речевых и языковых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 540 - 559, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения функций организма на фоне постоянной заместительной терапии при наличии частых тетаний различных мышечных групп (скелетных, дыхательных, мышц ЖКТ) и/или наличия умеренных изменений показателей фосфорно-кальциевого обмена (при измерении в условиях стационара); 0 - 3 года: умеренное отставание физического, психомоторного, раннего речевого | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | развития | | |
| 4.4.1.3 | | | | | <p>Нарушения психических, речевых и языковых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 540 - 559, В 610 - 639</p> | <p>Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения функций организма на фоне постоянной заместительной терапии при наличии частых тетаний различных мышечных групп (скелетных, дыхательных, мышц ЖКТ) и/или наличия выраженных и значительно выраженных изменений показателей фосфорно-кальциевого обмена (при измерении в условиях стационара); наличие резистентности к проводимой терапии активными метаболитами витамина D и их аналогами. 0 - 3 года: выраженное отставание физического, психомоторного, раннего речевого развития</p> | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----|---|---|---------|
| 4.4.2 | | | Гиперпаратиреоз и другие нарушения паращитовидных желез | E21 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 4.4.2. Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при гиперпаратиреозе зависит от нарушений функций опорно-двигательного аппарата (остеопороз, остеодистрофия, деформация костей, патологические переломы), и висцеральных нарушений.</p> | | | | | | | |
| 4.4.2.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 799, В 540 - 559, В 510 - 529, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные нарушения функций организма при отсутствии (или начальных проявлениях) клинико-лабораторных и рентгенологических признаков гиперпаратиреоза: Z-критерий соответствует остеопении или остеопорозу (от -1,0 до -2,0) и/или незначительные изменения показателей фосфорно-кальциевого обмена при отсутствии Rg-признаков гиперпаратиреоза; отсутствие переломов | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | длинных трубчатых костей; отсутствие костных деформаций или незначительные (в пределах 10°) деформации оси конечности или позвоночника без нарушения или с незначительным нарушением их функций; отсутствие или незначительные нарушения мочевыделительной системы и/или функции пищеварительной системы | |
| 4.4.2.2 | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций пищеварительной системы, мочевыделительной | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения функций организма при наличии клинико-лабораторных и рентгенологических признаков гиперпаратиреоза: Z-критерий соответствует тяжелому остеопорозу - (от -2,0 и менее с переломами) | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | функции; МКФ: В 710 - 799, В 540 - 559, В 510 - 529, В 610 - 639 | и/или наличие начальных Rg-признаков (кисты в трубчатых костях, субпериостальная резорбция концевых фаланг, снижение высоты тел позвонков) и/или наличие умеренных изменений показателей фосфорно-кальциевого обмена; патологические переломы до 1 раза в год, требующие лечения (в том числе оперативного); деформация оси конечности более 10°, но менее 20°, вторичная деформация оси позвоночника (сколиоз 2 и 3 степень) с умеренным нарушением их функций; умеренные нарушения мочевыделительной системы (наличие нефролитиаза с ХБП до 3 стадии); эпизоды язвенных поражений верхних отделов ЖКТ | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|---|---------|
| 4.4.2.3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 799, В 540 - 559, В 510 - 529, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения функций организма при наличии клинико-лабораторных и рентгенологических признаков гиперпаратиреоза: Z-критерий соответствует тяжелому остеопорозу - (от -2,0 и менее с множественными переломами) и/или наличие отчетливых Rg-признаков (кисти трубчатых костей, костей таза, компрессионные переломы тел позвонков) и/или наличие выраженных (или значительно выраженных) изменений показателей фосфорно-кальциевого обмена; частые спонтанные патологические переломы (более 1 раз в год), требующие лечения (в том числе - оперативного); | 70 - 80 |
|---------|--|--|--|--|--|---|---------|

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | выраженная (20° и более) деформация оси конечности, возникновение ложных суставов, вторичная деформация оси позвоночника с выраженным нарушением их функций; выраженные нарушения мочевыделительной системы (наличие нефролитиаза с ХБП 4 стадии); многократные эпизоды язвенных поражений верхних отделов ЖКТ | |
| 4.5 | | | <p>Гипопитуитаризм</p> <p>Преждевременное половое развитие</p> <p>Низкорослость, не классифицированная в других рубриках</p> <p>Низкорослость ахондропластическая, гипохондропластическая</p> <p>Спондилоэпифизарн</p> | <p>E23.0</p> <p>E22.8 E30.1</p> <p>E34.3</p> <p>Q77.4</p> <p>Q77.7</p> | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------------------|-------|---|---|---------|
| | | | ая дисплазия | | | | |
| | | | Болезнь Олье (энхондроматоз) | Q78.4 | | | |
| | | | Синдром Нунан | Q86.1 | | | |
| | | | Синдром Рассела-Сильвера | Q87.1 | | | |
| | | | Синдром Шерешевского-Тернера | Q96 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 4.5. Оценка физического развития и степень его задержки у детей проводится в соответствии с количеством стандартных отклонений (SDS роста) для соответствующего возраста и пола или по эпикризным срокам. Эпикризным сроком для возраста от 0 до 12 месяцев является 1 месяц, от 1 года до 2 лет - 3 месяца, от 2 до 3 лет - 6 месяцев, старше 3 лет - 1 год. После закрытия ростовых зон критерием установления категории "ребенок-инвалид" является оценка стандартных отклонений (SDS роста) для соответствующего возраста. При оценке низкорослости учитывается ее выраженность, а также нарушения функций органов и систем организма в случае наследственных синдромов с низкорослостью.</p> | | | | | | | |
| 4.5.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные нарушения функций организма: задержка роста от 2 до 3 SDS или 1 - 2 эпикризных срока до закрытия зон роста. После закрытия зон роста при достижении социально значимого роста | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 540 - 559, В 610 - 639 | | |
| 4.5.2 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 540 - 559, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения функций организма: задержка роста от 4 до 5 SDS или на 3 - 4 эпикризных срока при неэффективности заместительной терапии до закрытия зон роста. 14 - 17 лет: после закрытия зон роста социально значимый рост не достигнут | 40 - 60 |
| 4.5.3 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--------------------------|--|-------|---|--|---------|
| | | | | | сенсорных нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 540 - 559, В 610 - 639 | функций организма: задержка роста более 5 SDS или 5 и более эпикризных сроков при неэффективности заместительной терапии до закрытия зон роста. 14 - 17 лет: после закрытия зон роста социально значимый рост не достигнут | |
| 4.6 | | Гиперфункция гипофиза | | E22 | | | |
| 4.6.1 | | | Акромегалия и гипофизарный гигантизм | E22.0 | | | |
| 4.6.1.1 | | | | | Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: акромегалия (гипофизарный гигантизм) легкого течения с незначительными нарушениями функций | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | <p>функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 199, В 210 - 299, В 710 - 799, В 540 - 559, В 410 - 429</p> | <p>организма</p> | |
| 4.6.1.2 | | | | <p>Нарушения психических, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 199, В 210 - 299, В 710 - 799, В 540 - 559, В 410 - 429</p> | <p>Для детей в возрасте 0 - 17 лет: акромегалия (гипофизарный гигантизм) с умеренными нарушениями функций организма; при неэффективности оперативного лечения (невозможность радикального устранения) и сохранения после оперативного лечения повышенного уровня инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР); отсутствие снижения СТГ в ходе диагностического теста</p> | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|----------------------------------|-------|--|---|---------|
| 4.7 | | | Центральный несахарный диабет | E23.2 | | | |
| | | | Нефрогенный несахарный диабет | N25.1 | | | |
| 4.7.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 799, В 540 - 559, В 410 - 429, В 510 - 539, В 610 - 639, В 810 - 899 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: несахарный диабет (центральный или нефрогенный), компенсированный или субкомпенсированный на фоне проводимой терапии; тубулопатии с костными деформациями: варусная деформация нижних конечностей незначительной степени (до 10°). 0 - 3 года: незначительная задержка физического, психомоторного, раннего речевого развития | 10 - 30 |
| 4.7.2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения функций организма при декомпенсации | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | <p>(статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 799, В 540 - 559, В 410 - 429, В 510 - 539, В 610 - 639, В 810 - 899</p> | <p>несахарного диабета (центрального или нефрогенного) на фоне резистентности к терапии; тубулопатии с костными деформациями: деформация (варусная, вальгусная) нижних конечностей умеренной степени (более 10°, но менее 20°)</p> | |
| 4.7.3 | | | | <p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 799, В 540 - 559, В 410 - 429,</p> | <p>Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения функций организма при декомпенсации несахарного диабета (центрального или нефрогенного) на фоне резистентности к терапии; наличие осложнений; тубулопатии с костными деформациями, требующими оперативного лечения (на период его проведения)</p> | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|-----|--|---|---------|
| | | | | | В 510 - 539, В 610 - 639, В 810 - 899 | | |
| 4.8 | | | Синдром и болезнь Иценко-Кушинга вследствие аденомы гипофиза, надпочечников, при злокачественных опухолях различных органов, функциональный гиперкортицизм при различной эндокринной патологии, при приеме высоких доз глюкокортикоидов | E24 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 4.8. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных синдромом и болезнью Иценко-Кушинга, зависит от фазы заболевания (активная, неактивная), степени тяжести формы заболевания (легкая, средней тяжести, тяжелая форма), от наличия осложнений (миопатии, кардиомиопатия с проявлениями ХСН, стероидный диабет, остеопороз, аменорея, атрофия мышц, спонтанные переломы костей, нейроофтальмологические нарушения, гипертоническая первично-сморщенная почка, почечная недостаточность, органические поражения ЦНС, психические нарушения), а также от наличия злокачественных опухолей гипофиза, надпочечников и резистентности к проводимой терапии.</p> | | | | | | | |
| 4.8.1 | | | | | Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: легкая форма синдрома с отсутствием или незначительными нарушениями функций | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | | организма на фоне проводимой терапии. | |
| 4.8.2 | | | | | Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 710 - 799, В 540 - 559, В 410 - 429, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: гиперкортицизм средней тяжести синдрома без осложнений, с умеренными нарушениями функций организма на фоне проводимой терапии | 40 - 60 |
| 4.8.3 | | | | | Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: тяжелая форма синдрома с прогрессирующим течением на фоне проводимой терапии с осложнениями, в том числе от оперативного и/или лучевого лечения опухолей надпочечников или | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|--|--|---------|
| | | | | | мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 710 - 799, В 540 - 559, В 410 - 429, В 610 - 639 | гипофиза; наличие рецидива заболевания, приводящего к выраженным нарушениям функций организма | |
| 4.9 | | | Врожденные аденогенитальные нарушения, связанные дефицитом ферментов | E25.0 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 4.9. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при врожденном аденогенитальном синдроме зависит от формы заболевания (вирильная, сольтеряющая, гипертензивная форма), а также характера течения заболевания (риск развития жизнеугрожающих состояний).</p> | | | | | | | |
| 4.9.1 | | | | | Нарушения функции эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: вирильная форма | 10 - 30 |
| 4.9.2 | | | | | Нарушения функции эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: сольтеряющая форма: при отсутствии кризового течения (жизнеугрожающих состояний) на фоне постоянной заместительной терапии | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|-------------------------------|-------|--|---|---------|
| 4.9.3 | | | | | Нарушения функции эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: сольтеряющая форма: при наличии жизнеугрожающих состояний (кризов), верифицированных в условиях медицинской организации на фоне постоянной заместительной терапии | 40 - 60 |
| 4.9.4 | | | | | Нарушения функции эндокринной системы и метаболизма; сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 540 - 559, В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: гипертоническая форма | 40 - 60 |
| 4.10 | | | Гиперальдостеронизм-первичный | E26.0 | | | |
| 4.10.1 | | | | | Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 540 - 559, В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные нарушения функций организма на фоне проводимой терапии (в том числе хирургического вмешательства) | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|---|-----------------------|---|---|---------|
| 4.10.2 | | | | | Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: В 540 - 559, В 410 - 429, В 440 - 450 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения функций организма при неэффективности лечения (невозможность радикального удаления, рецидивы, продолженный рост опухоли, резистентность к медикаментозной терапии) | 40 - 60 |
| 4.10.3 | | | | | Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: В 540 - 559, В 410 - 429, В 440 - 450 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения функций организма при неэффективности лечения (невозможность радикального удаления, повторное оперативное лечение, продолженный рост опухоли, резистентность к медикаментозной терапии) | 70 - 80 |
| 4.11 | | | Первичная надпочечниковая недостаточность | E27.1 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|---|--|---------|
| 4.11.1 | | | | | Нарушения психических функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: В 110 - 199, В 540 - 559, В 410 - 429, В 440 - 450 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: стабильное течение заболевания на фоне заместительной глюкокортикоидной и минералокортикоидной терапии, отсутствие аддисонических кризов. | 10 - 30 |
| 4.11.2 | | | | | Нарушения психических функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: В 110 - 199, В 540 - 559, В 410 - 429, В 440 - 450 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: наличие аддисонических кризов средней частоты (3 - 5 раз в год), верифицированных в условиях стационара | 40 - 60 |
| 4.11.3 | | | | | Нарушения психических функций, функций эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой, дыхательной системы; МКФ: В 110 - 199, В 540 - 559, В 410 - 429, В 440 - 450 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: наличие частых аддисонических кризов (более 5 раз в год), верифицированных в условиях стационара | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|--|--|---------|
| 4.12 | | | Полигландулярная дисфункция | E31 | | | |
| | | | Аутоимунная полигландулярная недостаточность | E31.0 | | | |
| | | | Полигландулярная гиперфункция | E31.1 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 4.12. Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при полигландулярной дисфункции зависит от прогрессивного характера течения заболевания, от "компонентов" заболевания (количества и вида органов и/или систем организма, вовлеченных в патологический процесс); от вида и степени нарушенных функций организма, сенсорных (снижение остроты зрения вплоть до слепоты), статодинамических (множественные патологические переломы, остеопороз, контрактуры суставов, анкилозы), функций пищеварительной системы (синдром мальабсорбции, язвенная болезнь), сердечно-сосудистой системы (ХСН различной стадии), эндокринной системы и метаболизма (гипогликемический синдром, сахарный диабет), мочевыделительной системы (ХБП различной стадии), функции кожи и связанных с ней систем; а также от наличия осложнений со стороны каждого "компонента" заболевания и эффективности проводимой терапии.</p> | | | | | | | |
| 4.12.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствие клинико-функциональных проявлений заболевания на фоне проводимой терапии (в том числе хирургического лечения) или незначительные нарушения функций организма | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199; В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 899 | | |
| 4.12.2 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения функций организма при неэффективности лечения (в том числе хирургического) | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | МКФ: В 110 - 199; В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 899 | | |
| 4.12.3 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199; В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 899 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения функций организма при неэффективности лечения и/или наличие осложнений со стороны органа и/или системы, вовлеченной в синдром | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--------------------|----------------|--|---|---------|
| 4.13 | | | Морбидное ожирение | E66.0 E67.8 | | | |
| 4.13.1 | | | | | Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 110 - 199, В 710 - 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ожирение без осложнений либо в сочетании с незначительными нарушениями функций организма | 10 - 30 |
| 4.13.2 | | | | | Нарушения психических, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, сердечно-сосудистой, дыхательной, | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ожирение с ИМТ более 40,0 (или SDS ИМТ \geq 4,0) в сочетании с умеренными нарушениями функций организма | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---|--------------------|--|--|---------|
| | | | | | эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 110 - 199, В 710 - 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559 | | |
| 4.14 | | Нарушения обмена веществ | | E70 - E90 | | | |
| 4.14.1 | | | Классическая фенилкетонурия Другие виды гиперфенилаланинемии | E70.0 E70.1 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 4.14.1</p> <p>Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных фенилкетонурией (далее - ФКУ), основывается, в первую очередь, на оценке показателей нервно-психического, физического и речевого развития ребенка, а также учитывает форму, течение заболевания, прогноз, возможность достижения безопасного допустимого уровня фенилаланина (далее - ФА) для каждого возрастного периода, учитывает формирование способности самостоятельно осуществлять контроль за течением и терапией заболевания (соблюдение основных принципов расчета лечебного питания, систематический контроль уровня фенилаланина в сыворотке крови на допустимом безопасном уровне, осуществление самостоятельно диетотерапии). Данные навыки должны формироваться у ребенка к 14 годам.</p> | | | | | | | |
| 4.14.1.1 | | | Легкая гиперфенилаланинемия (не ФКУ) | E70.1 | Нарушения функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при уровне ФА в крови в пределах от 2 до 6 мг/дл в период диагностики заболевания до начала соблюдения диеты или | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|--------------------|--|---|---------|
| | | | | | | после верификации диагноза при уровне ФА от 2 до 6 мг/дл без соблюдения диеты в последующем при соответствующем возрасту физическом, психомоторном и речевом развитии | |
| 4.14.1.2 | | | Фенилкетонурия легкая форма (6 - 10 мг/дл), среднетяжелая форма (10 - 20 мг/дл) | E70.0 | Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 710 - 799, В 540 - 559, В 510 - 539 | Для детей в возрасте 0 - 14 лет: с момента верификации диагноза до 14 лет при уровне ФА от 6 до 20 мг/дл (легкая и среднетяжелая форма ФКУ) при соблюдении диеты | 40 - 60 |
| 4.14.1.3 | | | Фенилкетонурия классическая форма (более 20 мг/дл) Другие виды гиперфенилаланине | E70.0 E70.1 | Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с | Для детей в возрасте 0 - 14 лет: с момента верификации диагноза до 14 лет при уровне ФА более 20 мг/дл: классическая (тяжелая) | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|----------------------------------|---|---|---------|
| | | | мии: птерин-зависимая (кофакторная, атипичная форма фенилкетонурии) - ФКУ II и III типа | | движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 710 - 799, В 540 - 559, В 510 - 539 | форма ФКУ, птерин-зависимая форма ФКУ | |
| 4.14.1.4 | | | Фенилкетонурия среднетяжелая (10 - 20 мг/дл); классическая форма (более 20 мг/дл) Другие виды гиперфенилаланине мии: птерин-зависимая (кофакторная, атипичная форма фенилкетонурии) - ФКУ II и III типа | E70.0 E70.1 | Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 710 - 799, В 540 - 559, В 510 - 539 | Для детей в возрасте 15 - 17 лет: сохранение уровня ФА от 10 до 20 мг/дл на фоне диетотерапии при наличии умеренных нарушений функций организма: умеренное когнитивное снижение, умеренные речевые нарушения, умеренное снижение интеллекта (15 лет: IQ = 50 - 69 баллов (детский, WPPSI или WISC); 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 баллов (взрослый WAIS); умеренная неврологическая симптоматика (умеренная полинейропатия); | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|--------------------|--|--|----------|
| | | | | | | наличие БЭН II степени | |
| 4.14.1.5 | | | Фенилкетонурия Среднетяжелая форма (10 - 20 мг/дл); классическая форма (более 20 мг/дл) Другие виды гиперфенилаланинемии: птерин-зависимая (кофакторная, атипичная форма фенилкетонурии) - ФКУ II и III типа | E70.0 E70.1 | Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 710 - 799, В 540 - 559, В 510 - 539 | Для детей в возрасте 15 - 17 лет: сохранение уровня ФА более 20 мг/дл на фоне диетотерапии при наличии выраженных нарушений функций организма: выраженное снижение интеллекта (IQ = 35 - 49); выраженные речевые нарушения и/или выраженная неврологическая симптоматика (выраженная полинейропатия, мышечная дистония, парезы и прочее); наличие БЭН III степени | 70 - 80 |
| 4.14.1.6 | | | Фенилкетонурия классическая форма (более 20 мг/дл) Другие виды гиперфенилаланинемии: птерин-зависимая (кофакторная, атипичная форма | E70.0 E70.1 | Нарушения психических, языковых и речевых функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: сохранение уровня ФА более 20 мг/дл на фоне диетотерапии при наличии значительно выраженных нарушений функций организма: значительно выраженное снижение | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--------|--|---|--------------------------------------|----------------|---|--|--|
| | | | фенилкетонурии) ФКУ II и III типа | | эндокринной системы и метаболизма, пищеварительной системы; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 710 - 799, В 540 - 559, В 510 - 539 | интеллекта (IQ < 35), значительно выраженная неврологическая симптоматика (гиперкинезы, пароксизмальные расстройства, мышечная дистония, парезы и прочее) | |
| 4.14.2 | | Нарушение обмена ароматических аминокислот Нарушение обмена аминокислот с разветвленной цепью и обмена жирных кислот: болезнь "кленового сиропа" (лейциноз), изовалерианов ая, метилмалонова я пропионовая ацидемия и другие | | E70 E71 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|--|--|--|
| | | нарушения | | | | | |
| | | Другие нарушения обмена аминокислот: цистиноз, цистинурия, синдром Фанкони (-де Тони) (-Дебре), болезнь Хартнупа, синдром Лоу, глютарикацидурия, | | E72 | | | |
| | | гомоцистинурия и другие нарушения | | E74 | | | |
| | | Другие нарушения обмена углеводов: галактоземия, фруктоземия и другие нарушения | | E75 | | | |
| | | Нарушения обмена сфинголипидов и другие болезни | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-----|--|--|--|
| | | накопления липидов: болезнь Фабри, Тея-Сакса, Гоше, Краббе, Ниманна-Пика; синдром Фабера, метахроматиче ская лейкодистрофи я; | | | | | |
| | | недостаточнос ть сульфатазы | | E76 | | | |
| | | Нарушения обмена глюкозамино-г ликанов мукополисахар идозы I, II, III, IV, VI, VII типов) | | E77 | | | |
| | | Нарушение обмена гликопротеино в | | E78 | | | |
| | | Нарушение обмена липопротеидов и другие дислипидемии | | E79 | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|--|--|--|
| | | Нарушения обмена пуринов и пиримидинов: синдром Леша-Нихена, ксантинурия | E80 | | | |
| | | Нарушения обмена порфирина и билирубина (синдром Криглера-Найяра, болезнь Байлера, синдром Люси-Дрисколла) | E83 | | | |
| | | Нарушение минерального обмена (болезнь Вильсона-Коновалова, гепато-ленткулярная дегенерация) | | | | |

Примечание к [подпункту 4.14.2](#)

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при редких орфанных заболеваниях, обусловленных нарушением обмена тирозина, аминокислот с разветвленной цепью, жирных кислот, сфинголипидов, глюкозаминогликанов, основывается на оценке показателей нервно-психического, физического и речевого

развития ребенка, а также учитывает форму и тип течения заболевания (прогредиентное или кризовое), клинический полиморфизм симптоматики, возможность компенсации нарушенных функций организма патогенетическим лечением, прогноз течения заболевания.

Для заболеваний, при которых показана диетотерапия, учитывается формирование способности самостоятельно осуществлять контроль за течением и терапией заболевания (соблюдение основных принципов расчета лечебного питания, систематический контроль уровня аминокислот или других метаболитов на допустимом безопасном уровне, осуществление самостоятельно диетотерапии).

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|--|---------|
| 4.14.2.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 540 - В 559, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: кризовое или прогредиентное течение заболевания, не компенсируемое патогенетической терапией, при наличии умеренных нарушений функций организма. 0 - 3 года: умеренная задержка физического, психомоторного и раннего речевого развития | 40 - 60 |
| 4.14.2.2 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: кризовое или прогредиентное течение | 70 - 80 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|---|---|----------|
| | | | | нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 540 - В 559, В 610 - 639 | заболевания с неблагоприятным прогнозом, не компенсируемое патогенетической терапией, при наличии выраженных нарушений функций организма; 0 - 3 года: выраженная задержка физического, психомоторного и раннего речевого развития | |
| 4.14.2.3 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции; | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: кризовое или прогрессивное течение заболевания с неблагоприятным прогнозом, не компенсируемое патогенетической терапией, при наличии значительно выраженных нарушений функций организма; 0 - 3 года: значительно выраженная задержка | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|--|--|---------|
| | | | | | МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 540 - В 559, В 610 - 639 | физического, психомоторного и раннего речевого развития | |
| 4.14.3 | | | Кистозный фиброз (муковисцидоз) с легочными проявлениями | E84.0 | | | |
| | | | Кистозный фиброз (муковисцидоз) с другими проявлениями (с комбинированными проявлениями) | E84.8 | | | |
| | | | Кистозный Фиброз неуточненный | E84.9 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 4.14.3</p> <p>Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных муковисцидозом, основывается на оценке фазы и активности процесса, характера течения заболевания, вида генетических мутаций, степени выраженности проявлений со стороны пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой эндокринной системы, других систем организма, вида микробного патогена дыхательного тракта, а также на наличии осложнений.</p> | | | | | | | |
| 4.14.3.1 | | | | | Нарушения функций дыхательной, пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 440 - 449, В 510 - 539, В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: формы заболевания без клинической симптоматики или легкое течение заболевания с незначительными | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | нарушениями функции дыхательной и пищеварительной систем | |
| 4.14.3.2 | | | | Нарушения функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 510 - 539, В 440 - 449; В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: среднетяжелая форма заболевания с умеренными нарушениями функций организма, первичный или интермиттирующий высев: P. aeruginosa, B. cepacia complex, MRSA, Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter spp., нетуберкулезными микобактериями, грибами рода Aspergillus и других микробных патогенов, синдром потери соли, хроническая панкреатическая недостаточность, острый и рецидивирующий панкреатит, мекониевый илеус или синдром дистальной интестинальной обструкции, | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | кровохарканье, цирроз печени без портальной гипертензии, нарушенная толерантность к глюкозе и диабет без потребности в инсулине, хронический панкреатит, белково-энергетическая недостаточность 1 - 2 степени. | |
| 4.14.3.3 | | | | Нарушения функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, нарушение психических функций; МКФ: В 510 - 539, В 440 - 449, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 110 - 199 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: тяжелая форма заболевания с выраженными нарушениями функций организма; наличие тяжелых хронических инфекционных осложнений, вызванных: P. aeruginosa, B. cereacia complex, MRSA, Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter spp., нетуберкулезными микобактерии, грибами рода Aspergillus и другими микробными патогенами, повторный | 70 - 80 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|---|---|----------|
| | | | | | синдром потери соли, мекониевый илеус или синдром дистальной интестинальной обструкции, легочное кровотечение, цирроз печени с портальной гипертензией, муковисцидоз-ассоциированный диабет с потребностью в инсулине, остеопороз, белково-энергетическая недостаточность 2 - 3 степени - носители гастростомы, панкреатическая недостаточность с высокой потребностью в панкреатических ферментах (> 10 000 Ед/кг или 4 000 Ед/грамм жира), частые обострения хронического панкреатита, пневмоторакс | |
| 4.14.3.4 | | | | Нарушения функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной | Хроническая дыхательная недостаточность с кислородозависимостью, $ОФВ_1 < 30\%$ от должного, пациенты | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------|---|--|--|
| | | | | | системы, эндокринной системы и метаболизма, нарушение психических функций; МКФ: В 510 - 539, В 440 - 449, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 110 - 199 | находящиеся в листе ожидания на трансплантацию легких или печени | |
| 5 | Психические расстройства и расстройства поведения (класс V) | | | F00 - F99 | | | |

Примечание к [пункту 5](#).

Количественная оценка степени выраженности нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных психическими расстройствами и расстройствами поведения, основывается на типологии, степени выраженности, прогрессивности патопсихологической, психопатологической и личностной симптоматики в различные возрастные периоды с учетом возрастной динамики данных расстройств. Независимо от нозологической формы психического расстройства при оценке степени выраженности психических функций учитывается уровень реабилитационного потенциала организма ребенка (фактор наследственности, половозрастные особенности, состояние иных органов и систем организма), реабилитационного потенциала личности ребенка (интеллектуальный, мотивационный и эмоционально-волевой компонент в зависимости от возраста), а также состояние его ближайшей социальной группы (семьи), характер получения образования (обучение по основным общеобразовательным стандартам или по адаптированной программе), профессиональный маршрут (в возрасте старше 14 лет). Необходимой составляющей является уровень адаптации в основных сферах жизнедеятельности ребенка (семейной, бытовой, социально-средовой, в ситуации обучения, профессиональной сфере и прочих).

| | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 5.1 | | Нарушения психологического развития | | F80 - F89 | | | |
| 5.1.1 | | | Специфические расстройства речи и языка Специфические расстройства развития учебных навыков Смешанные специфические расстройства психологического развития (стойкая задержка развития) Заикание Симптомы, признаки, относящиеся к речи и голосу | F80 F81 F83 F98.5 R47 - R49 | | | |

Примечание к подпункту 5.1.1.

Количественная оценка степени выраженности нарушений языковых и речевых функций у детей в возрасте 3 года и старше зависит от уровня (степени) общего или системного недоразвития речи (ОНР и СНР соответственно), от вида речевого синдрома и степени выраженности нарушений устной речи (ринолалия, дизартрия, дислалия, заикание, алалия, афазия) и/или письменной речи (дисграфия, дислексия, дискалькулия); нарушений голосообразования. Также имеет значение возраст начала проведения мероприятий по комплексной реабилитации и абилитации (хирургическая коррекция, медикаментозная терапия, логопедическая, дефектологическая и психологическая коррекция) и их эффективность. Заключение с указанием степени (уровня) общего или системного недоразвития речи, конкретного вида речевого синдрома и степени его выраженности предоставляет

специалист-логопед медицинской организации.

При определении количественной оценки степени выраженности языковых и речевых нарушений в возрасте до 3 лет необходимо учитывать темповую задержку формирования речевых навыков, которая рассматривается как нестойкое нарушение языковых и речевых функций. Нарушения языковых и речевых функций в этом возрастном периоде не бывают изолированными, как правило, входят в структуру различных клинических синдромов, обусловленных патологией ЦНС, психической и/или соматической сферы. На формирование речевых функций в данный возрастной период оказывают влияние объем и качество проводимого восстановительного лечения, в том числе педагогической и психологической коррекции.

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 5.1.1.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций, сенсорных функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299 | Для детей в возрасте 3 - 17 лет: ОНР 3 и 4 уровня речевого развития, СНР легкой степени, незначительные проявления речевых синдромов устной и письменной речи; незначительные нарушения психических и/или сенсорных функций | 10 - 30 |
| 5.1.1.2 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций, сенсорных функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299 | Для детей в возрасте 3 - 17 лет: ОНР 2 уровня речевого развития, СНР средней степени, умеренные проявления речевых синдромов устной и письменной речи; нарушения психических и/или сенсорных функций (незначительные/умере | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|-----|--|---|---------|
| | | | | | нные) | | |
| 5.1.1.3 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций, сенсорных функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399, В 210 - 299 | Для детей в возрасте 3 - 17 лет: ОНР 1 уровня речевого развития, СНР выраженной степени, выраженные проявления речевых синдромов устной и письменной речи; нарушения психических и/или сенсорных функций (незначительные/умеренные/выраженные) | 70 - 80 |
| 5.1.2 | | | Общие расстройства психологического развития | F84 | | | |

Примечание к подпункту 5.1.2.

Количественная оценка степени выраженности нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при расстройствах аутистического спектра основывается на оценке степени дефицита социальной коммуникации и социального взаимодействия; оценке "поведенческого сценария" (фобии и аффективные методы защиты - моторные и речевые стереотипии, поведенческие ритуалы, сверхценные увлечения, патологические фантазии, "феномен тождества" или требование неизменности, повышенная или неадекватная реакция на сенсорные стимулы, постоянства). Дополнительными критериями оценки является отсутствие или наличие специфических речевых нарушений, интеллектуальной недостаточности, психопатологических проявлений (кататонический синдром, пароксизмальные нарушения в структуре аутизма).

В возрастном периоде от 0 до 3 лет количественная оценка степени выраженности функций организма должна учитывать степень нарушения коммуникативных навыков, темп психомоторного развития ребенка и формирования социальных и поведенческих навыков.

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|----------------------------------|--|---|---------|
| 5.1.2.1 | | | Детский аутизм Атипичный аутизм Синдром Ретта Синдром Геллера | F84.0 F84.1 F84.2 F84.3 | | | |
| 5.1.2.1. 1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399. | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ребенок самостоятельно устанавливает контакт, но испытывает трудности в организации общения (нервозность, робость, быстрое истощение, двигательная расторможенность). Нет активного избегания взгляда. "Поведенческий сценарий": сохранение постоянства среды за счет формирования штампов - образцов правильного социального поведения; защитные образования (стереотипии, ритуалы) минимальны, носят адекватный, компенсаторный характер и появляются в ситуации тревоги. | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | | 0 - 3 года: навыки формируются соответственно возрасту либо имеется незначительная задержка (регресс) психомоторного, речевого развития и социальных навыков. 4 - 17 лет: функции речи не нарушены либо имеются незначительные специфические нарушения речи (ОНР 3 или 4 уровня речевого развития/СНР легкой степени). Интеллект не снижен либо снижен незначительно: 4 - 15 лет: IQ = 70 - 79 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов | |
| 5.1.2.1. 2 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ребенок самостоятельно устанавливает минимальный контакт с окружающими, требуется постоянное побуждение. Во время контакта - повышенный | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | | нарушения речи (ОНР 2/СНР легкой или средней степени). Интеллект не снижен либо снижен от незначительной до умеренной степени (4 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 баллов) | |
| 5.1.2.1. 3 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ребенок самостоятельно не устанавливает контакт с окружающими, возможно лишь кратковременное привлечение внимания после побуждения. Избегание визуального контакта. "Поведенческий сценарий": не допускаются нарушения стереотипа окружающей среды, формируются множественные стереотипии, поведенческие ритуалы; характерны выраженные фобии, | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|---|--|----------|
| | | | | | | обсессивно-компульсивные нарушения, регресс ранее сформированных социальных, учебных и речевых навыков. Возможно сочетание с различными вариантами кататонического синдрома. 0 - 3 года: стойкая выраженная задержка (регресс) психического, речевого развития и социальных навыков. 4 - 17 лет: выраженные специфические нарушения речи (ОНР 1 уровня/СНР тяжелой степени). Интеллект - выраженное снижение: IQ = 35 - 49 баллов | |
| 5.1.2.1.4 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: контакт с ребенком невозможен, привлечь внимание не удается. Отсутствие визуального контакта. Полное отсутствие вербального контакта. "Поведенческий | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--------------|-------------|--|--|
| | | | | | В 610 - 639 | <p>сценарий": при малейшем изменении постоянства окружающей среды - неуправляемое хаотичное двигательное возбуждение либо полное отрешение от окружающего; многочисленные страхи, стереотипии, проявления кататонического синдрома. Методы аффективной защиты (ритуалы) не развиты. Возможно наличие эпилептических припадков. 0 - 3 года: значительно выраженное нарушение психического, речевого развития и отсутствие элементарных социальных и поведенческих навыков. Интеллект: значительно выраженное снижение (IQ < 34 баллов)</p> | |
| 5.2 | | Умственная отсталость (интеллектуаль | | F70 - F79 | | | |

| | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|------------------------------|-----|--|---|
| | | ная недостаточнос ть) | | | | |
| <p>Примечание к подпункту 5.2. Количественная оценка степени выраженности нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при умственной отсталости у ребенка старше 3 лет основывается на степени выраженности синдрома интеллектуальной недостаточности, наличии, клиническом варианте и степени выраженности поведенческих нарушений, соматоневрологической патологии (пароксизмальные нарушения, параличи, парезы, патология зрения и слуха и другие нарушения) и клиническом и социальном прогнозе на уровне адаптации ребенка в основных сферах жизнедеятельности. В случае отсутствия в структуре умственной отсталости клинически значимых поведенческих нарушений, соматоневрологической патологии количественная оценка степени нарушенных психических функций производится по степени интеллектуальной недостаточности. У детей в возрасте 3 года и старше степень интеллектуальной недостаточности оценивается по клиническим проявлениям и данным адаптированных методик - теста Векслера: дети от 4 до 7 лет - тест WPPSI (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence); тест WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children), у детей с нарушениями речи или слуха, с выраженной социально-педагогической запущенностью, с задержками навыков чтения и письма для тестирования детей с 5 лет предпочтительнее использовать детский вариант теста Равена, для тестирования детей и подростков (от 7 до 15 лет 11 месяцев) и тест WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale), предназначенный для тестирования взрослых (от 16 лет и старше). При невозможности оценки степени интеллектуального дефекта методикой Векслера в связи с особенностями клинической симптоматики и возраста ребенка оценка производится только клинически по результатам динамического наблюдения (заключение ВК ПНД). При наличии в структуре умственной отсталости системного недоразвития речи различной степени количественно оцениваются и нарушения языковых и речевых функций.</p> | | | | | | |
| 5.2.1 | | | Легкая умственная отсталость | F70 | | |
| 5.2.1.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399. | Для детей в возрасте 3 - 17 лет: легкая умственная отсталость при отсутствии сопутствующей |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | симптоматики, либо в сочетании с нарушениями поведения, соматоневрологической патологией, достигающими незначительной степени, что не приводит к существенным нарушениям адаптации 3 - 7: IQ = 70 - 79 баллов (детский WPPSI или WISC) 8 - 15: IQ = 70 - 79 баллов (детский WISC); 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов (взрослый WAIS) | |
| 5.2.1.2 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399 | Для детей в возрасте 3 - 17 лет: легкая умственная отсталость в сочетании с нарушениями поведения, соматоневрологической патологией, достигающими умеренной степени, существенно затрудняющими адаптацию в основных | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | сферах жизнедеятельности. 3 - 7 лет: IQ = 50 - 79 баллов (детский, WPPSI или WISC); 8 - 15 лет: IQ = 50 - 79 баллов (детский WISC); 16 - 17 лет: IQ = 50 - 69 баллов (взрослый WAIS) | |
| 5.2.1.3 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 3 - 17 лет: легкая умственная отсталость в сочетании с нарушениями поведения, соматоневрологической патологией, достигающими выраженной степени, что приводит к частичной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности. 3 - 7 лет: IQ = 50 - 79 баллов (детский, WPPSI или WISC). 8 - 15 лет: IQ = 50 - 79 баллов (детский WISC); 16 - 17 лет: IQ = 50 - 69 баллов (взрослый WAIS). Нарушение контроля | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---------------------------------|-----|---|--|----------|
| | | | | | | функции тазовых органов | |
| 5.2.2 | | | Умеренная умственная отсталость | F71 | | | |
| 5.2.2.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 3 - 17 лет: умеренная умственная отсталость (IQ = 35 - 49 баллов) при отсутствии или в сочетании с нарушениями поведения, соматоневрологической патологией, достигающими выраженной степени, что приводит к выраженной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности, требующей частичного ухода и надзора. Нарушение контроля функции тазовых органов | 70 - 80 |
| 5.2.2.2 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций | Для детей в возрасте 3 - 17 лет: умеренная умственная отсталость (IQ = 35 - 49 | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|-------------------------------|-----|--|---|--|
| | | | | | пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639 | баллов) в сочетании со значительно выраженными психопатологическими состояниями в структуре дефекта (некоррегируемые нарушения аффективной сферы, поведения, влечения, грубая соматоневрологическая симптоматика, значительно выраженные пароксизмальные расстройства и прочие расстройства), приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора. Нарушение или отсутствие контроля функции тазовых органов | |
| 5.2.3 | | | Тяжелая умственная отсталость | F72 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--------------------------------|-----|---|---|----------|
| 5.2.3.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций, нарушения функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 3 - 17 лет: тяжелая умственная отсталость (IQ = 20 - 34 балла), приводящая к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора. Нарушение или отсутствие контроля функции тазовых органов | 90 - 100 |
| 5.2.4 | | | Глубокая умственная отсталость | F73 | | | |
| 5.2.4.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 3 - 17 лет: глубокая умственная отсталость (IQ < 20 баллов), приводящая к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора. Отсутствие контроля функции тазовых органов | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|-----------|--|--|--|
| 5.3 | | Шизофрения, шизотипические состояния и бредовые расстройства | | F20 - F29 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 5.3. Количественная оценка нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при периодическом (рекуррентном) типе шизофрении зависит от возраста начала заболевания, темпа течения и стадии процесса, выраженности и стойкости основного синдрома (синдромов) в приступе, длительности и частоты приступов, характера, динамики и степени выраженности дефицитарной симптоматики; выраженности аффективных нарушений, выраженности регресса, а также от этапа формирования, стойкости, выраженности и качества ремиссии (дефекта), наличия критики к своему состоянию и окружающей действительности, клинического прогноза, уровня социальной адаптации в основных сферах жизнедеятельности (семейной, бытовой, социально-средовой, в ситуации обучения).</p> | | | | | | | |
| 5.3.1 | | | Шизофрения, эпизодический ремиттирующий тип течения | F20 | | | |
| | | | параноидная | F20.0 | | | |
| | | | гебефреническая | F20.1 | | | |
| | | | кататоническая | F20.2 | | | |
| | | | недифференцированная | F20.3 | | | |
| | | | постшизофреническая депрессия | F20.4 | | | |
| | | | простой тип | F20.6 | | | |
| | | | другой тип | F20.8 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---|--------------|--|---|---------|
| | | | неуточненная шизоаффективное расстройство | F20.9 F25 | | | |
| 5.3.1.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399 | Для детей в возрасте 4 - 17 лет: обострения общей продолжительностью до 2 месяцев в год; стойкая ремиссия, наличие незначительной дефицитарной симптоматики без существенного влияния на социальную адаптацию и обучение ребенка | 10 - 30 |
| 5.3.1.2 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399 | Для детей в возрасте 4 - 17 лет: обострения общей продолжительностью от 2 до 4 месяцев в год; неполная ремиссия с резидуальной симптоматикой; наличие умеренной дефицитарной симптоматики, существенно затрудняющие адаптацию в основных | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---|--|---|---|---------|
| | | | | | | сферах жизнедеятельности | |
| 5.3.1.3 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399 | Для детей в возрасте 4 - 17 лет: затяжные или частые обострения общей продолжительностью от 4 и более месяцев в год; неполная ремиссия с резидуальной симптоматикой, резистентной к терапии; наличие выраженной дефицитарной симптоматики, приводящие к дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности | 70 - 80 |
| 5.3.2 | | | Шизофрения: эпизодический тип течения со стабильным дефектом, эпизодический тип течения с нарастающим дефектом: параноидная гебефреническая | F20.1 F20.2 F20.0 F20.1 | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|-------|---|---|---------|
| | | | кататоническая | F20.2 | | | |
| | | | недифференцированная | F20.3 | | | |
| | | | постшизофреническая | F20.4 | | | |
| | | | депрессия, остаточная (резидуальная) | F20.5 | | | |
| | | | простой тип | F20.6 | | | |
| | | | другой тип | F20.8 | | | |
| | | | неуточненная | F20.9 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 5.3.2. Количественная оценка нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при приступообразно-прогредиентной шизофрении зависит от возраста начала заболевания, темпа течения и стадии процесса, выраженности и стойкости основного синдрома (синдромов), длительности и частоты приступа, характера, динамики и степени выраженности дефицитарной (негативной) симптоматики, от выраженности регрессивных расстройств, этапа формирования, стойкости, выраженности и качества ремиссии (дефекта), от наличия интеллектуального снижения, степени выраженности процессуальных изменений личности и других синдромов, от наличия критики к своему состоянию и окружающей действительности; клинического прогноза; уровня социальной адаптации в основных сферах жизнедеятельности (семейной, бытовой социально-средовой в ситуации обучения).</p> | | | | | | | |
| 5.3.2.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399 | Для детей в возрасте 4 - 17 лет: обострения общей продолжительностью от 4 до 6 месяцев в год; неполная ремиссия с умеренной | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | дефицитарной симптоматикой; умеренными эндогенными изменениями личности; незначительное/умеренное снижение интеллекта: 4 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов - детский WISC; 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 (взрослый WAIS) | |
| 5.3.2.2 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 4 - 17 лет: обострения продолжительностью от 6 до 8 месяцев в год; неполная ремиссия с резидуальной симптоматикой, резистентной к терапии, выраженная дефицитарная симптоматика; выраженные эндогенные изменения личности; умеренное или выраженное (IQ 35 - 49 баллов) снижение интеллекта; нарушение контроля функции тазовых органов | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---|---|--|---|----------|
| 5.3.2.3 | | | | | <p>Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639</p> | <p>Для детей в возрасте 4 - 17 лет: обострения продолжительностью более 8 месяцев в год, частые обострения с продуктивной симптоматикой (аффективной, кататонической, гебефренной, гебоидной, галлюцинаторно-бредовой, с помрачением сознания); значительно выраженная дефицитарная симптоматика; эндогенные изменения личности; значительно выраженное снижение интеллекта (IQ < 34 баллов); отсутствие контроля функции тазовых органов</p> | 90 - 100 |
| 5.3.3 | | | <p>Шизофрения, непрерывный тип течения:</p> <p>параноидная</p> <p>гебефреническая</p> <p>кататоническая</p> | <p>F20</p> <p>F20.0</p> <p>F20.1</p> <p>F20.2</p> | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|-------|---|---|---------|
| | | | недифференцированная | F20.3 | | | |
| | | | остаточная | F20.5 | | | |
| | | | простая | F20.6 | | | |
| | | | другой тип | F20.8 | | | |
| | | | неуточненная | F20.9 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 5.3.3. Количественная оценка нарушений психических функций граждан в возрасте до 18 лет при непрерывно-прогредиентном типе течения зависит от возраста начала процесса, темпа течения шизофрении (медленно-, средне-, быстро-прогредиентного), ее формы, стадии процесса, выраженности и стойкости основного синдрома (синдромов) "позитивного" спектра, синдромов непсихотического регистра, характера, динамики и степени выраженности дефицитарной симптоматики, выраженности регрессивных расстройств, этапа формирования, стойкости, выраженности и качества ремиссии (дефекта) при шизофрении, наличия и степени интеллектуального снижения, степени выраженности эндогенных изменений личности (синдрома аутизма), наличия критики к своему состоянию и окружающей действительности; прогноза заболевания, уровня социальной адаптации в основных сферах жизнедеятельности (семейной, бытовой, социально-средовой, в ситуации обучения).</p> | | | | | | | |
| 5.3.3.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399 | Для детей в возрасте 4 - 17 лет: незначительная продуктивная и/или дефицитарная симптоматика, незначительные эндогенные изменения личности (синдром аутизма и другие синдромы); отсутствие снижения или незначительное | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | | снижение интеллекта: 4 - 15 лет: IQ = 70 - 79 баллов (детский, WISC); 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов (взрослый WAIS) с сохранением критики к ситуации в целом, не оказывающие существенного влияния на социальную адаптацию и обучение | |
| 5.3.3.2 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399 | Для детей в возрасте 4 - 17 лет: умеренная продуктивная и/или дефицитарная симптоматика, умеренные эндогенные изменения личности (синдром аутизма и другие синдромы); незначительное или умеренное снижение интеллекта: 4 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов (детский WISC); 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 (взрослый WAIS), существенно затрудняющие адаптацию в основных сферах | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|---|--|----------|
| | | | | | жизнедеятельности | |
| 5.3.3.3 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 4 - 17 лет: выраженная продуктивная и/или дефицитарная симптоматика; выраженные эндогенные изменения личности (синдром аутизма и другие синдромы); умеренное или выраженное (IQ = 35 - 49 баллов) снижение интеллекта; нарушение контроля функции тазовых органов, приводящие к дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности | 70 - 80 |
| 5.3.3.4 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 4 - 17 лет: значительно выраженная продуктивная симптоматика и/или дефицитарная симптоматика; значительно выраженные эндогенные изменения | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | | личности (синдром аутизма и другие синдромы); значительно выраженное снижение интеллекта: IQ < 34 баллов; нарушение или отсутствие контроля функции тазовых органов, приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора | |
| <p>Примечание к подпунктам 5.3.3.1 - 5.3.3.4. Указанные стойкие нарушения функций организма характерны для непрерывно-прогредиентного типа течения шизофрении, средне-прогредиентного по темпу.</p> | | | | | | | |
| 5.3.3.5 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 4 - 17 лет: выраженная продуктивная симптоматика (кататоническая, кататоно-гебефренная, галлюцинаторная, бредовая и прочие виды симптоматики), плохо поддающаяся терапии, выраженная симптоматика | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|---|----------|
| | | | | | | непсихотического регистра (неврозоподобные, психопатоподобные, аффективные расстройства); выраженная дефицитарная симптоматика; выраженные проявления синдрома аутизма; выраженное снижение интеллекта (IQ = 35 - 49 баллов); нарушение контроля функции тазовых органов с быстрым формированием стойкого выраженного исходного состояния (дефекта) и социальной дезадаптации | |
| 5.3.3.6 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 4 - 17 лет: выраженная продуктивная симптоматика (гебоидная, кататоническая, кататоно-гебефренная, кататоно-галлюцинаторная, бредовая и так далее), резистентная к | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----|---|---|---------|
| | | | | | | терапии, значительно выраженная дефицитарная симптоматика; значительно выраженные проявления синдрома аутизма; значительно выраженное снижение интеллекта (IQ < 34 баллов); нарушение или отсутствие контроля функции тазовых органов с быстрым формированием стойкого значительно выраженного исходного состояния (шизофренического слабоумия) | |
| <p>Примечание к подпунктам 5.3.3.5 - 5.3.3.6. Указанные стойкие нарушения функций организма характерны для непрерывно-прогредиентного типа течения шизофрении, быстро прогредиентного по темпу (злокачественного).</p> | | | | | | | |
| 5.3.4 | | | Шизофрения, шизотипические состояния и бредовые расстройства | F21 | | | |
| 5.3.4.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых | Для детей в возрасте 4 - 17 лет: медленно | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399 | прогредиентное течение со стойкой незначительной симптоматикой непсихотического регистра, с незначительной дефицитарной симптоматикой, незначительными эндогенными изменениями личности, отсутствие снижения или незначительное снижение интеллекта: 4 - 15 лет: IQ = 70 - 79 баллов (детский, WPPSI или WISC); 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов (взрослый WAIS), не оказывающие существенного влияния на социальную адаптацию и обучение ребенка | |
| 5.3.4.2 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399 | Для детей в возрасте 4 - 17 лет: медленно прогредиентное течение со стойкой умеренной симптоматикой непсихотического регистра, умеренной | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | дефицитарной симптоматикой, умеренными эндогенными изменениями личности; незначительное или умеренное снижение интеллекта: 4 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов (детский WPPSI или WISC); 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 (взрослый WAIS), существенно затрудняющими адаптацию в основных сферах жизнедеятельности | |
| 5.3.4.3 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 4 - 17 лет: медленно прогрессивное течение со стойкой выраженной симптоматикой непсихотического регистра, выраженной дефицитарной симптоматикой, выраженными эндогенными изменениями личности; умеренное или выраженное (IQ = 35 - 49 балла) снижение | 70 - 80 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|---|--|----------|
| | | | | | интеллекта; нарушение контроля функций тазовых органов, приводящие к дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности | |
| 5.3.4.4 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 4 - 17 лет: значительно выраженные психопатоподобные расстройства, сочетание психопатоподобных расстройств с гебоидным синдромом, значительно выраженная истеро-конверсионная симптоматика (истерический амавроз, истерический псевдопаралич нижних конечностей и прочие) с ситуативно-неадекватным поведением, отсутствием критики и некорректируемыми нарушениями патологических влечений; нарушение или отсутствие контроля функции | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------|--|---|---------|
| | | | | | | тазовых органов, приводящие к полной дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности с необходимостью постоянного ухода и надзора | |
| <p>Примечание к подпунктам 5.3.4.1 - 5.3.4.4. Указанные стойкие нарушения функций организма характерны для непрерывно-прогредиентного типа течения шизофрении, медленно прогредиентного по темпу (вялотекущая шизофрения).</p> | | | | | | | |
| 5.4 | | | Расстройства настроения (аффективные расстройства) | F30 - F39 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 5.4. Количественная оценка нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при аффективных расстройствах (маниакальных, депрессивных, смешанных) зависит от вида симптоматики и интенсивности ее проявлений, частоты и длительности эпизодов, эффективности проводимого лечения, полноты, стойкости и длительности ремиссий, наличия критики к своему состоянию и окружающей действительности, клинической и социальной компенсации болезненного состояния, уровня социальной адаптации в основных сферах жизни ребенка (семейной, бытовой, социально-средовой, в ситуации обучения).</p> | | | | | | | |
| 5.4.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 310 - 340, В 398, В 399 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: аффективные расстройства незначительные, купирующиеся фармакотерапией, со стойкой ремиссией, существенно не | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|---|---|----------|
| | | | | | сказывающиеся на адаптации основных сфер жизнедеятельности | |
| 5.4.2 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: стойкие затяжные или частые аффективные расстройства, умеренные, общей продолжительностью более 6 месяцев в год, затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности | 40 - 60 |
| 5.4.3 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные аффективные расстройства, затяжные или частые, общей продолжительностью более 10 месяцев в год, приводящие к дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности | 70 - 80 |
| 5.4.4 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: стойкие затяжные или | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------|---|---|---------|
| | | | | | функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399 | частые значительно выраженные аффективные расстройства общей продолжительностью более 10 месяцев в год, с нуждаемостью в постоянном уходе и надзоре | |
| 5.5. | | | Невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства | F40 - F48 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 5.5.</p> <p>Количественная оценка нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при различных формах невротозов детского и подросткового возраста зависит от вида, длительности и динамики невротических расстройств (реакция, состояние, затяжное состояние, невротическое или патохарактерологическое развитие личности), вида и выраженности невротического синдрома (в том числе синдромов регресса - мутизм, регресс навыков опрятности, моторных навыков), эффективности проводимой терапии, наличия критики к своему состоянию и ситуации; клинической и социальной компенсации болезненного состояния (наличие защитных ритуалов, других методов аффективной защиты), а также уровня социальной адаптации в основных сферах жизнедеятельности (семейной, бытовой, социально-средовой, в ситуации обучение).</p> <p>К незначительным нарушениям психических функций относятся кратковременные невротические состояния (длительность до 1 года) либо стойкий невротический синдром длительностью свыше 1 года с незначительной клинической симптоматикой; к умеренным нарушениям - затяжное невротическое состояние (от 1 года до 5 - 6 лет) при наличии стойких умеренных клинических проявлений (неврастенической, фобической, тревожной, обсессивно-компульсивной, депрессивной, ипохондрической, регрессивной (задержка формирования экспрессивной речи, социальных навыков, навыков опрятности) симптоматики).</p> | | | | | | | |
| 5.5.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций; | Для детей в возрасте 4 - 7 лет: незначительные соматовегетативные | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399 | расстройства, обсессии (фобии, идеаторные, моторные обсессии) с элементами чуждости, с формированием простых компенсаторных ритуалов, аффективные нарушения (адинамическая, тревожная депрессия и прочие), синдромы дереализации - деперсонализации, симптомы регресса | |
| 5.5.2 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399 | Для детей в возрасте 8 - 17 лет: незначительные невротические состояния (истерические, неврастенические, фобо-обсессивные и прочие), возможно присоединение ипохондрического синдрома без склонности к затяжному течению | 10 - 30 |
| 5.5.3 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых | Для детей в возрасте 4 - 7 лет: сложные обсессии с | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399 | элементами навязчивости, чуждости, формированием защитных формирований (ритуалов), аффективные нарушения (депрессия), синдромы дереализации - деперсонализации, синдромы регресса | с |
| 5.5.4 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399 | Для детей в возрасте 8 - 17 лет: стойкие умеренные невротические состояния (истерические, неврастенические, фобо-обсессивные, и прочие), возможно присоединение ипохондрического синдрома со склонностью к затяжному течению. | 40 - 60 |
| 5.5.5 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399 | Для детей в возрасте 4 - 17 лет: затяжное течение стойких выраженных невротических состояний | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|-----------|---|---|----------|
| | | | | | (истерические, неврастенические, фобо-обсессивные, сенесто-ипохондрические и прочие состояния) с возможным переходом в патологическое развитие личности | | |
| 5.5.6 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399 | Для детей в возрасте 8 - 17 лет: стойкое невротическое или патохарактерологическое развитие личности с формированием сверхценной идеи со значительно выраженной истероконверсионной симптоматикой (истерический амавроз, истерический псевдопаралич нижних конечностей и прочие виды симптоматики) | 90 - 100 |
| 5.6 | | | Органические, включая симптоматические, психические расстройства | F04 - F09 | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|-----------|---|--|---------|
| | | | Эмоциональные расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте | F90 - F98 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 5.6 Количественная оценка нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при церебрально-органической патологии зависит от нозологической принадлежности, стадии заболевания; вида и степени выраженности нарушений психических процессов (по органическому или астеническому типам - психоорганический и астенический синдромы соответственно), наличия и степени выраженности синдромов личностного регистра (неврозоподобных, психопатоподобных расстройств) и сопутствующей симптоматики (психотической, аффективной, пароксизмальной и иных видов симптоматики); наличия и степени снижения интеллекта, нарушений языковых и речевых функций, а также уровня социальной адаптации в основных сферах жизнедеятельности (семейно-бытовой, социально-средовой, в ситуации обучения).</p> | | | | | | | |
| 5.6.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные когнитивные нарушения, незначительная или умеренная астеническая симптоматика, незначительный гипердинамический синдром, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, незначительный психоорганический синдром, незначительные | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | | расстройства личностного регистра (неврозоподобные, психопатоподобные и прочие), незначительные аффективные и другие стойкие незначительные расстройства непсихотического регистра, не затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности. Отсутствие нарушения или незначительное нарушение языковых и речевых функций. Отсутствие снижения или незначительное снижение интеллекта: 3 - 15 лет: IQ = 70 - 79 баллов (детский WISC, WPPSI); 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов (взрослый WAIS) | |
| 5.6.2 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренное снижение когнитивных процессов, выраженная | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------|--|--|
| | | | | | 310 - 399 | астеническая симптоматика, умеренный гипердинамический синдром, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, умеренный психоорганический синдром, умеренные расстройства личностного регистра (неврозоподобные, психопатоподобные и прочие), умеренные аффективные и другие стойкие умеренные расстройства непсихотического регистра, стойкие умеренные синдромы психотического регистра (синдром галлюциноза, бредовые расстройства), затрудняющие адаптацию в основных сферах жизнедеятельности. Возможно сочетание с незначительными/умере нными нарушениями языковых и речевых функций и/или с | |
|--|--|--|--|--|-----------|--|--|

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | незначительным/умеренным снижением интеллекта: 3 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов (детский WPPSI или WISC); 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 (взрослый WAIS) | |
| 5.6.3 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженное снижение когнитивных процессов, выраженный гипердинамический синдром, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, выраженный психоорганический синдром, выраженные расстройства личностного регистра (неврозоподобные, психопатоподобные), стойкие выраженные аффективные и другие выраженные расстройства непсихотического регистра, стойкие выраженные синдромы психотического регистра (синдром | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|-------------|--|---|----------|
| | | | | | галлюциноза, бредовые расстройства), приводящие к дезадаптации в основных сферах жизнедеятельности. Возможно сочетание с умеренными/выраженными нарушениями языковых и речевых функций и/или с умеренным/выраженным (IQ = 35 - 49 баллов) снижением интеллекта. Нарушение контроля функции тазовых органов | | |
| 5.6.4 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 510 - 539, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженное снижение когнитивных процессов и интеллекта (IQ < 34); отсутствие контроля функции тазовых органов, необходимость в постоянном уходе и надзоре. | 90 - 100 |
| 5.7 | | | Эпизодические пароксизмальные расстройства | и G40 - G47 | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|---------|
| | | | Другие виды генерализованной эпилепсии и эпилептических синдромов | G40.4 | | |
| | | | Синдром Ландау-Клеффнера | F80.3 | | |
| <p>Примечание к подпункту 5.7. Количественная оценка выраженности нарушений психических функций ребенка в возрасте до 18 лет при эпилепсии и эпилептических синдромах зависит от возраста, в котором началось заболевание, причины возникновения патологии (идиопатический или симптоматический генез приступов), локализации эпилептического очага, вида, частоты и тяжести эпилептических припадков; типа течения заболевания (прогредиентный, доброкачественный, ремиттирующий и прочие), объема и эффективности проводимой противоэпилептической терапии, наличия резистентности к ней, длительности межприступного периода. Частота эпилептических приступов оценивается на протяжении календарного года, обязательным условием является наличие противоэпилептической терапии. Необходимо также учитывать наличие, структуру и степень выраженности симптоматики патопсихологического уровня реагирования, интеллектуального и когнитивного снижения, расстройств устной и письменной речи; наличие и степень выраженности нарушений развития психомоторных, речевых, социальных навыков. Маркером неблагоприятного клинического и реабилитационного прогноза при эпилепсии и эпилептических синдромах детского возраста являются злокачественные формы группы так называемых "эпилептических энцефалопатий" с ранним дебютом (на первом году жизни), включающих синдромы Веста, Отахара, Драве, Айкарди, раннюю миоклоническую энцефалопатию, синдром Леннокса-Гасто, эпилептическую энцефалопатию с продолженной спайк-волновой активностью во сне. Для данной группы энцефалопатий характерно злокачественное прогредиентное течение, резистентность к противосудорожной терапии; отсутствие прогресса психического, речевого и моторного развития ребенка на первом году жизни, формирование тяжелой и глубокой интеллектуальной недостаточности</p> | | | | | | |
| 5.7.1. | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399 | Для детей в возрасте 0 - 3 года: незначительные пароксизмальные расстройства: легкие припадки до 3 в день, тяжелые - 1 раз в месяц | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | и реже, сумеречное расстройство сознания, особые состояния сознания, амбулаторный автоматизм - 1 раз и реже в 2 месяца; и/или незначительная стойкая задержка психомоторного, речевого развития и социальных навыков в структуре основного заболевания | |
| 5.7.2 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399 | Для детей в возрасте 4 - 17 лет: незначительные пароксизмальные расстройства: легкие припадки до 3 в день, тяжелые - 1 раз в месяц и реже, сумеречное расстройство сознания, особые состояния сознания, амбулаторный автоматизм - 1 раз и реже в 2 месяца; и/или наличие незначительной патопсихологической симптоматики, незначительного | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | нарушения устной и/или письменной речи; отсутствие снижения или незначительное снижение интеллекта: 4 - 17 лет: IQ = 70 - 79 баллов (детский, WISC); 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов (взрослый WAIS) | |
| 5.7.3 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399 | Для детей в возрасте 0 - 3 года: легкие припадки (3 - 4 в день) в сочетании со стойкой умеренной задержкой психомоторного, речевого развития и социальных навыков; тяжелые припадки - 2 раза в месяц; выраженные дисфории - 1 раз и реже в месяц; сумеречные расстройства сознания или особые состояния сознания - 1 раз и реже в 1,5 месяца; амбулаторный автоматизм 2 - 3 раза в месяц, дисфории 1 раз и реже в месяц, | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | эпилептический статус, серийные припадки - 1 раз в 3 месяца и/или проявления стойкой умеренной задержки психомоторного, речевого развития и социальных навыков в структуре основного заболевания | |
| 5.7.4 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399 | Дня детей в возрасте 4 - 17 лет: легкие припадки (3 - 4 в день) в сочетании с умеренными изменениями личности, умеренной патопсихологической симптоматикой; тяжелые припадки - 2 раза месяц; выраженные дисфории - 1 раз и реже в месяц; сумеречные расстройства сознания или особые состояния сознания - 1 раз и реже в 1,5 месяца; амбулаторный автоматизм 2 - 3 раза в месяц, эпилептический статус, серийные припадки - 1 раз в 3 | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | месяца; и/или умеренная патопсихологическая симптоматика (психопатоподобные расстройства, психоорганический синдром и прочие); умеренные нарушения устной и письменной речи; умеренное снижение интеллекта: 4 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов (детский, WISC); 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 балла (взрослый WAIS) | |
| 5.7.5 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, | Для детей в возрасте 0 - 3 года: легкие припадки 5 и более в день в сочетании со стойкой умеренной задержкой психомоторного, речевого развития и социальных навыков; тяжелые припадки с частотой 3 раза в месяц, сумеречные расстройства сознания или особые состояния сознания - 1 раз в месяц, выраженные | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | В 710 - 799, В 510 - 539; В 610 - 639 | дисфории - 2 - 3 раза в месяц, амбулаторные автоматизмы 4 раза в месяц и более, эпилептический статус, серийные припадки любой частоты (не контролируемое течение, резистентность к терапии) и/или проявления стойкой выраженной задержки (регресса) психомоторного, речевого развития и социальных навыков в структуре основного заболевания | |
| 5.7.6 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В | Для детей в возрасте 4 - 17 лет: легкие припадки 5 и более раз в день в сочетании с выраженной патопсихологической симптоматикой, выраженными изменениями личности; выраженным снижением интеллекта (IQ = 35 - 49 баллов); тяжелые припадки с частотой 3 раза в месяц, | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | | 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539; В 610 - 639 | эпилептический статус, серийные припадки любой частоты, сумеречные расстройства сознания или особые состояния сознания - 1 раз в месяц, выраженные дисфории - 2 - 3 раза в месяц, амбулаторные автоматизмы 4 раза в месяц и более и/или стойкая выраженная патопсихологическая симптоматика (психопатоподобные расстройства, психоорганический синдром и прочие), выраженная симптоматика психотического регистра; выраженное снижение интеллекта (IQ = 35 - 49 баллов); нарушение контроля функции тазовых органов | |
| 5.7.7 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, | Для детей в возрасте 0 - 3 года: синдромы группы "эпилептических энцефалопатий" | 90 - 100 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|---|---|----------|
| | | | | скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639 | (синдром Веста, Айкарди, Отахара Драве, ранняя миоклоническая энцефалопатия, синдром Леннокса-Гасто, эпилептическая энцефалопатия с продолженной спайк-волновой активностью во сне и прочие синдромы) с ранним дебютом (на первом году жизни), прогрессивным течением, резистентностью к противоэпилептической терапии, значительно выраженной задержкой развития психомоторных, речевых и социальных навыков в структуре основного заболевания | |
| 5.7.8 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с | Для детей в возрасте 4 - 17 лет: тяжелые припадки - 4 и более раз в месяц, 2 и более сумеречных расстройства сознания или особых состояния | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--------------|---|---|--|
| | | | | | движением (статодинамических) функций, нарушения функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639 | сознания, 4 и более эпизодов выраженной дисфории, 1 и более эпистатус в месяц; и/или значительно выраженная патопсихологическая симптоматика, симптоматика психотического регистра, отсутствие речи, значительно выраженное снижение интеллекта (IQ < 34 баллов), отсутствие контроля функции тазовых органов | |
| 6 | Болезни нервной системы (класс VI) и поражения нервной системы, представлен ные в других классах | | | G00 - G99 | | | |

Примечание к [пункту 6](#).

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленная заболеваниями нервной системы, основывается преимущественно на оценке степени выраженности двигательных нарушений (параличи, парезы, атаксия, гиперкинезы), затрудняющих опору и передвижение, способность осуществлять простые и

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------|--|--|---------|
| <p>сложные виды движений, а также на оценке наличия и степени выраженности психических, речевых и языковых, сенсорных нарушений функций организма. Учитываются также и другие факторы патологического процесса: клиническая форма, тип и тяжесть течения заболевания, активность процесса, длительность и частота обострений, наличие и курательность пароксизмальных состояний; распространенность патологического процесса, наличие осложнений, факторы клинического и реабилитационного прогноза.</p> | | | | | | | |
| 6.1 | | Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин | | T90 - T98 | | | |
| 6.1.1 | | | Последствия травм головы (последствия ушиба головного мозга) Последствия воспалительных заболеваний центральной нервной системы | T90 G09 | | | |
| 6.1.1.1 | | | | | Нарушения психических, языковых, и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные нарушения статодинамических функций: легкий гемипарез, легкий парез, парапарез; легкий атактический синдром и другие | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799 | легкие очаговые нарушения. Незначительные нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций. 0 - 3 года: незначительная задержка психомоторного и речевого развития в структуре основного заболевания | |
| 6.1.1.2 | | | | Нарушения психических, языковых, и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения статодинамических функций: легкий тетрапарез, умеренный гемипарез; умеренный парапарез; умеренный атактический синдром и другие умеренные очаговые нарушения. Умеренные нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций. 0 - 3 года: умеренная задержка психомоторного и речевого развития в | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|----------|
| | | | | | структуре основного заболевания | |
| 6.1.1.3 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения статодинамических функций: умеренный тетрапарез, выраженный гемипарез, выраженный парапарез, выраженный парез; выраженный атактический синдром и другие выраженные очаговые нарушения. Выраженные нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций. Нарушение контроля функции тазовых органов. 0 - 3 года: выраженная задержка психомоторного и речевого развития в структуре основного заболевания | 70 - 80 |
| 6.1.1.4 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|-----|--|------------------------|--|-----|---|---|--|
| | | | | | сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639 | выраженные нарушения статодинамической функции: значительно выраженный парапарез (либо параплегия), значительно выраженный гемипарез (либо плегия); выраженный/значительно выраженный тетрапарез (тетраплегия); значительно выраженная статическая и динамическая атаксия (самостоятельное передвижение невозможно). Значительно выраженные нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций. Отсутствие контроля функции тазовых органов. Вегетативное состояние | |
| 6.2 | | Наследственная атаксия | | G11 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|---|---------|
| 6.2.1 | | | <p>Врожденная непрогрессирующая атаксия</p> <p>Атаксия Фридрейха (ранняя мозжечковая атаксия)</p> <p>Мозжечковая атаксия с нарушением репарации ДНК</p> <p>Другая наследственная атаксия</p> | <p>G11.0</p> <p>G11.01</p> <p>G11.3</p> <p>G11.8</p> | | | |
| 6.2.1.1 | | | | | <p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы;</p> <p>МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429</p> | <p>Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные нарушения координации и равновесия, целевой моторики; незначительные легкие сенситивно-мозжечковые нарушения, выявляемые только при выполнении специальных тестов, не нарушающие адаптацию и функционирование ребенка.</p> | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | Незначительные нарушения функций организма | |
| 6.2.1.2 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения координации и равновесия, целевой моторики; умеренные сенситивно-мозжечковые нарушения, выявляемые при выполнении обычных движений, нарушающие опору и передвижение, препятствующие формированию возрастных навыков. Умеренные нарушения функций организма | 40 - 60 |
| 6.2.1.3 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; нарушения функций сердечно-сосудистой | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения координации и равновесия, целевой моторики; выраженные сенситивно-мозжечковые нарушения (значительно затрудняется передвижение, выполнение обычных | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---|-------|--|--|----------|
| | | | | | системы; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429 | движений). Выраженные нарушения функций организма | |
| 6.2.1.4 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; нарушения сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженные нарушения координации и равновесия, целевой моторики; значительно выраженные сенситивно-атактические нарушения. Значительно выраженные нарушения функций организма | 90 - 100 |
| 6.2.2 | | | Болезнь Штрюмпелля (наследственная спастическая параплегия) - изолированная и осложненная формы | G11.4 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|---|---------|
| 6.2.2.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций; нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: легкий парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 4 баллов) без ограничения объема активных движений, нарушения опоры и передвижения, без деформаций стоп и формирования контрактур. Незначительные нарушения функций организма | 10 - 30 |
| 6.2.2.2 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций; нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренный парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 3 баллов) с умеренным нарушением способности к передвижению, формирование деформации стоп, контрактур в суставах. Умеренные нарушения функций организма | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|-----------------------|-----|--|--|---------|
| 6.2.2.3 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженный парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 2 баллов) с выраженным нарушением способности к передвижению, с формированием деформации стоп, контрактур в суставах. Выраженные нарушения функций организма | 70 - 80 |
| 6.3 | | | Спинальные амиотрофии | G12 | | | |
| 6.3.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799 | Для детей в возрасте 0 - 3 года: периферический легкий тетрапарез, умеренный парапарез и/или умеренный парез проксимального отдела обеих нижних конечностей (снижение мышечной силы до 3 баллов). Умеренные бульбарные расстройства. Деформации скелета | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|---|---|----------|
| | | | | | (сколиоз, кифосколиоз) с умеренными нарушениями функций дыхательной системы. Нарушение формирования двигательных возрастных навыков | |
| 6.3.2 | | | | Нарушения языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 310 - 399, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 4 - 17 лет: генерализация атрофического процесса: выраженный нижний парапарез, умеренный верхний парапарез. Деформации скелета (сколиоз, кифосколиоз) с выраженными нарушениями функций дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Выраженные бульбарные расстройства. Нарушение контроля функции тазовых органов | 70 - 80 |
| 6.3.3 | | | | Нарушения языковых и речевых, нейромышечных, | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: генерализация | 90 - 100 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|
| | | | | | скелетных и атрофического связанных с процессом: значительно движением с выраженным (статодинамических) периферический функций, функций тетрапарез. Тяжелые сердечно-сосудистой, деформации скелета дыхательной, (сколиоз, кифосколиоз), пищеварительной нарушения функций систем, нарушения дыхательной и мочевого выделительной сердечно-сосудистой функции; систем, достигающих МКФ: В 310 - 399, В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639 | | | |
| 6.4 | | Экстрапирамидные и другие двигательные нарушения | | G20 - G26 | | | | |
| 6.4.1 | | | Дистония Идиопатическая семейная дистония Другие экстрапирамидные и двигательные | G24 G24.1 G25 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|-----|---|---|---------|
| | | | нарушения. Экстрапирамидные и двигательные нарушения при болезнях, классифицированных в других рубриках | G26 | | | |
| 6.4.1.1 | | | | | Нарушения психических функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 199, В 710 - 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: легкие фокальные и генерализованные гиперкинезы не изменяющие физиологическое положение тела, общая целенаправленность движений и действий сохранена. Наличие незначительных нарушений психических функций | 10 - 30 |
| 6.4.1.2 | | | | | Нарушения психических функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные фокальные и генерализованные гиперкинезы, изменяющие физиологическое положение тела и нарушающие | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|---------|--|---------------------------|--|-----------|--|--|---------|
| | | | | | МКФ: В 110 - 199, В 710 - 799 | последовательность и целенаправленность движений и действий. Наличие умеренных нарушений психических функций | |
| 6.4.1.3 | | | | | Нарушения психических функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 199, В 710 - 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные фокальные и генерализованные гиперкинезы (торсионная дистония), сопровождающиеся стойким болевым синдромом, не контролируемые медикаментозным лечением, с фиксированным патологическим положением тела, нарушением равновесия, последовательности и целенаправленности движений и действий. Наличие выраженных нарушений психических функций | 70 - 80 |
| 6.5 | | Демиелинизирующие болезни | | G35 - G37 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------------|---|----------------------------------|--|--|---------|
| | | центральной нервной системы | | | | | |
| 6.5.1 | | | <p>Рассеянный склероз</p> <p>Другая форма острой диссеминированной демиелинизации</p> <p>Другие демиелинизирующие болезни центральной нервной системы</p> | <p>G35</p> <p>G36</p> <p>G37</p> | | | |
| 6.5.1.1 | | | | | <p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции;</p> <p>МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 -</p> | <p>Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствие признаков активности заболевания в соответствии с критериями, в том числе - по данным МРТ. Отсутствие или незначительные нарушения функций организма, в том числе - на фоне терапии ПИТРС. Незначительные нарушения психических функций</p> | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | 539, В 610 - 639 | | |
| 6.5.1.2 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные парезы верхних и/или нижних конечностей, умеренные бульбарные нарушения; частичная атрофия зрительных нервов с умеренными нарушениями сенсорных функций; другие умеренные нарушения функций организма, в том числе - на фоне терапии ПИТРС. Умеренные нарушения психических функций | 40 - 60 |
| 6.5.1.3 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные парезы верхних и/или нижних конечностей, выраженные бульбарные нарушения; нарушение контроля функции тазовых органов, другие выраженные нарушения функций организма, в | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---|------------------|--|--|----------|
| | | | | | системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639 | том числе - на фоне терапии ПИТРС | |
| 6.5.1.4 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженные парезы или параличи верхних и/или нижних конечностей; значительно выраженные бульбарные нарушения, отсутствие контроля функции тазовых органов, другие значительно выраженные нарушения функций организма, в том числе - на фоне терапии ПИТРС | 90 - 100 |
| 6.6 | | | Наследственная и идиопатическая невропатия Наследственная моторная и | G60 G60.0 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|-------------------------|--|--|---|---------|
| | | | сенсорная невропатия | | | | |
| 6.6.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций (осязания; тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности); МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 250 - 299 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: легкий парез нижних конечностей без нарушения опоры и передвижения (снижение мышечной силы до 4 баллов) | 10 - 30 |
| 6.6.2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций (осязания; тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности); | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренный парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 3 баллов); изменение походки ("степаж"); незначительная деформация стоп | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|---------|--|---|---|-----------|---|---|---------|
| | | | | | МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 250 - 299 | | |
| 6.6.3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций (осязания; тактильной, болевой, температурной, вибрационной и других видов чувствительности); МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 250 - 299 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженный парез нижних конечностей (снижение мышечной силы до 2 баллов), деформация стоп, нарушающая опору и передвижение, нарушение координации движений | 70 - 80 |
| 6.7 | | Болезни нервно-мышечного синапса и мышц | | G70 - G73 | | | |
| 6.7.1 | | | Myasthenia gravis и другие нарушения нервно-мышечного синапса | G70 | | | |
| 6.7.1.1 | | | | | Нарушения языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: локальные формы заболевания (глазная), | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | скелетных и медленно текущие, с связанных с незначительными движением нарушениями функций (статодинамических) организма. функций, функций Генерализованная и пищеварительной, бульбарная формы с дыхательной систем; незначительными МКФ: В 310 - 399, В нарушениями функций 210 - 299, В 710 - 799, организма: полная В 510 - 539, В 440 - компенсация при 449 лечении АХЭП или АХЭП в сочетании с глюкокортикоидами или незначительная мышечная слабость и патологическая утомляемость, проявляющаяся только при многократных повторных движениях или длительном статическом напряжении отдельных групп мышц туловища, конечностей, окулярных и краниобульбарных мышц. Положительный результат тимэктомии, позволяющий контролировать заболевание, регресс симптомов | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|---|---------|
| 6.7.1.2 | | | | | Нарушения языковых и речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 440 - 449 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: локальные формы заболевания (глоточно-лицевая) с умеренными бульбарными нарушениями, приводящими к умеренным нарушениям функций организма. Медленно текущая генерализованная форма без нарушения дыхания и сердечной деятельности при наличии умеренных статодинамических нарушений (относительная компенсация АХЭП). Умеренно выраженная мышечная слабость и патологическая утомляемость мышц туловища и (или) проксимальных сегментов конечностей, краниобульбарных мышц на фоне базисной терапии с колебаниями и нарастанием симптомов в течение | 40 - 60 |
|---------|--|--|--|--|--|---|---------|

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | суток, усиливающаяся при физической нагрузке, с учетом удовлетворительного эффекта тимэктомии, приводящие к умеренным нарушениям функций организма | |
| 6.7.1.3 | | | | Нарушения языковых, речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем; МКФ: В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 440 - 449, В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: глоточно-лицевая локальная форма с выраженными бульбарными нарушениями, приводящими к выраженным нарушениям функций организма. Генерализованная форма миастении с выраженными бульбарными расстройствами и миастеническими кризами; малоэффективная тимэктомия; относительная компенсация на фоне приема АХЭП Выраженная мышечная | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|----------|
| | | | | | | слабость и патологическая утомляемость мышц туловища и (или) проксимальных сегментов конечностей, краниобульбарных мышц на фоне недостаточно эффективной базисной терапии, тимолимэктомии и лучевой терапии (при злокачественной тимоме), приводящие к выраженным нарушениям функций организма | |
| 6.7.1.4 | | | | | Нарушения языковых, речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем; МКФ: В 310 - 399, В | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: генерализованная миастения со злокачественным или быстро прогрессирующим течением при неэффективности терапии, со значительно выраженными бульбарными нарушениями, приводящими к значительно | 90 - 100 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 440 - 449; В 410 - 429 | выраженным нарушениям функций органов и систем организма. Значительно выраженная мышечная слабость и патологическая утомляемость мышц туловища, конечностей, дыхательных и (или) краниобульбарных мышц (генерализованная форма), быстро прогрессирующее течение при неэффективной терапии, приводящие к значительновыраженному нарушению функций организма, что требует постоянного применения интубации трахеи с ИВЛ или без нее, использование зондового питания и необходимость в постоянной посторонней помощи и уходе | |
|--|--|--|--|---|--|--|

| | | | | | | | |
|---------|--|--|---|-----|--|--|---------|
| 6.7.2 | | | Первичные поражения мышц (мышечные дистрофии) | G71 | | | |
| 6.7.2.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 710 - 799, В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: снижение мышечной силы верхних и/или нижних конечностей до 4 баллов с сохранением активных движений в суставах в полном объеме. Незначительные нарушения функций организма | 10 - 30 |
| 6.7.2.2 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 710 - 799, В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: снижение мышечной силы верхних и/или нижних конечностей до 3 баллов с умеренным ограничением амплитуды активных движений в суставах, гипотрофией мышц плечевого и тазового пояса. Умеренные нарушения функций организма | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|----------|
| 6.7.2.3 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 710 - 799, В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: снижение мышечной силы верхних и/или нижних конечностей до 2 баллов с выраженным ограничением амплитуды активных движений в суставах; выраженная гипотрофия мышц плечевого и тазового пояса. Выраженные нарушения функций организма | 70 - 80 |
| 6.7.2.4 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 710 - 799, В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: снижение мышечной силы до 1 балла в верхних и/или нижних конечностях, с невозможностью самостоятельного передвижения. Значительно выраженные нарушения функций организма | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------|--|--|--|
| 6.8 | | | Детский церебральный паралич | G80 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 6.8. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при детском церебральном параличе (ДЦП) зависит от клинической формы заболевания, характера и степени выраженности двигательных нарушений (с использованием классификации больших моторных функций (GMFCS) в возрасте 0 - 17 лет и классификации мануальных способностей (MACS) в возрасте 4 - 17 лет), наличия, сочетания и степени выраженности нарушений психических функций (когнитивное снижение, умственная отсталость различных степеней), псевдобульбарного синдрома и связанных с ним нарушений языковых и речевых функций (дизартрия, дисграфия, дислексия и прочие), нарушений сенсорных функций, функций мочевыделительной системы (нарушение или отсутствие контроля функции тазовых органов).</p> | | | | | | | |
| 6.8.1 | | | Спастический церебральный паралич (двойная гемиплегия, спастический тетрапарез) | G80.0 | | | |
| | | | Спастическая диплегия | G80.1 | | | |
| | | | Детская гемиплегия | G80.2 | | | |
| | | | Дискинетический церебральный паралич | G80.3 | | | |
| | | | Атаксический церебральный паралич (атонически-астатическая форма) | G80.4 | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 6.8.1.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: 1-й или 2-й уровень функциональной активности по GMFCS и/или MACS | 10 - 30 |
| 6.8.1.2 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: 3-й уровень функциональной активности по GMFCS и/или MACS. Умеренные нарушения психических, языковых и речевых функций | 40 - 60 |
| 6.8.1.3 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: 4-й уровень функциональной активности по шкале GMFCS и/или MACS. | 70 - 80 |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639 | Выраженные нарушения психических, языковых и речевых функций. Нарушение контроля функции тазовых органов | |
| 6.8.1.4 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушение функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: 5-й уровень функциональной активности по GMFCS и/или MACS. Значительно выраженные нарушения психических, языковых и речевых функций. Значительно выраженные двигательные нарушения: выраженный или значительно выраженный тетрапарез, нижний спастический парапарез, значительно | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | <p>спастико-гиперкинетический синдром: выраженный или значительно выраженный спастический тетрапарез, значительно выраженные асимметричные спастико-гиперкинетические парезы, значительно выраженные комбинированные контрактуры в суставах конечностей; движения в суставах практически отсутствуют (в большей степени вследствие гиперкинезов), значительно выраженный атетоз и/или двойной атетоз и/или торсионная дистония с невозможностью вертикализации, опоры и передвижения.</p> <p>Значительно выраженная туловищная (статическая) атаксия, значительно</p> | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | | умственной отсталости (IQ < 34 баллов). Отсутствие контроля функции тазовых органов | |
| 7 | Болезни глаза и его придаточного аппарата (класс VII) Последствия травм с необратимыми изменениями и очевидным нарушением зрения Врожденные аномалии (пороки развития) глаза и уха | | | H00 - H59 T90.4 Q10 - Q17 | | | |

Примечание к [пункту 7](#).

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций глаза и его придаточного аппарата, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, определяется с учетом возрастной оценки состояния основных зрительных функций (острота зрения в условных единицах (ед.) и поле зрения в градусах (°)). Степень нарушения функций структур органа зрения, ответственных за зрительное восприятие, оценивается по состоянию зрительных функций лучше видящего (или единственного) глаза в условиях оптимальной (максимально переносимой) коррекции. При поражении обоих глаз необходимо учитывать остроту и поле зрения каждого глаза отдельно.

Кроме того, учитываются основные факторы патологического процесса и прогноза, влияющие на степень нарушения зрительных функций: форма и стадия течения заболевания, возрастной период, в который наступил зрительный дефект и степень адаптированности ребенка к нему, активность и системность патологического процесса, результаты электрофизиологических и инструментальных методов обследования, оптимальная (максимально переносимая) коррекция единственного или лучше видящего глаза.

В возрасте от 0 до 3 лет (3 г. 11 мес. включительно), а у неконтактных детей до 5 - 7 лет определение основных зрительных функций количественно (острота зрения; поле зрения) представляет значительные трудности, связанные с особенностями зрительного анализатора, а также возможностью наличия нарушений психических функций у ребенка. Достоверные результаты у таких детей можно получить не ранее 10 - 12 лет, в связи с чем следует проводить качественную оценку состояния зрительных функций, основанную на следующих показателях: отсутствие прямой и содружественной реакции зрачка на свет, отсутствие условного рефлекса смыкания век на приближение к глазу яркого предмета, наличие (отсутствие) кратковременного поворота глаз к свету, отсутствие фиксации взора, слежения за движением ярких предметов, а также визуально определяемые нарушения структуры тканей глазного яблока, нарушение прозрачности преломляющих сред глаза, грубые пролиферативные изменения в стекловидном теле и сетчатке, очаговые изменения в центральных зонах сетчатки, признаки частичной или полной отслойки сетчатки, а также изменение формы, размера и цвета диска зрительного нерва. Количественная оценка нарушенных сенсорных функций у детей до 3 лет проводится по факту наличия или отсутствия предметного зрения.

В возрасте 4 лет и старше количественное определение основных зрительных функций (острота, поле зрения, зрительная работоспособность) осуществляется методами, принятыми в детской экспертной офтальмологической практике. При необходимости углубленного обследования используются данные нистагмометрических, электрофизиологических и офтальмоэргонимических, ультразвуковых методов исследований, а также оптической когерентной томографии, Гейдельбергской томографии.

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|--|---------|
| 7.1 | | | | | Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 210 - 229 (зрения) | Для детей в возрасте 0 - 3 года: наличие предметного зрения | 10 - 30 |
| 7.2 | | | | | Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 210 - 229 (зрения) | Для детей в возрасте 4 - 17 лет: острота зрения лучше видящего (единственного) глаза с оптимальной коррекцией более 0,3. | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | Любая степень концентрического сужения полей зрения лучше видящего (единственного) глаза до 40° при отсутствии скотом | |
| 7.3 | | | | Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 210 - 229 (зрения) | Для детей в возрасте 0 - 3 года: отсутствие предметного зрения | 40 - 60 |
| 7.4 | | | | Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 210 - 229 (зрения) | Для детей в возрасте 4 - 17 лет: острота зрения лучше видящего (единственного) глаза с оптимальной коррекцией более 0,1 до 0,3 включительно. Концентрическое сужение поля зрения лучше видящего (единственного) глаза от 39° до 20° включительно. Центральные абсолютные скотомы лучше видящего (единственного) глаза, 5° и менее | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|---|----------|
| 7.5 | | | | | Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 210 - 229 (зрения) | Для детей в возрасте 4 - 17 лет: острота зрения лучше видящего (единственного) глаза с оптимальной коррекцией 0,1 - 0,05 включительно. Концентрическое сужение полей зрения лучше видящего (единственного) глаза от 19° до 10° включительно. Центральные абсолютные скотомы лучше видящего (единственного) глаза менее 10 градусов, но более 5° | 70 - 80 |
| 7.6 | | | | | Нарушение сенсорных функций; МКФ: В 210 - 229 (зрения) | Для детей в возрасте 4 - 17 лет: острота зрения лучше видящего (единственного) глаза с оптимальной коррекцией от 0,04 до 0 включительно. Концентрическое сужение полей зрения лучше видящего (единственного) глаза от 9° до 0° | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--|---|--|--|--------------|--|--|--|
| | | | | | | включительно. Центральные абсолютные скотомы лучше видящего (единственного) глаза 10° и более | |
| 8 | Болезни уха и сосцевидног о отростка (класс VIII) | | | H60 - H95 | | | |
| <p>Примечание к пункту 8.</p> <p>Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций уха и сосцевидного отростка, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается преимущественно на оценке характера и степени выраженности нарушения функции слуха (степени тугоухости), лучше слышащего (единственного) уха по международной классификации тугоухости. Учитываются также и другие факторы патологического процесса: форма и стадия течения заболевания, возрастной период в котором наступил слуховой дефект, степень адаптивности к нему, вид и особенности осложнений, сочетание с нарушением речи, с нарушением психических функций, факторы прогноза и прочее. При объективизации степени нарушенных функций используются данные электрофизиологических и других специальных методов исследования (акустическая импедансометрия, тональная подпороговая аудиометрия, отоакустическая эмиссия, коротколатентные слуховые вызванные потенциалы). У детей до 3-х летнего возраста оценка нарушений сенсорных функций производится по результатам объективных методов аудиологического исследования: акустическая импедансометрия, отоакустическая эмиссия, коротколатентные слуховые вызванные потенциалы (КСВП), регистрация стационарных слуховых потенциалов (ASSR-тест).</p> <p>При наличии в структуре тугоухости нарушений языковых и речевых функций, количественная оценка которых превышает количественную оценку степени тугоухости, экспертная оценка проводится по ведущему речевому дефекту (см. подпункт 5.1.1).</p> | | | | | | | |
| 8.1 | | | Болезни уха и сосцевидного отростка (потеря слуха (глухота), тугоухость, за исключением | H60 - H95 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------------------------|--|--|--|---------|
| | | | профессионально обусловленных) | | | | |
| 8.1.1 | | | | | Нарушения сенсорных, языковых и речевых функций; МКФ: В 230 - 249 (слуха), В 310 - 399 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: односторонняя тугоухость I - IV степени без речевых нарушений либо с незначительными нарушениями языковых и речевых функций | 10 |
| 8.1.2 | | | | | Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: В 230 - 249 (слуха), В 310 - 399, В 110 - 199 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: двусторонняя тугоухость I (26 - 40 дБ) и II степени (41 - 55 дБ) без речевых нарушений либо с незначительными нарушениями языковых и речевых функций. Двусторонняя тугоухость II степени (41 - 55 дБ) при наличии стойких незначительных нарушений языковых и речевых функций и/или психических функций | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---|---|----|
| 8.1.3 | | | | | Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: В 230 - 249 (слуха), В 310 - 399, В 110 - 199 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: двусторонняя тугоухость II степени (41 - 55 дБ) при наличии стойких умеренных нарушений языковых и речевых функций. Двусторонняя тугоухость III степени (56 - 70 дБ) при отсутствии или наличии стойких нарушений языковых и речевых и/или психических функций (незначительных, умеренных) | 40 |
| 8.1.4 | | | | | Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: В 230 - 249 (слуха), В 310 - 399, В 110 - 199 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: двусторонняя тугоухость IV степени (71 - 90 дБ), в том числе после односторонней или двухсторонней кохлеарной имплантации. Наличие стойких незначительных или умеренных нарушений языковых и речевых функций и/или | 50 |

| | | | | | | | |
|-------|--|------------------------------------|--|--|---|--|----|
| | | | | | | психических функций | |
| 8.1.5 | | | | | Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: В 230 - 249 (слуха), В 310 - 399, В 110 - 199 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: двусторонняя глухота (более 91 дБ), в том числе после односторонней или двухсторонней кохлеарной имплантации. Наличие стойких незначительных или умеренных нарушений языковых и речевых функций и/или психических функций | 60 |
| 8.1.6 | | | | | Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: В 230 - 249 (слуха); В 310 - 399, В 110 - 199 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: сочетание тугоухости III - IV степени (на одно ухо) и глухоты (на другое). Наличие стойких незначительных или умеренных нарушений языковых и речевых функций и/или психических функций | 60 |
| 8.2 | | Комбинированное нарушение зрения и | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--|---|--------------|--|--|---|-----|
| | | слуха, а также нарушения артикуляции (речи) и голосообразования | | | | | |
| 8.2.1 | | | Слепоглухота | | | | |
| 8.2.1.1 | | | | | Нарушение сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: В 210 - 249 (слуха и зрения), В 310 - 399, В 110 - 199 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: двусторонняя тугоухость III степени с высокой степенью слабовидения (острота зрения лучше видящим глазом с максимально переносимой коррекцией 0,1 - 0,05); наличие незначительных, умеренных или выраженных нарушений языковых и речевых и/или психических функций | 80 |
| 8.2.1.2 | | | | | Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: В 230 - 249 (слуха); В 310 - 399, В | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: полная (тотальная) или практическая слепоглухота. Полная (тотальная) или практическая слепота в | 100 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|-------------|--|---|--|----------|
| | | | | | 110 - 199 | сочетании с тугоухостью III - IV степени односторонней или двусторонней; наличие нарушений языковых и речевых и/или психических функций различной степени выраженности | |
| 8.2.1.3 | | | | | Нарушения сенсорных, языковых и речевых, психических функций; МКФ: В 230 - 249 (слуха), В 310 - 399, В 110 - 199 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: высокая степень слабовидения (острота зрения (лучше видящим глазом с максимально переносимой коррекцией в пределах 0,1 - 0,05) в сочетании с односторонней или двусторонней тугоухостью III - IV степени; наличие нарушений языковых и речевых и/или психических функций различной степени выраженности | 90 - 100 |
| 8.2.2 | | | Глухонемота | | | | |
| 8.2.2.1 | | | | | Нарушение сенсорных, языковых и речевых функций; | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: глухонемота при | 60 |

| | | | | | | | |
|---------|--|--|------------------|--|---|---|----------|
| | | | | | МКФ: В 230 - 249 (слуха), В 310 - 399 | отсутствии или незначительными нарушениями психических функций | |
| 8.2.2.2 | | | | | Нарушения психических, сенсорных, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 230 - 249 (слуха), В 310 - 399 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: глухонемота с умеренными или выраженными нарушениями психических функций | 70 - 80 |
| 8.2.2.3 | | | | | Нарушения психических, сенсорных, языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 230 - 249 (слуха), В 310 - 399 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: глухонемота со значительно выраженными нарушениями психических функций | 90 - 100 |
| 8.2.3 | | | Слепоглухонемота | | | | |
| 8.2.3.1 | | | | | Нарушения психических, сенсорных функций, нарушение языковых и речевых функций; МКФ: В 110 - 199, В 210 - 249 (слуха и зрения), В 310 - 399 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: врожденная либо приобретенная полная утрата зрения и слуха, немота; наличие нарушений психических функций различной степени выраженности | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|-----------|--|--|--|
| 9 | Болезни системы кровообращения (класс IX) и патология с поражением преимущественно органов системы кровообращения, представленная в других классах | | | I00 - I99 | | | |
| <p>Примечание к пункту 9. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций сердечно-сосудистой системы организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных болезнями системы кровообращения и патологией с поражением преимущественно органов системы кровообращения, основывается на оценке степени выраженности следующих клинико-функциональных проявлений: недостаточность кровообращения, гипертонический синдром; легочная гипертензия, степень нарушения сердечного ритма, кардиогенные синкопальные состояния. Учитываются также и другие факторы патологического процесса: форма и тяжесть течения патологического процесса, степень активности, частота и тяжесть обострений, распространенность, включение органов-мишеней, наличие осложнений.</p> | | | | | | | |
| 9.1 | | | Эссенциальная (первичная) гипертензия | I10 | | | |
| | | | Гипертензивная болезнь сердца (гипертоническая болезнь с | I11 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|--|--|--|
| | | | преимущественным поражением сердца). | | | | |
| | | | Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением почек | I12 | | | |
| | | | Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца и почек. | I13 | | | |
| | | | Вторичная гипертензия. | I15 | | | |
| | | | Реноваскулярная гипертензия | I15.0 | | | |
| | | | Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек | I15.1 | | | |
| | | | Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям | I15.2 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|------------------------------|-------|---|--|---------|
| | | | Другая вторичная гипертензия | I15.8 | | | |
| 9.1.1 | | | | | Нарушения функций сердечно-сосудистой, мочевыделительной системы, нарушение психических, сенсорных функций; МКФ: В 410 - 429, В 610 - 639, В 110 - 199, В 210 - 299 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: стойкое повышение АД не менее 6 месяцев, резистентное к гипотензивной терапии. Индекс времени гипертензии по данным суточного мониторирования артериального давления (СМАД) 25 - 50%. Поражение органов-мишеней с незначительным нарушением их функции. Артериальная гипертензия I степени высокого риска (наличие 3 и более дополнительных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и/или поражения органов-мишеней и/или наличие сопутствующих состояний) | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---|--|---------|
| 9.1.2 | | | | | Нарушения функций сердечно-сосудистой, мочевыделительной системы, нарушение психических, сенсорных функций; МКФ: В 410 - 429, В 610 - 639, В 110 - 199, В 210 - 299 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: стойкое повышение АД не менее 6 месяцев, резистентное к комбинированной гипотензивной терапии. Индекс времени гипертензии по данным СМАД > 50%. Артериальная гипертензия II степени. Поражение органов-мишеней с умеренными нарушениями функций организма | 40 - 60 |
| 9.1.3 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной систем, нарушение психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410 - 429, В | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: стойкое повышение АД не менее 6 месяцев резистентное к комбинированной гипотензивной терапии. Индекс времени гипертензии по данным СМАД > 60%. Артериальная гипертензия II степени. Поражение органов-мишеней с выраженными нарушениями функций | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|---|-------|---|--|----------|
| | | | | | 440 - 450, В 610 - 639, В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799 | организма | |
| 9.1.4 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной систем, нарушение психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 450, В 610 - 639, В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: стойкое повышение АД не менее 6 месяцев, резистентное к комбинированной гипотензивной терапии. Индекс времени гипертензии по данным СМАД 95 - 100%, среднее АД систолическое 150 - 160 мм рт.ст., АД диастолическое 90 мм рт.ст. Поражение органов-мишеней со значительными нарушениями функций организма | 90 - 100 |
| 9.2 | | | Сердечная недостаточность | I50 | | | |
| | | | Дилатационная кардиомиопатия | I42.0 | | | |
| | | | Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия | I42.1 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|---|-------|--|--|---------|
| | | | Другая гипертрофическая кардиомиопатия | I42.2 | | | |
| | | | Эндокардиальный фиброэластоз | I42.4 | | | |
| | | | Другая рестриктивная кардиомиопатия | I42.5 | | | |
| | | | Последствия травмы внутригрудных органов (сердца) | T91.4 | | | |
| 9.2.1 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН I стадия. ФК I, II | 10 - 30 |
| 9.2.2 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН IIА стадии, ФК II, III | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|---|-----------|--|---|----------|
| 9.2.3 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН IIБ стадии, ФК III, IV | 70 - 80 |
| 9.2.4 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН III стадии, ФК IV | 90 - 100 |
| 9.3 | | | Хронические ревматические болезни сердца | I05 - I09 | | | |
| | | | Неревматические поражения митрального клапана | I34 | | | |
| | | | Неревматические поражения аортального клапана | I35 | | | |
| | | | Неревматические поражения трехстворчатого клапана | I36 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|---|---------|
| 9.3.1 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ревматические и неревматические болезни митрального, аортального, трикуспидального клапанов с незначительными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы: наличие ХСН 0 или I стадии | 10 - 30 |
| 9.3.2 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ревматические и неревматические болезни митрального, аортального, трикуспидального клапанов с умеренными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы: наличие ХСН ПА стадии. | 40 - 60 |
| 9.3.3 | | | | | Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 139, В | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ревматические и неревматические болезни митрального, аортального, трикуспидального | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|---|-----|--|---|----------|
| | | | | | 140 - 189, В 198, В 199, В 410 - 429 | клапанов с выраженными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы: наличие ХСН ПБ стадии | |
| 9.3.4 | | | | | Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 410 - 429, | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ревматические и неревматические болезни митрального, аортального, трикуспидального клапанов со значительно выраженными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы: ХСН III стадии | 90 - 100 |
| 9.4 | | | Наличие сердечных и сосудистых имплантатов и трансплантатов | Z95 | | | |
| 9.4.1 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН 0 или I стадии | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|---|----------|
| 9.4.2 | | | | | Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 199, В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН ПА. Наличие имплантированного ЭКС; наличие сосудистого импланта, периодически требующего замены в связи с ростом ребенка | 40 - 60 |
| 9.4.3 | | | | | Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 110 - 199, В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения функции сердечно-сосудистой системы: ХСН ПБ стадии. Наличие ЭКС-зависимости при имплантированном ЭКС. Наличие имплантированного кардиовертера-дефибрилятора | 70 - 80 |
| 9.4.4 | | | | | Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженные нарушения | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------|--|---|----------|
| | | | | | системы; МКФ: В 110 - 199, В 410 - 429 | функции сердечно-сосудистой системы: ХСН III стадии | |
| 9.5 | | | Наличие трансплантированно го сердца | Z94.1 | | | |
| | | | Наличие трансплантированн ых сердца и легкого | Z94.3 | | | |
| Первичное освидетельствование | | | | | | | |
| 9.5.1 | | | | | Нарушение психических функций, функций сердечно-сосудистой системы; дыхательной системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 110 - 199, В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после трансплантации сердца или одновременно сердца и легкого в течение первых 2 лет | 90 - 100 |
| Повторное освидетельствование (после 2х летнего наблюдения) | | | | | | | |
| 9.5.2 | | | | | Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови и | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|----------------------------------|-------|--|--|----------|
| | | | | | иммунной системы; МКФ: В 110 - 199, В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439 | | |
| 9.5.3 | | | | | Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 110 - 199, В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии осложнений с выраженными нарушениями функций организма | 70 - 80 |
| 9.5.4 | | | | | Нарушения психических функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 110 - 199, В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма | 90 - 100 |
| 9.6 | | | Синдром удлиненного интервала QT | I45.8 | | | |
| | | | Пароксизмальная тахикардия | I47 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|---|---------|
| 9.6.1 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные пароксизмальные нарушения сердечного ритма: пароксизмы тахикардии (аритмии) редкие (до 3 - 4 раз в год), кратковременные (минуты, менее часа), непароксизмальные тахикардии (представленность эктопического ритма менее 35% за сутки по данным суточного ЭКГ мониторинга). Ритм восстанавливается без лечебных мероприятий, при использовании немедикаментозных приемов или после однократного или двукратного приема антиаритмических препаратов. ХСН 0 или наличие ХСН I стадии | 10 - 30 |
| 9.6.2 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные пароксизмальные | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | | нарушения сердечного ритма: пароксизмы тахикардии (аритмии), непароксизмальные тахикардии (представленность эктопического ритма 35 - 70% за сутки по данным суточного ЭКГ мониторингования); показатель скорригированного интервала QT более 470 мс (по данным ЭКГ); кардиогенные синкопальные состояния (частота сердцебиений и длительность пароксизма значения не имеют). Ритм восстанавливается при систематическом (по схеме) использовании антиаритмических препаратов. Наличие ХСН IIА стадии | |
| 9.6.3 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные пароксизмальные | 70 - 80 |

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | | использовании медикаментозных антиаритмических препаратов, применении дополнительной симптоматической терапии. Наличие ХСН IIБ стадии, аритмогенная дисфункция миокарда | |
| 9.6.4 | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженные пароксизмальные нарушения сердечного ритма: непрерывно рецидивирующие пароксизмы тахикардии (аритмии), длящиеся от нескольких часов до суток и более; могут возникать без каких-либо провоцирующих факторов; непароксизмальные тахикардии (представленность эктопического ритма за сутки более 80%); рецидивирующие | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|-------|--|--|---------|
| | | | | | | кардиогенные синкопальные состояния. Ритм восстанавливается при систематическом использовании медикаментозных антиаритмических препаратов, электроимпульсной терапии, применении дополнительной симптоматической терапии. Наличие ХСН III стадии, аритмогенная дисфункция миокарда | |
| 9.7 | | | Предсердно-желудочковая атриовентрикулярная блокада полная | I44.2 | | | |
| | | | Фибрилляция и трепетание предсердий | I48 | | | |
| | | | Другие нарушения сердечного ритма | I49 | | | |
| 9.7.1 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: Стойкие незначительные нарушения сердечного | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | | <p>ритма: плотность экстрасистолии менее 20% за сутки по данным суточного ЭКГ мониторингирования; синусовая брадикардия с частотой сердечных сокращений в пределах ниже 15 - 19% от возрастной нормы, превышение должной длительности пауз ритма по возрасту без нарушения глобальной функции сердца; центральная и периферическая гемодинамика не нарушены, или нарушены незначительно (ХСН 0 или I стадии)</p> | |
| 9.7.2 | | | | | <p>Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429</p> | <p>Для детей в возрасте 0 - 17 лет: стойкие умеренные нарушения сердечного ритма: плотность экстрасистолии более 20% за сутки по данным суточного ЭКГ мониторингирования; синусовая брадикардия с частотой сердечных</p> | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | | сокращений ниже 20% от возрастной нормы вследствие синдрома слабости синусового узла или атриовентрикулярной блокады II степени (с минимальной частотой сердечных сокращений менее 40 ударов в минуту); полная атриовентрикулярная блокада с частотой сокращений желудочков менее 50% от возрастной нормы, паузы ритма более 3,0 секунд; умеренные нарушения глобальной функции сердца (аритмогенная дисфункция миокарда), коронарного кровообращения, церебральной гемодинамики; наличие ХСН IIА стадии | |
| 9.7.3 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: постоянные выраженные нарушения сердечного ритма: плотность | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | экстрасистолии более 30% за сутки по данным суточного ЭКГ мониторингирования; синусовая брадикардия с частотой сердечных сокращений в пределах ниже 25% от возрастной нормы вследствие синдрома слабости синусового узла или атриовентрикулярной блокады II степени (с минимальной частотой сердечных сокращений менее 40 ударов в минуту); полная атриовентрикулярная блокада с частотой сокращений желудочков менее 50% от возрастной нормы, паузы ритма более 3,0 секунд; выраженные нарушения глобальной функции сердца, коронарного кровообращения, церебральной гемодинамики, в том числе синкопальные (обморочные) состояния: наличие | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | | | ХСН IIБ стадии | |
| 9.7.4 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: постоянные значительные выраженные нарушения сердечного ритма с наличием двух и более форм нарушений, относящихся к категории выраженной степени; фибрилляция и трепетание предсердий, фибрилляция желудочков; полная атриовентрикулярная блокада с частотой сокращений желудочков менее 50% от нормы; паузы ритма более 3,5 секунд; выраженные нарушения глобальной функции сердца, коронарного кровообращения, церебральной гемодинамики, в том числе синкопальные (обморочные) состояния; наличие ХСН III стадии | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|---|--------------------|--|---|----------|
| 9.8 | | | Первичная легочная гипертензия Другие уточненные формы легочно-сердечной недостаточности | I27.0 I27.8 | | | |
| 9.8.1 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; дыхательной системы; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 450 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные нарушения функций организма на фоне эффективной специфической терапии: ФК ЛГ I | 10 - 30 |
| 9.8.2 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; дыхательной системы МКФ: В 410 - 429, В 440 - 450 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения функций организма на фоне специфической терапии: ФК ЛГ II | 40 - 60 |
| 9.8.3 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; дыхательной системы; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 450 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения функций организма на фоне специфической терапии: ФК ЛГ III | 70 - 80 |
| 9.8.4 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; дыхательной системы; | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженные нарушения | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------|-------------------------------|---|--|
| | | | | | МКФ: В 410 - 429, В 440 - 450 | функций организма на фоне специфической терапии: ФК ЛГ IV | |
| 10 | Болезни органов дыхания (класс X) и патология с поражением преимущественно органов дыхания, представленная в других классах болезней | | | J00 - J99 | | | |
| <p>Примечание к пункту 10. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных болезнями органов дыхания основывается на оценке степени выраженности хронической дыхательной недостаточности. Учитываются также и другие (клинические) факторы патологического процесса: форма и тяжесть течения, наличие и частота обострений, распространенность патологического процесса, включение органов-мишеней, необходимость подавления иммунитета, наличие осложнений. Степень тяжести ДН оценивается, исходя из газометрических показателей - парциального давления кислорода крови (PaO₂) и сатурации крови кислородом (SaO₂): ДН I степени - PaO₂ 79 - 60 мм.рт.ст., SaO₂ - 90 - 94%; ДН II степени - PaO₂ 59 - 55 мм.рт.ст., SaO₂ - 89 - 85%; ДН III степени - PaO₂ < 55 мм.рт.ст., SaO₂ < 85%.</p> | | | | | | | |
| 10.1 | | | Хронические болезни нижних дыхательных путей (исключая астму) | J40 - J47 | | | |
| | | | Болезни легкого, | J60 - J70 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|---|--|---|--|---------|
| | | | <p>вызванные внешними агентами</p> <p>Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань</p> <p>Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей</p> <p>Другие болезни органов дыхания</p> <p>Синдром Вильсона-Микити</p> <p>Бронхолегочная дисплазия, возникшая в перинатальном периоде</p> | <p>J80 - J84</p> <p>J85 - J86</p> <p>J95 - J99</p> <p>P27.0</p> <p>P27.1</p> | | | |
| 10.1.1 | | | | | Нарушение функций дыхательной системы; МКФ: В 440 - 449 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: легкая или среднетяжелая форма течения заболевания, последствия оперативных | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | вмешательств, с редкими обострениями (2 - 3 раза в год), с бронхиальной обструкцией на фоне базисной терапии без дыхательной недостаточности (ДН 0) либо с ДН I степени | |
| 10.1.2 | | | | Нарушения функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем; МКФ: В 440 - 449; В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: среднетяжелая форма течения заболевания, последствия оперативных вмешательств, с обострениями 4 - 6 раз в год, с бронхиальной обструкцией на фоне базисной терапии при наличии ДН II степени; преходящей или постоянной легочной гипертензии (ХСН 0 или ХСН I стадии) | 40 - 60 |
| 10.1.3 | | | | Нарушения функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем; МКФ: В 440 - 449, В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: среднетяжелая и тяжелая форма течения заболевания, последствия | 70 - 80 |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|---|--|----------|
| | | | | | оперативных вмешательств, с частыми обострениями (более 6 обострений в год) с бронхиальной обструкцией на фоне базисной терапии при наличии ДН II, III степени, ХСН IIА стадии | |
| 10.1.4 | | | | Нарушения функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем; МКФ: В 440 - 449, В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: тяжелая форма течения заболевания, последствия оперативных вмешательств с частыми обострениями (обострения более 6 раз в год) либо непрерывно рецидивирующее течение заболевания с бронхиальной обструкцией; наличие осложнений, в том числе от оперативных вмешательств; ДН III степени, ХСН IIБ, III стадии | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|-------|-----|---|---|---------|
| 10.2 | | | Астма | J45 | | | |
| 10.2.1 | | | | | Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, психических функций, функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 449, В 110 - 199, В 430 - 439, В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: легкое течение заболевания на фоне базисной терапии низкими дозами ингаляционных кортикостероидов; контролируемое или частично контролируемое, с редкими (3 и менее раз в год) сезонными обострениями и/или легкими приступами; ДН 0 или ДН I степени в межприступном периоде | 10 - 30 |
| 10.2.2 | | | | | Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, психических функций, функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 449, В 110 - 199, В 430 - 439, В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: среднетяжелое и тяжелое течение заболевания (на фоне базисной терапии средними дозами ингаляционных кортикостероидов), частично контролируемое течение с более частыми (4 - 6 раз в год) | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|---------------------|-------|---|---|---------|
| | | | | | | обострениями средней или тяжелой степени тяжести; ДН II степени в межприступном периоде | |
| 10.2.3 | | | | | Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, психических функций, функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 449, В 110 - 199, В 430 - 439, В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: тяжелое, неконтролируемое течение на фоне базисной терапии высокими дозами ингаляционных кортикостероидов; с частыми (4 - 6 раз в год) тяжелыми приступами, требующими стационарного лечения, ДН II, ДН III степени в межприступном периоде | 70 - 80 |
| 10.3 | | | Единственное легкое | Z92.4 | | | |
| 10.3.1 | | | | | Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 440 - 449, В 410 - 429, В 430 - 439 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: наличие единственного легкого (врожденное, после пульмонэктомии) | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|-------|---|--|----------|
| 10.3.2 | | | | | Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 440 - 449, В 410 - 429, В 430 - 439 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: наличие единственного легкого (врожденное, после пульмонэктомии) с признаками ДН | 70 - 80 |
| 10.4 | | | Наличие трансплантированного легкого | Z94.2 | | | |
| Первичное освидетельствование | | | | | | | |
| 10.4.1 | | | | | Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 44 - 449, В 410 - 429, В 430 - 439 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после трансплантации легкого в течение первых 2 лет | 90 - 100 |
| Повторное освидетельствование (по истечении срока 2х летнего наблюдения) | | | | | | | |
| 10.4.2 | | | | | Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 440 - 449, В 410 - 429, В 430 - 439 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|---|-----|---|--|----------|
| 10.4.3 | | | | | Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 440 - 449, В 410 - 429, В 430 - 439 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии осложнений с выраженными нарушениями функций организма | 70 - 80 |
| 10.4.4 | | | | | Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 440 - 449, В 410 - 429, В 430 - 439 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма | 90 - 100 |
| 10.5 | | | Респираторные нарушения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках (трахеостома) | J95 | | | |
| 10.5.1 | | | | | Нарушение функций дыхательной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 440 - 449, В 310 - 399 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: наличие функционирующей постоянной трахеостомы, сохранная либо малоразборчивая речь; ДН 0 или ДН I | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|-----------|---|--|---------|
| | | | | | | степени | |
| 10.5.2 | | | | | Нарушение функций дыхательной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 440 - 449, В 310 - 399 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: наличие функционирующей постоянной трахеостомы с выраженными нарушениями языковых и речевых функций, вплоть до потери экспрессивной речи, наличие ДН II или ДН III степени и других осложнений | 70 - 80 |
| 11 | Болезни органов пищеварения (класс XI) и патология с поражением преимущественно органов пищеварения, представленная в других классах болезней. | | | К00 - К93 | | | |

Примечание к [пункту 11](#).

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций пищеварительной системы организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается на оценке формы и тяжести заболевания, активности процесса, наличия и частоты обострений, распространенности патологического процесса, наличия недостаточности питания (белково-энергетической недостаточности, далее - БЭН), включения органов-мишеней, наличия осложнений, а также на данных лабораторных и инструментальных методов исследования.

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|--------------------|--|--|---------|
| 11.1 | | Болезни желудка и двенадцатиперстной кишки | | K20 - K31 | | | |
| 11.1.1 | | | Приобретенное отсутствие части желудка Синдромы оперированного желудка | Z90.3 K91.1 | | | |
| 11.1.1.1 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: наличие незначительного синдрома оперированного желудка (демпинг-синдром, синдром приводящей петли и прочие синдромы) после резекции желудка в различных модификациях; отсутствие | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | недостаточности питания либо наличие БЭН I степени | |
| 11.1.1.2 | | | | Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: наличие умеренного синдрома оперированного желудка (демпинг-синдром, синдром приводящей петли и прочие синдромы) после резекции желудка в различных модификациях; наличие БЭН II степени | 40 - 60 |
| 11.1.1.3 | | | | Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: наличие выраженного синдрома оперированного желудка (демпинг-синдром, синдром приводящей петли и прочие синдромы) после субтотальной или тотальной резекции желудка; наличие БЭН III степени | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|---------------------------|---|--|---------|
| 11.1.2 | | Неинфекционн ный энтерит и колит | | K50 - 52 | | | |
| 11.1.2.1 | | | Болезнь Крона (регионарный энтерит) Язвенный колит Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты | K50 K51 K52 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 11.1.2.1. Количественная оценка нарушений функций пищеварительной системы ребенка в возрасте до 18 лет при НЯК и болезни Крона зависит от степени активности процесса, типа течения и тяжести заболевания, наличия осложнений (внекишечных, кишечных и перианальных); а также от эффективности терапии, осложнений и наличия резистентности к ней.</p> | | | | | | | |
| 11.1.2.1 .1 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 430 - 439 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: длительная клинико-лабораторная ремиссия (1 год и более) с отсутствием клинических симптомов заболевания и лабораторных признаков воспалительной активности, либо с минимальной активностью процесса; хроническое течение | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | заболевания (обострения 1 раз в год и реже) с минимальной активностью процесса (0 - 1 степени) при отсутствии терапии или на фоне проводимой терапии. Отсутствие осложнений заболевания и осложнений от проводимой медикаментозной терапии | |
| 11.1.2.1.2 | | | | Нарушения функций пищеварительной, дыхательной систем, функции сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения психических функций; МКФ: В 510 - 539, В 440 - 449, В 410 - 429, В 430 - 439, В 710 - | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: хроническое рецидивирующее течение (обострения 2 - 3 раза в год) и хроническое непрерывное течение заболевания с умеренной активностью процесса, ведущие к умеренным нарушениям функций организма. Наличие кишечных осложнений, внекишечных проявлений заболевания на фоне | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|---|---|----------|
| | | | | | 799, В 110 - 199 | проводимой базисной терапии | |
| 11.1.2.1 .3 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, дыхательной систем, функции сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения психических функций; МКФ: В 510 - 539, В 440 - 449, В 410 - 429, В 430 - 439, В 710 - 799, В 110 - 199 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: хроническое рецидивирующее течение (обострения 4 - 5 раз в год) и хроническое непрерывное течение заболевания с высокой активностью процесса, свищевая, стенозирующая формы заболевания, ведущие к выраженным нарушениям функций организма. Наличие осложнений заболевания (любых) и осложнений от проводимой медикаментозной терапии | 70 - 80 |
| 11.1.2.1 .4 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, дыхательной систем, функции сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: прогрессирующее течение заболевания с тотальным поражением кишечника, значительно выраженными | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|----------|--|---|--|----------------------------|---|---|---------|
| | | | | | нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения психических функций; МКФ: В 510 - 539, В 440 - 449, В 410 - 429, В 430 - 439, В 710 - 799, В 110 - 199 | нарушениями функций организма (мальабсорбция и мальдигестия тяжелой степени, кахексия, последствия массивной резекции кишечника) | |
| 11.2 | | Другие болезни кишечника Болезни брюшины | | К55 - К64 К65 - К67 | | | |
| 11.2.1 | | | Кишечные сращения (спайки) с непроходимостью | К56.5 | | | |
| 11.2.1.1 | | | | | Нарушение функции пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: спаечная болезнь с редкими (1 - 4 раза в год) приступами кишечной непроходимости, купирующимися консервативными методами терапии (в амбулаторных | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | условиях) | | |
| 11.2.1.2 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: спаечная болезнь с приступами кишечной непроходимости 5 и более раз в год, купирующимися консервативными методами терапии в условиях стационара или требующие оперативного вмешательства (разделение спаек) не более 1 раза в год) | 40 - 60 |
| 11.2.1.3 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: непрерывно рецидивирующее, прогрессирующее течение спаечной болезни, требующее стационарного лечения, не поддающееся консервативной терапии и требующее оперативного вмешательства (разделение спаек, резекция кишки, наложение стомы) | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|---|---------|
| 11.3 | | Болезни печени Вирусный гепатит | | K70 - K77 B15 - B19 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 11.3. Количественная оценка нарушений функций пищеварительной системы ребенка в возрасте до 18 лет при болезнях печени зависит от стадии фиброза печени (по шкале METAVIR, шкале FibroTest), стадии цирроза печени (класс по Чайлд-Пью), фазы патологического процесса (индекс гистологической активности, степень цитолиза, холестаза), степени портальной гипертензии, наличия осложнений (отечно-асцитический, геморрагический синдром - кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода, желудка, геморроидальных вен и других, печеночная энцефалопатия, формирование цирроза-рака и прочие), а также от развития сочетанных клинических синдромов (гепато-пульмонального, гепато-панкреатического, гепато-ренального и других).</p> | | | | | | | |
| 11.3.1 | | | Хронический вирусный гепатит Токсическое поражение печени Хронический гепатит, не классифицированный в других рубриках Фиброз печени | B18 K71 K73 K74.0 | | | |
| 11.3.1.1 | | | | | Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: хронический гепатит с незначительными признаками активности и прогрессирования. Отсутствие фиброза либо незначительные | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|-----------------------|--|--|---------|
| | | | | | | признаки фиброза (A1F0 или A1F1 по шкале METAVIR) | |
| 11.3.1.2 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539; В 430 - 439 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: хронический гепатит с умеренными признаками активности и прогрессирования. Умеренные признаки фиброза (A2F2 по шкале METAVIR) | 40 - 60 |
| 11.3.1.3 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, системы крови и иммунной системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 710 - 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: хронический гепатит с выраженными признаками активности и прогрессирования. Исход в цирроз, выраженные признаки фиброза (A3F4 - по шкале METAVIR) | 70 - 80 |
| 11.3.2 | | | Токсическое поражение печени с циррозом печени | K71.7 | | | |
| | | | Цирроз печени | K74.1 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--------------------------|-----|--|--|---------|
| | | | Врожденный цирроз печени | Q44 | | | |
| 11.3.2.1 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 410 - 429, В 430 - 439, В 110 - 199 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: цирроз печени (A0 - 1, F4 по шкале METAVIR) компенсированный (класс А по Чайлд-Пью). Умеренные нарушения функций организма | 40 - 60 |
| 11.3.2.2 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 410 - 429, В 430 - 439, В 110 - 199 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет цирроз печени (A1 - 3, F4 по шкале METAVIR) субкомпенсированный (класс В по Чайлд-Пью) с выраженными нарушениями функций организма | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------------|--|--|----------|
| 11.3.2.3 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, нарушения психических функций; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 410 - 429, В 430 - 439, В 110 - 199 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет Цирроз печени (A1 - 3, F4 по шкале METAVIR) декомпенсированный (класс С по Чайлд-Пью) со значительно выраженными нарушениями функций организма | 90 - 100 |
| 11.3.3 | | | Портальная гипертензия Синдром Бадда-Киари | K76.6 I82.0 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 11.3.3. Количественная оценка нарушенных функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при различных видах ПГ основывается на стадии ПГ, степени выраженности ВРВП, наличия и частоты кровотечений из варикозно расширенных вен различной локализации, на нарушении функции печени, а также на наличии осложнений (гепатолиенальный синдром, асцит, гидроперикард, гидроторакс, фиброз печени, печеночная энцефалопатия и прочие).</p> | | | | | | | |
| 11.3.3.1 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительное нарушение функций организма при ПГ I степени после оперативного лечения и на фоне стойкой | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 410 - 429, В 430 - 439 | длительной ремиссии (2 - 3 года). Наличие ВРВП 0 - I степени, без кровотечений в анамнезе | |
| 11.3.3.2 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 410 - 429, В 430 - 439 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренное нарушение функций организма при ПГ II степени после оперативного лечения и на фоне стойкой длительной ремиссии (2 - 3 года). Наличие ВРВП II степени | 40 - 60 |
| 11.3.3.3 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, психических функций; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 410 - 429, В 430 - 439, В 110 - 199 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженное нарушение функций организма при ПГ III степени с выраженными проявлениями гиперспленизма; при однократном кровотечении из ВРВ различной локализации. Период послеоперационной компенсации и адаптации после портальной | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|-------|--|---|----------|
| | | | | | | декомпрессии и сочетанных операций | |
| 11.3.3.4 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, эндокринной системы и метаболизма, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, психических функций; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 410 - 429, В 430 - 439, В 110 - 199 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженное нарушение функций организма при ПГ IV стадии со значительно выраженными проявлениями гиперспленизма; при повторяющихся кровотечениях из ВРВ различной локализации; при наличии осложнений. Паллиативное лечение (спленэктомия, гастротомия с перевязкой вен пищеводно-желудочног о перехода, оментогепатопексия); неэффективность хирургического лечения | 90 - 100 |
| 11.3.4 | | | Наличие трансплантированно й печени | Z94.4 | | | |

| Первичное освидетельствование | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|----------|
| 11.3.4.1 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной системы; нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: состояние после трансплантации печени в течение первых 2 лет | 90 - 100 |
| Повторное освидетельствование (по истечении 2х летнего срока) | | | | | | | |
| 11.3.4.2 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной системы; нарушения | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | | психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199 | | |
| 11.3.4.3 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, пищеварительной системы, мочевыделительной системы; нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии осложнений с выраженными нарушениями функций организма | 70 - 80 |
| 11.3.4.4 | | | | | Нарушения функций системы крови и иммунной системы; сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии осложнений со значительно выраженными нарушениями функций | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------|--------------------------|--|---|---------|
| | | | | | пищеварительной системы, мочевыделительной системы; нарушения психических функций; МКФ: В 430 - 439, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 510 - 539, В 610 - 639, В 110 - 199 | организма | |
| 11.4 | | Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы | | K80 - 87 | | | |
| | | | Другие хронические панкреатиты | K86.1 | | | |
| КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. | | | | | | | |
| 11.4.1.1 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: легкое течение заболевания, показатель фекальной эластазы > 200 мкг/г; отсутствие признаков недостаточности | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | | питания на фоне заместительной терапии; незначительные нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы - 100 - 200 мкг\г, незначительные нарушения - уровень компенсации (гликированный гемоглобин HbA1c < 6,5%; гликемия натощак 4 - 8 ммоль\л) с учетом нутритивного статуса/ Незначительные нарушения SDS от -2,0 до -3,0 | |
| 11.4.1.2 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: среднетяжелое течение заболевания, наличие обострений со стационарным лечением (до 3 раз в год включительно); наличие экзокринной недостаточности по фекальной эластазе (от 100 до 200 мкг/г) на | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | фоне заместительной терапии, умеренные нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы 60 - 100 мкг\г; умеренные нарушения эндокринной недостаточности (HbA1c < 7,5 - 9% гликемия более 8 ммоль\л) с учетом нутритивного статуса. Умеренные нарушения SDS от -3,1 до -3,9 | |
| 11.4.1.3 | | | | Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: тяжелое течение заболевания, наличие частых обострений (более 4 раз в год); наличие экзокринной недостаточности по фекальной эластазе (менее 100 мкг/г) на фоне заместительной терапии; выраженные нарушения внешнесекреторной функции поджелудочной железы - менее 50 мкг\г; | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|---|--|-------|--|---|---------|
| | | | | | | выраженные нарушения HbA1c более 9 %; гликемия более 9 ммоль\л) с учетом нутритивного статуса Выраженные нарушения SDS отклонение более чем на - 4 отклонения | |
| 11.5 | | Состояние, связанное с наличием искусственног о отверстия | | Z93 | | | |
| 11.5.1 | | | Наличие гастростомы | Z93.1 | | | |
| | | | Наличие илеостомы | Z93.2 | | | |
| | | | Наличие колостомы | Z93.3 | | | |
| | | | Наличие другого искусственного отверстия желудочно-кишечно го тракта | Z93.4 | | | |
| 11.5.1.1 | | | | | Нарушения функций пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: наличие неустранимого аномального отверстия (стомы) желудочно-кишечного | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|-----------|---|--|---------|
| | | | | | | тракта в рамках паллиативной терапии | |
| 12 | Болезни кожи и подкожной клетчатки (класс XII) | | | L00 - L99 | | | |
| <p>Примечание к пункту 12. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций кожи ребенка в возрасте до 18 лет и связанных с ней систем основывается преимущественно на оценке распространенности, локализации кожного процесса, формы и тяжести течения заболевания, активности процесса, наличия и частоты обострений. Учитывается также необходимость подавления иммунитета, наличие осложнений с поражением органов и систем организма. К редко рецидивирующим формам кожных заболеваний относятся случаи обострения не менее 1 раза в течение последних 3 лет.</p> | | | | | | | |
| 12.1 | | | Буллезные дерматозы | L10 - L15 | | | |
| | | | Линейный IgA зависимый дерматоз | L12.2 | | | |
| | | | Дерматит герпетиформный | L13.0 | | | |
| | | | Субкорнеальный пустулезный дерматит | L13.1 | | | |
| 12.1.1 | | | | | Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849, В 850 - 899 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ограниченные проявления кожного процесса, наличие единичных пузырей на | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|----------------------|-----|---|--|---------|
| | | | | | коже и/или слизистых оболочках, требующие лечения и ухода | | |
| 12.1.2 | | | | | Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849, В 850 - 899 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: распространенные высыпания на коже и/или слизистых оболочках (в том числе внутренних органов), локализованные высыпания на коже активных поверхностей тела (кожа кистей и стоп); требующие лечения и ухода | 40 - 60 |
| 12.2 | | | Атопический дерматит | L20 | | | |
| 12.2.1 | | | | | Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849, В 850 - 899 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ограниченный дерматит с площадью поражения до 10% поверхности тела, или распространенный дерматит с площадью поражения от 10 до 30%; обострения до 3 раз в год на фоне проводимого лечения | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|----------|--|----------------------------|---------|-----------|---|---|---------|
| 12.2.2 | | | | | Нарушение функции кожи и связанных с ней систем МКФ: В 810 - 849, В 850 - 899 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: распространенный или диффузный дерматит с площадью поражения более 30% поверхности тела; обострения более 3 раз в год; склонность к торпидному непрерывно рецидивирующему течению; резистентность к системному лечению | 40 - 60 |
| 12.3 | | Папулосквамозные нарушения | | L40 - L45 | | | |
| 12.3.1 | | | Псориаз | L40 | | | |
| 12.3.1.1 | | | | | Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849, В 850 - 899 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: псориаз с площадью поражения до 10% поверхности тела, редко рецидивирующие (до 2 раз в год) формы заболевания | 10 - 30 |
| 12.3.1.2 | | | | | Нарушения функций кожи и связанных с ней систем, нейромышечных, скелетных и | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: распространенные формы с площадью поражения поверхности | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|--------|--|---|--|-----------|--|---|--|
| | | | | | связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 810 - 849, В 850 - 899, В 710 - 799 | с кожи более 10%, частые обострения (более 2 раз в год); или непрерывно-рецидивирующее течение при неэффективности проводимого системного лечения; ладонно-подошвенный псориаз при неэффективности проводимого системного лечения | |
| 12.4 | | Другие болезни кожи и подкожной клетчатки | | L80 - L99 | | | |
| 12.4.1 | | | Локализованная склеродермия (morphea) | L94.0 | | | |
| | | | Линейная (полосовидная) склеродермия туловища и/или конечностей | L94.1 | | | |
| | | | Прогрессирующая гемиатрофия лица Парри-Ромберга - глубокая линейная склеродермия | L94.1 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--------------|--|--|---------|
| 12.4.1.1 | | | | | Нарушения функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849, В 850 - 899 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: поверхностные формы склеродерм без нарушений или с незначительными нарушениями функции кожи и связанных с ней систем | 10 - 30 |
| 12.4.1.2 | | | | | Нарушения функций кожи и связанных с ней систем, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций; МКФ: В 810 - 849, В 850 - 899, В 710 - 799, В 210 - 299 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: глубокие формы склеродермии при вовлечении в процесс кожи и подкожной клетчатки, фасций, мышц, костей с образованием рубцов (вплоть до укорочения конечности и образования контрактур), сопровождающиеся умеренными нарушениями функций организма (в зависимости от локализации) | 40 - 60 |
| 12.5 | | Врожденные аномалии и пороки развития кожи | | Q80 - Q89 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|--|---|--|---------|
| 12.5.1 | | | Врожденный ихтиоз Q80 Вульгарный ихтиоз Q80.0 X-сцепленный ихтиоз Q80.1 Пластинчатый (ламеллярный) ихтиоз Q80.2 Врожденная буллезная ихтиозиформная эритродермия Q80.3 | | | | |
| 12.5.1.1 | | | | | Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849, В 850 - 899 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: незначительные нарушения функции кожи и связанных с ней систем, хорошо компенсирующиеся на фоне терапии | 10 - 30 |
| 12.5.1.2 | | | | | Нарушения функций кожи и связанных с ней систем, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций; | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: генерализованные формы кератодермии, включая ладонно-подошвенную локализацию, сопровождающиеся нарушением целостности кожных | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|----------------------------------|-----|--|--|---------|
| | | | | | МКФ: В 810 - 849, В 850 - 899, В 710 - 799, В 210 - 299 | покровов, резистентные к терапии | |
| 12.5.2 | | | Врожденный буллезный эпидермолиз | Q81 | | | |
| 12.5.2.1 | | | | | Нарушение функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849, В 850 - 899 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ограниченные формы | 10 - 30 |
| 12.5.2.2 | | | | | Нарушения функций кожи и связанных с ней систем, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций пищеварительной системы; МКФ: В 810 - 849, В 850 - 899, В 710 - 799, В 210 - 299, 510 - 539 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: поражения кожи (в том числе активных поверхностей - кистей, стоп), слизистых оболочек, приводящие к умеренным нарушениям функций организма | 40 - 60 |
| 12.5.2.3 | | | | | Нарушения функций кожи и связанных с ней систем, нейромышечных, | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: поражения кожи, слизистых оболочек, в | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|------------------------|--------------------|-----------|--|---|----|
| | | | | | скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, нарушение функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 810 - 849, В 850 - 899, В 710 - 799, В 210 - 299, В 510 - 539; В 410 - 429, В 610 - 639 | и том числе внутренних органов приводящие к выраженным нарушениям функций организма | |
| 12.6 | | Болезни придатков кожи | | L60 - L75 | | | |
| 12.6.1 | | | Алопеция тотальная | L63.0 | | | |
| 12.6.1.1 | | | | | Нарушения функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 810 - 849, В 850 - 899 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: тотальное облысение с отсутствием бровей и ресниц | 30 |
| 13 | Болезни костно-мышечной системы и | | | M00 - M99 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|--------------|--|--|--|
| | соединительной ткани (класс XIII) | | | | | | |
| <p>Примечание к пункту 13. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций костно-мышечной системы и соединительной ткани организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами, основывается на оценке нарушений функций всех сегментов опорно-двигательного аппарата. При этом учитывается: нарушение функций суставов и всей конечности в целом, позвоночника (каждого отдела и в целом), направление оси конечности (правильное, неправильное), наличие патологических (порочных) установок, оценка состояния мышц конечностей, тазового и плечевого поясов. Имеют значение также и другие факторы: форма и тяжесть течения заболевания, наличие и частота обострений, распространенность и активность патологического процесса, наличие осложнений</p> | | | | | | | |
| 13.1 | | Артропатии | | M00 - M25 | | | |
| | | Системные поражения соединительной ткани | | M30 - 36 | | | |
| | | Спондилопатии | | M45 - 49 | | | |
| 13.1.1 | | | Юношеский (ювенильный) артрит | M08 | | | |
| | | | Юношеский (ювенильный) артрит при болезнях, классифицированных в других рубриках | M09 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----|--|--|--|
| | | | Узелковый полиартериит и родственные состояния | M30 | | | |
| | | | Другие некротизирующие васкулопатии | M31 | | | |
| | | | Системная красная волчанка | M32 | | | |
| | | | Дерматополимиозит | M33 | | | |
| | | | Системный склероз | M34 | | | |
| | | | Другие системные поражения соединительной ткани | M35 | | | |
| | | | Анкилозирующий спондилит | M45 | | | |

Примечание к [подпункту 13.1.1.](#)

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций костно-мышечной системы и соединительной ткани организма ребенка в возрасте до 18 лет обусловленных воспалительными артропатиями (юношеский артрит), системными поражениями соединительной ткани (узелковый полиартериит и родственные состояния, другими некротизирующими васкулопатиями, системной красной волчанкой, дерматополимиозитом, системным склерозом, другими системными поражениями соединительной ткани), а также анкилозирующим спондилитом, основывается преимущественно на оценке степени выраженности нарушений функций органов и систем организма, степени выраженности нарушений функции суставов (наличие и степень контрактуры сустава), позвоночника (степень ограничения подвижности позвоночника), на оценке рентгенологических изменений в суставах и позвоночнике, клинико-лабораторных показателей активности воспалительного процесса, характеристике течения заболевания; оценке степени тяжести заболевания, частоты, длительности и тяжести обострений, объективизированных в условиях стационара, а также на оценке функциональной способности ребенка, наличия осложнений заболевания и эффективности

проводимой медикаментозной терапии. Необходимо учитывать также постоянную потребность (объем и виды) иммуносупрессивной терапии (сочетание препаратов нескольких фармакотерапевтических групп), на фоне которой достигается и сохраняется состояние ремиссии заболевания.

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|---|--|---------|
| 13.1.1.1 | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических), сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 899 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствие или незначительное нарушение функции суставов и/или позвоночника; рентгенологическая стадия I, отсутствие прогрессирования заболевания; отсутствие или наличие обострений (не более 1 раза в год), отсутствие или I степень активности воспалительного процесса на фоне терапии; ФК I; отсутствие осложнений заболевания от проводимой медикаментозной терапии (НПВП) | 10 - 30 |
| 13.1.1.2 | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренное нарушение | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | связанных с движением (статодинамических), сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 899 | функции суставов и/или позвоночника (ФК II степени); рентгенологическая стадия II; вариант заболевания с поражением или без поражения глаз (увеит); прогрессирующее течение заболевания: обострения 2 - 4 раза в год, сохраняющаяся активность воспалительного процесса I или II степени на фоне иммуносупрессивной терапии; необходимость коррекции терапии, возможность достижения ремиссии только при применении иммуносупрессивной терапии препаратами нескольких (2 и более) фармакотерапевтически х групп (за исключением НПВП), в том числе генно-инженерными биологическими препаратами; наличие осложнений | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | заболевания и проводимой медикаментозной терапии | |
| 13.1.1.3 | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических), сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 899 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженное нарушение статодинамической функции, вследствие поражения суставов и/или позвоночника; рентгенологическая стадия II или III, вариант заболевания с поражением или без поражения глаз (uveит); прогрессирующее течение заболевания; частые длительные обострения (более 4 раз в год), ФК II или III; сохраняющаяся активность воспалительного процесса 2 или 3 степени на фоне иммуносупрессивной терапии; возможность достижения ремиссии только при применении иммуносупрессивной терапии препаратами | 70 - 80 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|---|--|----------|
| | | | | | нескольких (2 и более) фармакотерапевтических групп (за исключением НПВП); в том числе генно-инженерными биологическими препаратами; наличие осложнений заболевания и проводимой медикаментозной терапии | |
| 13.1.1.4 | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических), сенсорных функций, функций пищеварительной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма, мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженные нарушения статодинамических функций, обусловленные поражением суставов и/или позвоночника; рентгенологическая стадия III или IV; вариант заболевания с поражением или без поражения глаз (uveит); быстро прогрессирующее течение заболевания; активность воспалительного процесса 3 степени; | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|------|--|--|--|-------------------------|--|---|--|
| | | | | | МКФ: В 710 - 799, В 210 - 299, В 510 - 539, В 440 - 469, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 899 | ФК III или IV; низкая эффективность или резистентность к проводимой иммуносупрессивной терапии препаратами нескольких фармакотерапевтических групп (2 и более, включая генно-инженерные биологические препараты); наличие необратимых осложнений заболевания и проводимой медикаментозной терапии | |
| 13.2 | | Деформирующие дорсопатии Врожденные аномалии (пороки развития позвоночника и костей грудной клетки) | | M40 - M43 Q76 | | | |

Примечание к [подпункту 13.2.](#)

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет,

обусловленных деформацией позвоночника, основывается на оценке клинико-функциональных проявлений заболевания и данных рентгенологического обследования: вид деформации и степень ее выраженности, локализация и протяженность основной дуги деформации и степень ее мобильности, темп прогрессирования деформации за календарный год, степень ограничения подвижности позвоночника, наличие неврологической симптоматики, степень нарушения функций других органов и систем организма, наличие и степень выраженности вторичного дегенеративно-дистрофического поражения позвоночника. Учитываются также результаты консервативного лечения, наличие показаний и противопоказаний для реконструктивной хирургической коррекции, ее эффективность, осложнения, протяженность металлической конструкции, завершенность периода активного роста ребенка, сопутствующие заболевания и сочетание сколиоза с другими пороками развития других органов и систем организма (костно-мышечной, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем).
 Также необходимо учитывать наличие факторов неблагоприятного клинического и реабилитационного прогноза: быстрое прогрессирование, высокая мобильность сколиоза; сочетание различных видов деформации дуги позвоночника; неэффективность реконструктивной хирургической коррекции, дестабилизация металлоконструкции в послеоперационном периоде.

| | | | | | | | |
|----------|--|--|------------------|------------|---|---|---------|
| 13.2.1 | | | Кифоз Сколиоз | M40 M41 | | | |
| 13.2.1.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: медленно прогрессирующий или стабильный тип течения, низкая степень мобильности сколиотической дуги; инфантильные сколиозы (0 - 6 лет), ювенильный сколиоз (7 - 12 лет): I или II степень сколиоза без ограничения или с незначительным ограничением | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | | <p>подвижности позвоночника; юношеские сколиозы (13 - 17 лет): I, II, III степень сколиоза с незначительным/умеренным ограничением подвижности позвоночника; при III степени сколиоза - отсутствие неблагоприятных факторов прогноза. Наличие стабильной металлической конструкции в пределах одного отдела позвоночника</p> | |
| 13.2.1.2 | | | | | <p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, пищеварительной системы; МКФ: В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449,</p> | <p>Для детей в возрасте 0 - 17 лет: быстро прогрессирующий тип течения сколиоза, средняя или высокая степень мобильности сколиотической дуги; III степень сколиоза с умеренным ограничением подвижности позвоночника при наличии</p> | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | В 510 - 539 | неблагоприятных факторов прогноза; III степень сколиоза с выраженным ограничением подвижности позвоночника. Наличие стабильной металлической протяженной конструкции более 1 отдела с выраженным ограничением подвижности позвоночника. Нестабильность металлоконструкции и другие осложнения оперативного лечения. Сочетание сколиотической деформации со стабильной кифотической деформацией III и выше степеней | |
| 13.2.1.3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: IV степень сколиоза, декомпенсированный, с выраженным нарушением функций организма. | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|--|---|---------|
| | | | | | функций сердечно-сосудистой, дыхательной систем, пищеварительной системы; МКФ: В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539 | | |
| 13.2.2 | | | Врожденный сколиоз, вызванный пороком развития кости | Q76.3 | | | |
| <p>Примечание к пункту 13.2.2.</p> <p>Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных врожденным сколиозом, основывается на оценке клинко-функциональных проявлений патологии и данных рентгенологического обследования: вид и форма аномалий (нарушение сегментации, слияния и формирования позвонков), наличие вариантов сочетаний аномалий позвонков и их распространенность, величина деформации позвоночника и наличие деформации грудной клетки, наличие сочетания аномалии позвонков с различными аномалиями ребер и пороками развития других органов и систем, тип течения сколиоза, состояние механизмов компенсации, эффективность хирургической коррекции и протяженность металлической конструкции. Также необходимо учитывать наличие факторов неблагоприятного клинического и реабилитационного прогноза: нарушение сегментации по типу "блокирование через сегмент", угол первичной деформации более 30°, груднопоясничная локализация порока, большое количество заблокированных позвонков с одной стороны, "кифосколиозогенные" пороки, любой вариант спондилолистеза; наличие кифотического компонента.</p> | | | | | | | |
| 13.2.2.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: сколиозы, обусловленные локальным пороком. Угол первичной деформации до 15 - 20°. Отсутствие | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем; МКФ: В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539 | противопоказаний для оперативного лечения; устранение деформации оперативным путем. Отсутствие осложнений и правильное стабильное расположение металлической конструкции | |
| 13.2.2.2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем; МКФ: В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: сколиозы субкомпенсированные, имеющие прогрессирующее течение. Угол первичной деформации от 21° до 30°, наличие прогностически неблагоприятных критериев. Недостаточная коррекция деформации после оперативного лечения; большая протяженность металлической конструкции, дестабилизация металлической конструкции, наличие | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | осложнений | |
| 13.2.2.3 | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: сколиозы декомпенсированные, имеющие прогрессирующее и быстро прогрессирующее течение. Угол первичной деформации более 30°, наличие прогностически неблагоприятных критериев; сколиозы, сочетающиеся с аномалиями развития позвоночного канала и спинного мозга, других органов и систем; неудовлетворительный результат оперативного лечения (рецидив деформации), наличие осложнений с умеренными или выраженными нарушениями функций организма; наличие противопоказаний к | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------------|---|--------------|--|---|----------|
| | | | | | | оперативному вмешательству | |
| 13.2.2.4 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 799, В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: неоперабельные деформации с выраженным или значительно выраженным нарушением функций организма | 90 - 100 |
| 13.3 | | Нарушения плотности кости | | M80 - M85 | | | |
| 13.3.1 | | | Остеопороз с патологическим переломом | M80 | | | |
| | | | Остеопороз без патологического перелома | M81 | | | |

Примечание к подпункту 13.3.1.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет, обусловленных проявлениями остеопороза различного генеза, основывается на частоте возникновения патологических переломов, их множественности, локализации, характера перелома с учетом срока консолидации, исходов. Необходимо принимать во внимание показатели Z-критерия, по величине которого оценивается МПКТ и соответственно риск возникновения патологических переломов. Учитываются результаты рентгенологической диагностики, а также результаты лабораторных показателей нарушений минерального обмена (содержание ионизированной фракции кальция в крови, содержание фосфора в крови, суточная экскреция фосфора и кальция с мочой, экскреция кальция с мочой натошак по отношению к концентрации креатинина в этой же порции мочи).

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---|---------|
| 13.3.1.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710 - 799, В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствуют переломы длинных трубчатых костей. Отсутствуют деформации или имеют место незначительные (менее 7 - 10°) деформации оси конечности или позвоночника, без нарушения или с незначительным нарушением их функций. Z-критерий соответствует остеопении или остеопорозу. Лабораторные показатели фосфорно-кальциевого обмена с незначительными отклонениями. | 10 - 30 |
|----------|--|--|--|--|--|---|---------|

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | Rg-признаки остеопороза отсутствуют | |
| 13.3.1.2 | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710 - 799, В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: патологические переломы длинных трубчатых костей 1 раз в 2 - 3 года с длительным сроком консолидации, деформацией оси конечности более 10°, но менее 20°; вторичная деформация оси позвоночника (сколиоз II и III степени) Z-критерий соответствует тяжелому остеопорозу. Лабораторные показатели фосфорно-кальциевого обмена - умеренные изменения. Выявляются начальные Rg-признаки остеопороза | 40 - 60 |
| 13.3.1.3 | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: патологические переломы длинных | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|--|----------|
| | | | | | <p>движением (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710 - 799, В 540 - 559</p> | <p>трубчатых костей более 1 раза в год, спонтанные переломы. Длительные сроки консолидации. Выраженная (20 градусов и более) деформация оси конечности, возникновение ложных суставов, вторичная деформация оси позвоночника с умеренным нарушением их функций. Z-критерий соответствует тяжелому остеопорозу (очень высокий риск переломов). Лабораторные показатели фосфорно-кальциевого обмена - умеренные, выраженные и значительно выраженные изменения</p> | |
| 13.3.1.4 | | | | | <p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением</p> | <p>Для детей в возрасте 0 - 17 лет: возникновение спонтанного перелома длинных трубчатых</p> | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|-------|---|--|--|
| | | | | | (статодинамических) функций, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 710 - 799, В 540 - 559 | костей при незначительных двигательных и физических нагрузках, включая вес собственного тела. Невозможность вертикализации из-за высокого риска возникновения спонтанного перелома | |
| 13.3.2 | | | Другие нарушения плотности и структуры кости | M85 | | | |
| | | | Единичная (солитарная) киста кости | M85.4 | | | |
| | | | Аневризмальная киста кости | M85.5 | | | |
| | | | Другие кисты костей | M85.6 | | | |

Примечание к [подпункту 13.3.2.](#)

Кисты костей (солитарные кисты длинных трубчатых костей, аневризмальные кисты, кисты в костях таза и телах позвонков) могут быть причиной патологических переломов; нарушения роста кости и развития неврологических осложнений (невропатия, радикулопатия). Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка зависит от локализации и размеров кисты, характера патологического перелома, наличия и степени выраженности неврологических осложнений, эффективности проведенного лечения (наличие укорочения конечности, степень выраженности контрактуры сустава, деформации конечности), наличия рецидивов кист

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---|---------|
| 13.3.2.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: и весь период лечения с при отсутствии осложнений; после завершения лечения - при расположении кисты вне зоны роста, правильном срастании перелома без деформации или с незначительной деформацией оси (плеча, бедра), отсутствии или незначительном ограничении объема движений в смежном суставе, отсутствии рецидивов заболевания после реконструктивной хирургической коррекции | 10 - 30 |
| 13.3.2.2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: и укорочение конечности с (при локализации кисты в зоне роста), требующее повторных оперативных вмешательств с целью ее удлинения (по мере | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|--------|--|-------------------|--|----------|--|--|--|
| | | | | | | роста ребенка). Выраженная деформация оси (плеча, бедра, конечности в целом), требующая оперативной коррекции, наличие неврологических осложнений с умеренным ограничением объема движения в суставах. Рецидив заболевания после проведенного оперативного лечения, требующий повторного оперативного вмешательства | |
| 13.4 | | Другие остеопатии | | M86 - 90 | | | |
| 13.4.1 | | | Другой хронический остеомиелит | M86.5 | | | |
| | | | Другие хронические гематогенные остеомиелиты | M86.6 | | | |
| | | | Остеомиелит неуточненный | M86.9 | | | |

Примечание к подпункту 13.4.1.

Количественная оценка стойких нарушений функций организма человека при хроническом остеомиелите зависит от распространенности, локализации и протяженности очага, частоты, тяжести и длительности обострений, степени активности процесса, включая клинические, рентгенологические и лабораторные данные, состояния окружающих мягких тканей, наличия осложнений (нарушение роста кости, укорочение конечности, деформация и искривление оси кости, контрактуры и анкилозы крупных суставов, патологические вывихи, ложные суставы), необходимости повторного оперативного лечения и его эффективности, а также от поражения других органов и систем вследствие хронической интоксикации.

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 13.4.1.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций системы крови и иммунной системы, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 799; В 430 - 439; В 810 - 899 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: редкие (1 раз в год и реже) непродолжительные (менее 3 недель) обострения | 10 - 30 |
| 13.4.1.2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций системы крови и иммунной системы, функций кожи и связанных с ней | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: обострения свищевой формы остеомиелита средней частоты (до 2 раз в год), средней продолжительности (не менее 4 недель) | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|-------------|---|--------------------------|--|---|---------|
| | | | | | систем; МКФ: В 710 - 799; В 430 - 439; В 810 - 899 | | |
| 13.4.1.3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, нарушение мочевыделительной функции, функций кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 799; В 410 - 429, В 440 - 449, В 510 - 539, В 610 - 639; В 810 - 899 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: рецидивирующий остеомиелит: обострения частые (3 - 4 раза в год), длительные (более 4 недель), формирование умеренных или выраженных контрактур в смежных суставах. Наличие осложнений (ложные суставы, патологические вывихи) | 70 - 80 |
| 13.5 | | Хондропатии | | M91 - 94 | | | |
| 13.5.1 | | | Юношеский остеохондроз головки бедренной кости (Болезнь Легга-Кальве-Пертеса) | M91.1 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---|---------|
| 13.5.1.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: IV или V стадии болезни Пертеса (стадия репарации, стадия исхода) с сохранением анатомических соотношений в тазобедренном суставе, восстановлением функции сустава, или с формированием легкой контрактуры в суставе | 10 - 30 |
| 13.5.1.2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: IV стадия (репарация): при необходимости соблюдения ортопедического режима с дозированной нагрузкой с дополнительной опорой. V стадия (исход): осложненная формированием выраженной контрактуры в тазобедренном суставе (с одной стороны), подвывиха бедра (с одной стороны) с | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|-----------|---|--|---------|
| | | | | | | выраженной гипотрофией мышц бедра и ягодичных мышц, с укорочением конечности (более 4 см) | |
| 13.5.1.3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: I и II стадия (некроз и импрессионный перелом), III стадия (фрагментации) на весь период полной иммобилизации | 70 - 80 |
| 14 | Болезни мочеполовой системы (класс XIV) и патология с поражением преимущественно органов мочеполовой системы, представленная в других классах болезней | | | N00 - N99 | | | |

примечание к пункту 14.

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка, обусловленных болезнями мочеполовой системы, основывается преимущественно на оценке степени выраженности нарушения функции почек в соответствии с классификацией хронической болезни почек (далее - ХБП). Учитываются также и другие факторы патологического процесса, форма и тяжесть течения заболевания, активность процесса, наличие и частота обострений, распространенность патологического процесса, включение органов - мишеней, необходимость подавления иммунитета, наличие осложнений (вторичный пиелонефрит, мочекаменная болезнь и прочие). В большинстве представленных случаев (за исключением болезней, указанных в подпунктах 14.3 и 14.4 настоящей количественной системы оценки) незначительная степень нарушения мочевыделительной функции организма характеризуется отсутствием хронической болезни почек, либо ее начальными стадиями (ХБП 1 и ХБП 2 стадии); умеренная степень - наличием ХБП 3 стадии (3А и 3Б), выраженная и значительно выраженная степень нарушения мочевыделительной функции характеризуется хронической болезнью почек 4 и 5 стадий соответственно. В основе стратификации стадий ХБП лежит уровень скорости клубочковой фильтрации (далее - СКФ), который отличается у детей разных возрастов.

| | | | | | | | |
|------|--|--|---|----------------------------|--|--|--|
| 14.1 | | | Гломерулярные болезни (хронический нефритический синдром, нефротический синдром) Тубулоинтерстициальные болезни почек: исключая обструктивную уропатию и рефлюкс-уропатию (или гидронефроз - N13) и хронический обструктивный пиелонефрит (N11), предусмотренные подпунктами 14.3 и | N00 - N08 N10 - N16 | | | |
|------|--|--|---|----------------------------|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--------------|--|---|---------|
| | | | 14.4 настоящей количественной системы оценки | | | | |
| | | | Почечная недостаточность (включая хроническую болезнь почек) | N17 - N19 | | | |
| 14.1.1 | | | | | Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 610 - 639 | Дети 0 - 12 месяцев: СКФ ниже возрастной нормы на 10 - 20%; дети старше 1 года: ХБП 1 стадии, СКФ более 90 мл/мин/1,73 м ² ; ХБП 2 стадии, СКФ в пределах 89 - 60 мл/мин/1,73 м ² | 10 - 30 |
| 14.1.2 | | | | | Нарушения мочевыделительной функции, функции системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 430 - 439, В 540 - 559 | Дети 0 - 12 месяцев: СКФ ниже возрастной нормы на 30%; дети старше 1 года: ХБП 3А стадии, СКФ 59-45 мл/мин/1,73 м ² ; ХБП 3Б стадии, СКФ 44-30 мл/мин/1,73 м ² . Любая стадия ХБП при заболеваниях с частыми обострениями или при латентном течении заболевания с высокой | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|-------------------------------|-------|---|--|----------|
| | | | | | | степенью активности патологического процесса; нуждаемость в препаратах, подавляющих иммунитет; неэффективность лечения; при наличии осложнений | |
| 14.1.3 | | | | | Нарушения мочевыделительной функции, функции системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 430 - 439, В 540 - 559 | Дети 0 - 12 месяцев: СКФ ниже возрастной нормы на 40%; дети старше 1 года: ХБП 4 стадии, СКФ 29-15 мл/мин/1,73 м ² | 70 - 80 |
| 14.1.4 | | | | | Нарушения мочевыделительной функции, функции системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 430 - 439, В 540 - 559 | Дети 0 - 12 месяцев: СКФ ниже возрастной нормы на более 50%; дети старше 1 года: ХБП 5 стадии, СКФ ниже 15 мл/мин/1,73 м ² | 90 - 100 |
| 14.2 | | | Помощь, включающая гемодиализ | Z49 | | | |
| | | | Подготовительные | Z49.0 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|----------------------------------|-------|--|--|----------|
| | | | процедуры для проведения диализа | | | | |
| | | | Экстракорпоральный диализ | Z49.1 | | | |
| | | | Другой вид диализа | Z49.2 | | | |
| 14.2.1 | | | | | Нарушения мочевыделительной функции, статодинамических, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639; В 710 - 789, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559 | Дети 0 - 12 месяцев: СКФ ниже возрастной нормы на более 40%; дети старше 1 года: СКФ 29 - 15 мл/мин/1,73 м ² | 70 - 80 |
| 14.2.2 | | | | | Нарушения мочевыделительной функции, статодинамических, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной | Дети 0 - 12 месяцев: СКФ ниже возрастной нормы более 50%; дети старше 1 года: СКФ ниже 15 мл/мин/1,73 м ² | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639; В 710 - 789, В 110 - 139, В 140 - 189, В 198, В 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559 | | |
| 14.3 | | | Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия (гидронефроз) Хронический тубулоинтерстициальный нефрит (в том числе хронический обструктивный пиелонефрит) Мочекаменная болезнь Другие болезни почки и мочеточника | N13 N11.1 - N11.9 N20 - N23 N25 - N29 | | | |
| 14.3.1 | | | | | Нарушения мочевыделительной функции, функций эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: обструктивный уретерогидронефроз с обострением хронического пиелонефрита до 2 раз в | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | | год и реже, без нарушения функции почек либо с развитием ХБП 1 или 2 стадии | |
| 14.3.2 | | | | | Нарушения мочевыделительной функции, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639; В 110 - 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: обструктивный уретерогидронефроз с обострением хронического пиелонефрита от 2 до 4 раз в год; развитие ХБП 3 стадии | 40 - 60 |
| 14.3.3 | | | | | Нарушения мочевыделительной функции, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639; В 110 - 199, В 410 - 429, | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: обструктивный уретерогидронефроз с обострением хронического пиелонефрита более 4 раз в год; развитие ХБП 4 стадии | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|-------|--|--|---------|
| | | | | | В 430 - 439, В 540 - 559 | | |
| 14.4 | | | Приобретенное отсутствие почки | Z90.5 | | | |
| | | | Агенезия и другие редукционные дефекты почки | Q60 | | | |
| 14.4.1 | | | | | Нарушения мочевыделительной функции, функции эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: единственная почка, ХБП 1 или 2 стадии | 30 |
| 14.4.2 | | | | | Нарушения мочевыделительной функции, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639; В 110 - 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: единственная почка, ХБП 3 стадии | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|---|--|----------|
| 14.4.3 | | | | | Нарушения мочевыделительной функции, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 110 - 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: единственная почка; ХБП 4 стадии | 70 - 80 |
| 14.4.4 | | | | | Нарушения мочевыделительной функции, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 110 - 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: хронический пиелонефрит единственной почки, ХБП 5 стадии | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|-------|---|--|----------|
| 14.5 | | | Наличие трансплантированной почки | Z94.0 | | | |
| Первичное освидетельствование | | | | | | | |
| 14.5.1 | | | | | Нарушения мочевыделительной функции, нарушения статодинамических, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 710 - 799, В 110 - 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: состояние после трансплантации почки в течение первых 2 лет | 90 - 100 |
| Повторное освидетельствование (по истечении 2х летнего срока) | | | | | | | |
| 14.5.2 | | | | | Нарушения мочевыделительной функции, нарушения статодинамических, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии осложнений с умеренными нарушениями функций организма | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|---|---|----------|
| | | | | | системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 710 - 799, В 110 - 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559 | | |
| 14.5.3 | | | | | Нарушения мочевыделительной функции, нарушения статодинамических, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 710 - 799, В 110 - 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии осложнений с выраженными нарушениями функций организма | 70 - 80 |
| 14.5.4 | | | | | Нарушения мочевыделительной функции, нарушения статодинамических, психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, системы крови и иммунной | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|------|--|--|--|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | системы; эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 610 - 639, В 710 - 799, В 110 - 199, В 410 - 429, В 430 - 439, В 540 - 559 | | |
| 14.6 | | | Обтурация шейки мочевого пузыря различной этиологии | N32.0 | | | |
| | | | Стриктура уретры | N35 | | | |
| | | | Уретральный свищ (уретроперинеальны й, уретроректальный, мочевой) | N36.0 | | | |
| | | | Послеоперационная стриктура уретры | N99.1 | | | |
| | | | Поликистоз почки, детский тип | Q61.1 | | | |
| | | | Врожденный гидронефроз | Q62.0 | | | |
| | | | Атрезия и стеноз мочеточника: стеноз лоханочно-мочеточ никового сегмента (ЛМС), стеноз | Q62.1 | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|---|-------|--|---|---------|
| | | | пузырно-мочеточникового сегмента (ПМС) | | | | |
| | | | Врожденный мегауретер | Q62.2 | | | |
| | | | Врожденный пузырно-мочеточниковый рефлюкс | Q62.7 | | | |
| 14.6.1 | | | | | Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после окончания оперативного лечения при наличии незначительного нарушения мочевыделительной функции: обострения вторичного пиелонефрита до 2 раз в год; отсутствие нарушений функции почек, ХБП 1 или 2 стадии | 10 - 30 |
| 14.6.2 | | | | | Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: на весь период проведения многоэтапного оперативного лечения, сопровождающегося наличием | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | искусственных отверстий мочевого тракта; после окончания оперативного лечения при наличии умеренного нарушения мочевыделительной функции: обострения вторичного пиелонефрита от 2 до 4 раз в год, латентное течение пиелонефрита; ХБП 3 стадии | |
| 14.6.3 | | | | Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: на весь период проведения многоэтапного оперативного лечения, сопровождающегося наличием мочевых свищей; длительной и/или постоянной катетеризацией мочевого пузыря. После окончания оперативного лечения при наличии выраженного нарушения мочевыделительной | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|---|--------------------|--|--|---------|
| | | | | | | функции: обострения вторичного пиелонефрита более 4 раз в год; ХБП 4 стадии | |
| 14.7 | | | Наличие цистостомы Наличие искусственных отверстий мочевого тракта (нефростомы, уретростомы, уретеростомы) | Z93.5 Z93.6 | | | |
| 14.7.1 | | | | | Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: наличие неустраняемого аномального отверстия (стомы) мочевого тракта в рамках паллиативной терапии | 40 - 60 |
| 15 | Врожденные аномалии (пороки), деформации и хромосомные болезни (Класс XVII) | | | Q00 - Q99 | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------|--|--|----------|
| <p>Примечание к пункту 15. Количественная оценка нарушения функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при врожденных аномалиях (пороках), деформациях и хромосомных болезнях зависит от заболевания, характера течения, степени нарушенных функций органов и систем организма, от эффективности проводимой терапии, резистентности к ней, а также от прогноза врожденной и наследственной патологии.</p> | | | | | | | |
| 15.1 | | Врожденные аномалии (пороки развития) нервной системы | | Q00 - Q07 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 15.1. Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при врожденных аномалиях нервной системы зависит от характера порока, от содержимого и локализации грыжевого мешка, размера структурных нарушений вещества головного или спинного мозга (по результатам КТ, МРТ) клинико-функциональных проявлений порока или аномалии: выраженности двигательных нарушений, степени неврологического дефицита, когнитивного и интеллектуального снижения, наличия судорожных пароксизмов и их вида, частоты, тяжести, резистентности к противосудорожной терапии. Учитывается также клинический прогноз возможность хирургической коррекции порока, его эффективность, наличие осложнений, сочетание с пороками развития других органов и систем организма (зрения, слуха, опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и других систем), степень нарушений психических, речевых и языковых, сенсорных, статодинамических и других функций организма.</p> | | | | | | | |
| 15.1.1 | | | Анэнцефалия и подобные пороки развития (ацефалия, гемицефалия) | | | | |
| 15.1.1.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: ацефалия и гемицефалия со снижением интеллекта | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--------------|-----|---|---|---------|
| | | | | | <p>скелетных и менее 34 баллов, связанных с значительно движением выраженными (статодинамических) функциями, нарушениями (тетра-; дыхательной, геми-, парализованы); значительной, выразительными, пищеварительной систем, резистентными к мочеиспускательной функции; терапии МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639</p> | | |
| 15.1.2 | | | Энцефалоцеле | Q01 | | | |
| 15.1.2.1 | | | | | <p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромускульных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 199, В</p> | <p>Для детей в возрасте 0 - 17 лет: менингоцеле небольших размеров (дефект костей черепа не более 2 x 2 см) и средних размеров (более 2 x 2, но менее 3 x 3 см) после радикальной оперативной коррекции</p> | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|
| | | | | 210 - 299, В 310 - 399, 710 - 799 | без осложнений при отсутствии или незначительных нарушениях функций организма: 0 - 3 года - развитие по возрасту или незначительное отставание в физическом, психомоторном, речевом развитии, формировании социальных навыков; старше 3 лет - незначительные когнитивные нарушения; незначительное снижение интеллекта (3 - 15 лет: IQ = 70 - 79 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов); редкие пароксизмальные расстройства; незначительные нарушения устной и/или письменной речи; незначительные нарушения статодинамических и сенсорных функций (зрения и/или слуха) | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|--|--|

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|---|--|---------|
| 15.1.2.2 | | | | <p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, дыхательной систем, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 79, В 510 - 539, В 540 - 550, В 610 - 639</p> | <p>Для детей в возрасте 0 - 17 лет: менингоцеле больших размеров (дефект костей черепа 3 x 3 см и более) после радикальной оперативной коррекции при наличии умеренных нарушений функций организма: 0 - 3 года - умеренное отставание в физическом, психомоторном, речевом развитии, формировании социальных навыков; дети старше 3 лет - умеренные когнитивные нарушения, умеренное снижение интеллекта (3 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 баллов); умеренные пароксизмальные расстройства; умеренный псевдобульбарный синдром; умеренные нарушения устной и/или письменной речи;</p> | 40 - 60 |
|----------|--|--|--|---|--|---------|

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | двигательные нарушения (умеренные тетра, геми-, парапарезы); нарушения сенсорных функций и иные нарушения | |
| 15.1.2.3 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, дыхательной систем, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 79, В 510 - 539, В 540 - 550, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: энцефаломенингоцеле после частичной оперативной коррекции при наличии осложнений, выраженных нарушений функций организма: 0 - 3 года - выраженное отставание в физическом, психомоторном, речевом развитии, формировании социальных навыков; старше 3 лет - выраженные когнитивные нарушения; выраженное снижение интеллекта (3 - 17 лет: IQ= 35 - 49 баллов); выраженные пароксизмальные | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | | | расстройства, резистентные к терапии; выраженный псевдобульбарный синдром, выраженные нарушения устной и/или письменной речи; нарушение контроля функции тазовых органов | |
| 15.1.2.4 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных функций, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; функций пищеварительной системы, дыхательной системы, нарушения мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539; В 540 - 550, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: энцефалоцистоменингоцеле больших размеров, не подлежащая радикальной оперативной коррекции; значительно выраженные нарушения функций организма: 0 - 3 года - значительно выраженное отставание в физическом, психомоторном и речевом развитии; отсутствие формирования социальных навыков; дети старше 3 лет: значительно выраженное снижение интеллекта (IQ = 34 | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | балла для всех возрастов), значительно выраженный псевдобульбарный синдром; значительно выраженные речевые нарушения (возможно примитивное общение при помощи звуков, жестов либо устная речь отсутствует), значительно выраженные двигательные нарушения (тетра-, геми-, парапaresы или плегии в сочетании с гиперкинезами и атаксией), синдромы эпилептических энцефалопатий (синдромы Веста, Айкарди, Отахара, Леннокса-Гасто и прочие), резистентные к противосудорожной терапии, нарушения сенсорных функций и иные нарушения. Отсутствие контроля функции тазовых органов | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|------------|--|--|---------|
| 15.1.3 | | | Микроцефалия Другие врожденные аномалии (пороки развития) мозга | Q02 Q04 | | | |
| 15.1.3.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: Незначительные нарушения функций организма: 0 - 3 года - незначительное отставание в физическом, психомоторном, речевом развитии, в темпах формирования социальных навыков; дети старше 3 лет - незначительное снижение интеллекта (3 - 15 лет: IQ = 70 - 79 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов); наличие незначительных когнитивных нарушений, нарушений устной и/или письменной речи, редких пароксизмальных расстройств, | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | незначительных нарушений сенсорных функций (зрения и/или слуха) | |
| 15.1.3.2 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения функций организма: 0 - 3 года - умеренное отставание в физическом, психомоторном, речевом развитии, в формировании социальных навыков; старше 3 лет - умеренные когнитивные нарушения; умеренное снижение интеллекта (3 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 баллов); умеренные нарушения устной и/или письменной речи; пароксизмальные расстройства средней частоты; умеренные нарушения сенсорных функций | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|---|--|----------|
| 15.1.3.3 | | | | <p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639</p> | <p>Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения функций организма: 0 - 3 года - выраженное отставание физического, психомоторного, речевого развития, формирования социальных навыков; старше 3 лет - выраженное снижение интеллекта (IQ = 35 - 49 баллов); выраженные когнитивные нарушения; выраженные нарушения устной и/или письменной речи; частые пароксизмальные расстройства; выраженные нарушения сенсорных функций; нарушение контроля функции тазовых органов</p> | 70 - 80 |
| 15.1.3.4 | | | | <p>Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных,</p> | <p>Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженные нарушения функций организма:</p> | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639 | 0 - 3 года - значительно выраженное отставание физического, психомоторного, речевого развития; отсутствие формирования социальных навыков; старше 3 лет - значительно выраженное снижение интеллекта (IQ < 34 баллов); значительно выраженные речевые нарушения (возможно примитивное общение при помощи звуков, жестов либо устная речь отсутствует), синдромы эпилептических энцефалопатий (синдромы Веста, Айкарди, Отахара, Леннокса-Гасто и прочие синдромы); резистентные к противосудорожной терапии, нарушения сенсорных функций. Отсутствие контроля функции тазовых органов | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|--|-------------------------|-----|--|--|---------|
| 15.1.4 | | | Врожденная гидроцефалия | Q03 | | | |
| 15.1.4.1 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: удовлетворительные результаты проведения радикальной эндоскопической коррекции гидроцефалии (компенсация или субкомпенсация); компенсированная гидроцефалия в период динамического наблюдения без необходимости оперативного лечения (отсутствие ликвородинамических нарушений). Отсутствие нарушений или незначительные нарушения функций организма: 0 - 3 года - незначительное отставание физического, психомоторного, речевого развития, формирования социальных навыков; | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | | старше 3 лет - незначительное снижение когнитивных процессов, незначительное снижение интеллекта (3 - 15 лет: IQ = 70 - 79 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов), незначительные нарушения устной и/или письменной речи; незначительные нарушения сенсорных и статодинамических функций | |
| 15.1.4.2 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: прогрессирующий рост окружности головы несмотря на проводимое консервативное лечение; неэффективность эндоскопической коррекции гидроцефалии; установка имплантируемой клапанно-дренажной системы (шунтозависимая | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---|---------|
| 15.1.4.3 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639 | функций Для детей в возрасте 0 - 17 лет: прогрессирующий рост окружности головы в динамике; нарастание неврологической симптоматики (активная гидроцефалия); неэффективность оперативного лечения, дисфункция шунта после вентрикулоперитонеального шунтирования (1 раз и более в год) с частыми ликвородинамическими кризами; повторное шунтирование. Выраженные нарушения функций организма: 0 - 3 года - выраженное отставание в физическом, психомоторном, речевом развитии, формировании социальных навыков; старше 3 лет - выраженное снижение | 70 - 80 |
|----------|--|--|--|--|--|---|---------|

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | | | когнитивных процессов; выраженное снижение интеллекта (3 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 баллов); выраженные нарушения устной и/или письменной речи; двигательные нарушения (умеренный тетрапарез, выраженные пара-, гемипарезы); частые пароксизмальные расстройства; нарушения сенсорных функций. Нарушение контроля функции тазовых органов | |
| 15.1.4.4 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: высокий темп прогрессирования гидроцефалии несмотря на проводимое лечение со значительно выраженными нарушениями функций организма: 0 - 3 года - значительно выраженное отставание | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|
| | | | | | мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 610 - 639 | физического, психомоторного, речевого развития, отсутствие формирования социальных навыков; старше 3 лет - значительно выраженное снижение интеллекта (IQ < 34 баллов), значительно выраженные речевые нарушения (возможно примитивное общение при помощи звуков, жестов либо устная речь отсутствует); наличие синдромов эпилептических энцефалопатий (синдромы Веста, Айкарди, Отахара, Леннокса-Гасто и прочие синдромы), резистентные к противосудорожной терапии, двигательные нарушения (параличи, парезы до плегии, атаксия); нарушения сенсорных функций (слепота, глухота). Отсутствие контроля функции тазовых | |
|--|--|--|--|--|---|---|--|

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|-------|--------------------------------------|--|---------|
| | | | | | | органов | |
| 15.1.5 | | | <p>Spina bifida (неполное закрытие позвоночного канала) (истинные спинномозговые грыжи: открытое расщепление позвоночника с формированием кистозной спинномозговой грыжи Spina bifida cystica uverta (менингоцеле);</p> <p>корешковая форма спинномозговой грыжи (менингоградикулоцеле);</p> <p>мозговая форма (менингомиелоцеле или менингомиелорадикулоцеле)</p> <p>Гипоплазия и дисплазия спинного мозга</p> | Q05 | | | |
| 15.1.5.1 | | | | Q06.1 | Нарушения нейромышечных, скелетных и | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: расщепление | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | позвоночника (2 - 3 позвонков) с формированием спинномозговой грыжи без элементов нервной ткани в грыжевом мешке (менингоцеле), с элементами корешков спинного мозга менингоградикулоцеле) с отсутствием или с минимальной неврологической симптоматикой, незначительными нарушениями статодинамических функций; с благоприятным прогнозом при своевременной оперативной коррекции | |
| 15.1.5.2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 799, В | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: расщепление позвоночника (3 - 5 позвонков) с формированием менингоградикулоцеле с умеренной неврологической симптоматикой, умеренными | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | 210 - 299, В 610 - 639 | нарушениями статодинамических функций; возможны нарушения сенсорных функций (снижение остроты зрения и/или слуха оценивается в зависимости от степени выраженности); нарушение контроля функции тазовых органов | |
| 15.1.5.3 | | | | | Нарушения психических, языковых и речевых; нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 710 - 799, В 210 - 299, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: расщепление позвоночника на любом протяжении с вовлечением спинного мозга и/или его элементов (менингомиелоцеле, мелоцистоцеле) с выраженной неврологической симптоматикой, с нарушениями сенсорных функций (снижение остроты зрения и/или слуха), с нарушением контроля функции тазовых органов, с формированием | 70 - 80 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | | различных деформаций нижних конечностей, приводящих к выраженным нарушениям статодинамических функций. Любой вариант спинномозговой грыжи, сочетающийся с пороками развития головного или спинного мозга на другом уровне с выраженными нарушениями функций организма | |
| 15.1.5.4 | | | | Нарушения психических, языковых и речевых, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: В 110 - 199, В 310 - 399, В 710 - 799, В 210 - 299, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: расщепление позвоночника на любом протяжении с вовлечением в порок развития спинного мозга и/или его элементов (менингомиелоцеле, миелоцистоцеле) со значительно выраженной неврологической симптоматикой (нижняя параплегия, значительно | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|------|--|--|--|-----------|--|--|--|
| | | | | | | выраженный нижний парапарез), с отсутствием контроля функции тазовых органов, с формированием различных деформаций нижних конечностей, приводящих к значительным выраженным нарушениям статодинамических функций. Любой вариант спинномозговой грыжи, сочетающийся с пороками развития головного или спинного мозга на любом уровне со значительными выраженными нарушениями функций организма | |
| 15.2 | | Врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения | | Q20 - Q28 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|--------------|--|--|---------|
| 15.2.1 | | | Врожденные аномалии (пороки развития) сердечных камер и соединений, сердечной перегородки, легочного, трехстворчатого, аортального и митрального клапанов. Другие врожденные аномалии (пороки развития) сердца | Q20 - Q24 | | | |
| 15.2.1.1 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; МКФ: В 410 - 429 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: пороки сердца и крупных сосудов до проведения оперативного лечения и после радикального оперативного устранения порока, не приводящие к недостаточности кровообращения или с незначительными нарушениями функций сердечно-сосудистой системы: наличие ХСН 0 или I стадии, ФК I; без нарушений либо с | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | незначительными нарушениями сердечного ритма и проводимости, гемодинамически не значимыми | |
| 15.2.1.2 | | | | Нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, мочевыделительной функции, психических, сенсорных функций; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 450, В 610 - 639, В 110 - 199, В 210 - 299 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: пороки сердца и крупных сосудов до проведения оперативного лечения и после радикального оперативного устранения порока с умеренными нарушениями гемодинамики и функций сердечно-сосудистой системы: ХСН IIА стадии, ФК II (подтвержденные клинико-лабораторным и данными и данными инструментальных методов обследования); умеренные нарушения сердечного ритма и проводимости: желудочковые экстрасистолы (представленность | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | хирургическом вмешательстве, в том числе с использованием протезных материалов. Сложные пороки на период проведения этапного хирургического лечения или паллиативного лечения | |
| 15.2.1.3 | | | | Нарушения функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, мочевыделительной функции, психических, сенсорных функций; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 450, В 610 - 639, В 110 - 199, В 210 - 299 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: пороки сердца и крупных сосудов до проведения оперативного лечения и после радикального оперативного устранения порока с выраженными нарушениями гемодинамики и функций сердечно-сосудистой системы: ХСН IIБ, ФК III, выраженные нарушения сердечного ритма и проводимости - трепетание и мерцание предсердий, частые желудочковые экстрасистолы | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---|----------|
| | | | | | | протезных материалов | |
| 15.2.1.4 | | | | | Нарушение функций сердечно-сосудистой, дыхательной системы, мочевыделительной функции, психических, сенсорных функций; МКФ: В 410 - 429, В 440 - 450, В 610 - 639, В 110 - 199, В 210 - 299 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: пороки сердца и крупных сосудов до проведения оперативного лечения и после радикального оперативного устранения порока со значительно выраженными нарушениями гемодинамики и функций сердечно-сосудистой системы: ХСН III стадии, ФК IV. Наличие осложнений после оперативной коррекции порока и/или наличие отягощающей сопутствующей патологии со значительно выраженными нарушениями функций организма. Возможность проведения только паллиативных операций при сложных сочетанных пороках; | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|---|-----|--|--|--|
| | | | | | | неоперабельные пороки сердца и крупных сосудов | |
| 15.2.2 | | | Врожденные аномалии (пороки развития) крупных артерий | Q25 | | | |
| | | | Врожденные аномалии (пороки развития) крупных вен | Q26 | | | |
| | | | Другие врожденные аномалии (пороки развития) системы периферических сосудов | Q27 | | | |
| | | | Другие врожденные аномалии (пороки развития) системы кровообращения | Q28 | | | |

Примечание к подпункту 15.2.2.

Количественная оценка стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при ангиодисплазиях проводится с учетом вида порока (мальформации капиллярные, артериальные, венозные, артериовенозные, лимфатические и различные их сочетания), локализации и распространенности аномалии (конечности, легкие, головной и спинной мозг, множественные), степени выраженности хронической недостаточности кровообращения в пораженном сегменте(ах) или органе(ах), выраженности трофических изменений кожи, мягких тканей и других изменений в пораженных органах, эффективности проводимого лечения и наличия осложнений, наличия и степени выраженности вторичных деформаций опорно-двигательного аппарата.

В зависимости от этого выделяют состояния: компенсации (увеличение объема и длины конечности без ее деформации и без трофических нарушений, отсутствие нарушений центральной гемодинамики, наличие эффективного коллатерального кровообращения); субкомпенсации (увеличение объема, длины конечности, ее деформация, трофические нарушения кожи без

изъязвления, начальные признаки перегрузки правого желудочка, НК 0 или НК I, коллатеральное кровообращение малоэффективно); декомпенсация (увеличение объема конечности на 5 - 6 см и более, длины конечности на 7 - 8 см и более по сравнению со здоровой конечностью, деформация конечности, трофические нарушения кожи в виде эрозии, трофических язв, НК I или II, отсутствие коллатерального кровотока).

15.2.2.1

Нарушение функций сердечно-сосудистой системы; нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций;
МКФ: В 410 - 429, В 710 - 799

Для детей в возрасте 0 - 17 лет:
локальные или распространенные формы ангиодисплазий в фазе компенсации кровообращения (ХАН 0 или 1 степени, ХВН 0 или 1 степени);
0 - 6 лет: увеличение объема конечности на 1,0 - 1,5 см без ее деформации, увеличение длины конечности на 2,0 - 2,5 см, компенсируемое ортопедической стелькой или коском.
7 - 17 лет: увеличение объема и длины конечности до 4,0 см без ее деформации, компенсируемое ортопедической стелькой или коском.
Начальные признаки вторичных изменений в позвоночнике.
Незначительное

10 - 30

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | ограничение объема движений в суставах конечности(ей) | |
| 15.2.2.2 | | | | Нарушение психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 199, В 410 - 429, В 440 - 450, В 710 - 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: локальные или распространенные формы ангиодисплазий в стадии субкомпенсации кровообращения (ХАН 2 степени, ХВН 2 степени); преимущественная локализация на активных поверхностях конечностей (ладони и стопы); 0 - 6 лет: увеличение объема конечности до 2,0 - 4,0 см, увеличение длины конечности на 3,0 - 4,0 см, компенсируемое сложной ортопедической обувью. 7 - 17 лет: увеличение объема конечности на 5,0 см и более, увеличение длины конечности на 5,0 см и более, компенсируемое | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | сложной ортопедической обувью. Статический сколиоз 2 или 3 степени, умеренное ограничение объема движений в суставах конечности(ей), признаки неврологических осложнений (нейропатии), наличие болевого синдрома. Наличие неврологической симптоматики и умеренные нарушения функций организма при локализации соустий в головном или спинном мозге | |
| 15.2.2.3 | | | | Нарушение психических функций, функций сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: декомпенсация кровообращения в пораженной конечности(ях) со стойким болевым синдромом, с глубокими трофическими нарушениями | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---|----------|
| | | | | | функций; МКФ: В 110 - 199, В 410 - 429, В 440 - 450, В 710 - 799 | (длительно незаживающие язвы) кровотечениями различной интенсивности; с тяжелыми деформациями конечности, локализация соустий на открытых частях тела после лечения, вторичные изменения в суставах и позвоночнике (контрактуры, сколиозы, дегенеративно-дистрофические изменения), неврологические осложнения (тяжелые нейропатии). Выраженные нарушения функций организма при локализации соустий в головном или спинном мозге, сердце и легких и при различных их сочетаниях | |
| 15.2.2.4 | | | | | Нарушение психических функций, функций сердечно-сосудистой | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: декомпенсация кровообращения: | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--------|--|---|--|-----------|--|--|---------|
| | | | | | системы, дыхательной системы, нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 110 - 199, В 410 - 429, В 440 - 450, В 710 - 799 | обширное поражение сосудистой системы, неустранимые тяжелые трофические нарушения, тяжелые осложнения в виде нарушения мозгового кровообращения и кровообращения в спинном мозге с развитием параличей, отсутствием контроля функции тазовых органов | |
| 15.3 | | Врожденные аномалии (пороки развития) органов дыхания | | Q30 - Q34 | | | |
| 15.3.1 | | | | | Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем, психических функций, функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 110 - 199, В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439, В 540 - | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: редкие обострения воспалительных бронхолегочных заболеваний (2 - 3 раза в год, продолжительностью в пределах 3 недель), без дыхательной недостаточности (ДН 0) либо наличие ДН I | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | 559 | степени | |
| 15.3.2 | | | | Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем, психических функций, функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 110 - 199, В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439, В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренные нарушения функции дыхательной системы: обострения воспалительных бронхолегочных заболеваний 4 - 6 раз в год, продолжительностью от 3 до 6 недель; необходимость в многоэтапных оперативных коррекциях, осложнения хирургических вмешательств, наличие ДН II степени, преходящей или постоянной легочной гипертензии (ХСН 0 или ХСН 1 стадии) | 40 - 60 |
| 15.3.3 | | | | Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем, психических функций, функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: выраженные нарушения функции дыхательной системы: обострения воспалительных бронхолегочных заболеваний 4 - 6 раз в | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | | и метаболизма; МКФ: В 110 - 199, В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439, В 540 - 559 | год, продолжительностью от 3 до 8 недель; наличие осложнений (стенозы, свищи дыхательной системы), приводящие к необходимости дальнейших хирургических вмешательств; наличие ДН II, III степени, ХСН II А стадии | |
| 15.3.4 | | | | | Нарушение функций дыхательной, сердечно-сосудистой систем, психических функций, функций системы крови и иммунной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 110 - 199, В 410 - 429, В 440 - 449, В 430 - 439, В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительно выраженные нарушения функции дыхательной системы: обострения воспалительных бронхолегочных заболеваний более 6 раз в год, продолжительностью более 8 недель; последствия и осложнения оперативных вмешательств, наличие ДН III степени в сочетании с ХСН II Б или III стадии | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------|---|--|---------|
| 15.4 | | Расщелина губы и неба | | Q35 - 37 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 15.4.</p> <p>Количественная оценка нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при челюстно-лицевых аномалиях основывается на оценке тяжести и распространенности порока, возможности использования ортеза и адаптации к нему, длительности и эффективности реконструктивного оперативного лечения (восстановление анатомической целостности и взаимоотношений структур артикуляционного аппарата на этапах оперативного лечения и по завершении последнего), на оценке нарушений функции пищеварительной системы (оценка параметров физического развития и их возрастная динамика), на оценке нарушений артикуляционной моторики (степень ограничения ее при сосании, глотании, жевании, выполнении артикуляционных движений), на степени выраженности речевых синдромов при их наличии (ринолалия, ринофония, дислалия), а также на оценке функции других сопряженных органов (сенсорные функции, функции носового дыхания).</p> <p>Степень выраженности речевых синдромов (ринолалия, ринофония, дислалия, синдромы письменной речи) оценивается по заключению логопеда медицинской организации (уровень/степень общего или системного недоразвития речи). Принципы количественной оценки нарушений языковых и речевых функций, указанных в подпункте 5.1.1 настоящей количественной системы оценки.</p> | | | | | | | |
| 15.4.1 | | | Расщелина неба | Q35 | | | |
| | | | Расщелина губы | Q36 | | | |
| | | | Расщелина неба и губы | Q37 | | | |
| 15.4.1.1 | | | | | Нарушения функций пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 510 - 539, В 310 - 399 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: расщелина мягкого неба, мягкого и частично (задняя треть) твердого неба, изолированная расщелина верхней губы; расщелина мягкого и твердого неба при использовании | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | ортеза и адаптации к нему; незначительное нарушение функций сосания, глотания, жевания; параметры физического развития соответствуют возрасту или незначительно снижены. Незначительные нарушения языковых и речевых функций | |
| 15.4.1.2 | | | | Нарушения функций пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 510 - 539, В 310 - 399 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: полная расщелина твердого и мягкого неба, верхней губы (одно- и двусторонняя) на период реконструктивного оперативного лечения; неудовлетворительный результат оперативного лечения (грубые деформации, послеоперационные изъяны твердого неба, выраженный челюстной дисбаланс), требующие повторных оперативных вмешательств и/или длительного | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | аппаратного ортодонтического лечения; умеренное нарушение функций сосания, глотания, жевания; умеренное снижение параметров физического развития. Умеренные нарушения языковых и речевых функций | |
| 15.4.1.3 | | | | Нарушения функций пищеварительной системы, языковых и речевых функций; МКФ: В 510 - 539, В 310 - 399 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: сложные врожденные пороки развития челюстно-лицевой области в сочетании с другими аномалиями развития, с выраженными нарушениями функций организма; нарушение акта жевания с возможностью приема только протертой пищи, выраженное снижение параметров физического развития. Выраженные нарушения языковых и речевых функций | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|--------------|--|--|--|
| 15.5 | | Другие врожденные аномалии (пороки развития) органов пищеварения | | Q38 - Q45 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 15.5. Количественная оценка степени выраженности нарушений функций пищеварительной системы ребенка в возрасте до 18 лет при врожденных аномалиях (пороках развития) желудочно-кишечного тракта зависит от вида и локализации порока, объема и характера оперативного лечения (необходимость наложения стомы, резекции и прочее) объема и видов мероприятий по реабилитации (необходимость бужирования, его частота и эффективность), степени недостаточности анального сфинктера, наличия осложнений (в том числе осложнений оперативного лечения, необходимость повторных реконструктивных операций), рецидива заболевания (рестеноз - компенсированный субкомпенсированный, декомпенсированный), поражения других органов (характер, тяжесть), уровня физического развития ребенка.</p> | | | | | | | |
| 15.5.1 | | | Атрезия пищевода без свища | Q39.0 | | | |
| | | | Атрезия пищевода с трахеально-пищеводным свищом | Q39.1 | | | |
| | | | Врожденный стеноз и стриктура пищевода | Q39.3 | | | |
| | | | Дивертикул пищевода | Q39.6 | | | |
| | | | Другие врожденные аномалии пищевода | Q39.8 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 15.5.1.1 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после проведенного одноэтапного оперативного вмешательства с наложением прямого анастомоза. После завершения всех этапов оперативного лечения при отсутствии затруднений приема пищи или с незначительными нарушениями функций пищеварительной системы. Необходимость планового бужирования (3 и менее раз в год) | 10 - 30 |
| 15.5.1.2 | | | | | Нарушения функций пищеварительной системы, дыхательной системы, эндокринной системы и метаболизма; МКФ: В 510 - 539, В 440 - 449, В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: на весь период этапного хирургического реконструктивного лечения. По завершении всех этапов оперативного лечения при наличии умеренных нарушений функций пищеварительной системы: дисфагия с | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | возможностью приема только протертой и жидкой пищи; необходимость планового бужирования (более 3 раз в год). Наличие осложнений, в том числе осложнений оперативного лечения, с умеренными нарушениями функций организма | |
| 15.5.1.3 | | | | Нарушения функций пищеварительной, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 510 - 539, В 440 - 449, В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после проведения первого этапа оперативного лечения (наложение гастростомы) на весь последующий период лечения, включая восстановление анатомической целостности пищевода и его проходимости; после завершения оперативного лечения (пластики пищевода) при наличии выраженных нарушений функций пищеварительной системы. Наличие | 70 - 80 |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | осложнений, в том числе осложнений оперативного лечения, с выраженными нарушениями функций организма. Рестеноз пищевода. Необходимость повторных оперативных вмешательств |
| 15.5.2 | | | <p>Другие уточненные пороки развития желудка: врожденный кардиоспазм, смещение желудка, дивертикул желудка, желудок в виде песочных часов; удвоение желудка; мегалогастрия; микрогастрия</p> <p>Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз двенадцатиперстной кишки, тощей кишки, подвздошной кишки</p> <p>Врожденное</p> | <p>Q40.2</p> <p>Q41.0 - Q41.2</p> <p>Q41.8</p> | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|--|--|--|---------|
| | | | отсутствие, атрезия и стеноз других уточненных частей тонкого кишечника | | | | |
| 15.5.2.1 | | | | | Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после проведенного оперативного вмешательства в случаях небольшой протяженности участка резекции кишечника при физиологических параметрах физического развития или незначительных нарушениях функции пищеварительной системы | 10 - 30 |
| 15.5.2.2 | | | | | Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после проведенного оперативного вмешательства при наличии осложнений (синдром короткой кишки) с умеренными нарушениями функции пищеварительной системы | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|-------|--|---|---------|
| 15.5.2.3 | | | | | Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после проведенного оперативного вмешательства при наличии осложнений (синдром короткой кишки) с выраженными нарушениями функции пищеварительной системы. Необходимость повторных оперативных вмешательств, наличие стомы | 70 - 80 |
| 15.5.3 | | | Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз прямой кишки со свищем | Q42.0 | | | |
| | | | Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз прямой кишки без свища (заращение прямой кишки) | Q42.1 | | | |
| | | | Врожденное отсутствие, атрезия и стеноз заднего прохода со свищем | Q42.2 | | | |

Примечание к подпункту 15.5.3.

Количественная оценка нарушений функций пищеварительной системы организма при врожденных пороках развития прямой кишки и ануса зависит от тяжести порока объема и характера оперативного лечения (необходимость наложения стомы, функционирование стомы), эффективности мероприятий по реабилитации (нарушение эвакуаторной функции различной степени, объективизированного в условиях стационара), степени недостаточности анального сфинктера (объективизированной в условиях стационара), наличия осложнений (в том числе осложнений оперативного лечения, необходимость повторных реконструктивных операций); от поражения сопряженных органов (характер, тяжесть), уровня физического развития ребенка

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 15.5.3.1 | | | | | Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после проведенного реконструктивного оперативного лечения с восстановлением анатомических структур аноректальной области: I степень недостаточности функции запирающего аппарата прямой кишки; Отсутствие осложнений и показаний к повторному оперативному лечению | 10 - 30 |
| 15.5.3.2 | | | | | Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при сложных пороках - на весь период этапного оперативного лечения и последующей | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|-------|--|---|---------|
| | | | | | | реабилитации. По завершении лечения - при наличии II степени недостаточности функции запирательного аппарата прямой кишки | |
| 15.5.3.3 | | | | | Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: с момента диагностики врожденной клоаки на весь период лечения; после завершения лечения - нарушение контроля функции тазовых органов. По завершении этапов оперативного лечения других пороков - при наличии III степени недостаточности функции запирательного аппарата прямой кишки | 70 - 80 |
| 15.5.4 | | | Болезнь Гиршпрунга (аганглиоз, врожденный (аганглиозный мегаколон) | Q43.1 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 15.5.4.1 | | | | | Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после завершения оперативного лечения - восстановление пассажа по толстой кишке; хронический запор: самостоятельный стул на фоне диеты или эффективного консервативного лечения (объективизированного в условиях стационара); I степень недостаточности анального сфинктера (объективизированная в условиях стационара); отсутствие осложнений | 10 - 30 |
| 15.5.4.2 | | | | | Нарушение функций пищеварительной системы; МКФ: В 510 - 539 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при многоэтапном оперативном лечении (на весь период лечения). После завершения этапного оперативного лечения: отсутствие самостоятельного стула на фоне диетотерапии и консервативного лечения | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | (объективизированное в условиях стационара). II степень недостаточности анального сфинктера (объективизированная в условиях стационара) | |
| 15.5.4.3 | | | | Нарушение функций пищеварительной системы МКФ: В 510 - 539 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после завершения хирургического лечения - отсутствие самостоятельного стула, формирование копролитов, признаки хронической интоксикации и анемии (объективизированные в условиях стационара) III степень недостаточности анального сфинктера. Энкопрез. Необходимость повторных оперативных вмешательств | 70 - 80 |
| 15.6 | | | Врожденные аномалии (пороки развития) желчного пузыря, желчных протоков и печени | Q44 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|-------|---|--|---------|
| | | | Синдром Алажилля | Q44.7 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 15.6. Количественная оценка нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при врожденных пороках внутрипеченочных желчных протоков зависит от вида порока (атрезия, гипоплазия, удвоение, дивертикулы, эктопии протоков) и степени выраженности, варианта течения заболевания (легкое или тяжелое), выраженности симптомов холестаза, механической желтухи, гепатомегалии, симптомов портальной гипертензии, геморрагического синдрома, желудочно-кишечных кровотечений и других синдромов, степени выраженности необратимых морфологических (структурных) изменений в печени (фиброз, цирроз), степени нарушений функций других органов и систем организма эффективности лечения.</p> | | | | | | | |
| 15.6.1 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, психических, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: В 510 - 539, В 410 - 429, В 710 - 799, В 110 - 199, В 210 - 299, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при прогрессирующем течении заболевания с умеренными нарушениями функций организма | 40 - 60 |
| 15.6.2 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, нейромышечных, | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при прогрессирующем течении заболевания с выраженными | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|---|--|----------|
| | | | | | скелетных и нарушениями функций связанных с с организмом движением (статодинамических) функций, психических, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: В 510 - 539, В 410 - 429, В 710 - 799, В 110 - 199, В 210 - 299, В 610 - 639 | | |
| 15.6.3 | | | | | Нарушения функций пищеварительной, сердечно-сосудистой системы, нейромышечных, скелетных и выраженными связанный с с нарушениями движением функциями (статодинамических) функций, психических, сенсорных функций, мочевыделительной функции; МКФ: В 510 - 539, В 410 - 429, В 710 - 799, В 110 - 199, В 210 - 299, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при прогрессивном течении заболевания со значительно выраженными нарушениями функций организма | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|-----------|--|--|---------|
| 15.7 | | Врожденные аномалии и пороки развития мочевой системы | | Q60 - Q64 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 15.7. Клинико-функциональная характеристика и количественная оценка агенезии и других редукционных дефектов почки, кистозной болезни почек, а также врожденных нарушений проходимости почечной лоханки и врожденных аномалий мочеточник, указанных в подпунктах 14.4 и 14.6 настоящей количественной системы оценки.</p> | | | | | | | |
| 15.7.1 | | | Экстрофия мочевого пузыря, частичная или тотальная эписпадия | Q64.1 | | | |
| 15.7.1.1 | | | | | Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: частичная эписпадия - после проведения оперативного лечения при отсутствии или незначительных нарушениях мочевыделительной функции | 10 - 30 |
| 15.7.1.2 | | | | | Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: экстрофия мочевого пузыря (с тотальной эписпадией или без нее) | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--------------------------------------|-----------|--|---|---------|
| | | | | | | после завершения реконструктивного хирургического лечения при умеренных нарушениях мочевыделительной функции | |
| 15.7.1.3 | | | | | Нарушение мочевыделительной функции; МКФ: В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: экстрофия мочевого пузыря (с тотальной эписпадией и без нее) после завершения реконструктивного хирургического лечения с развитием осложнений с выраженными нарушениями мочевыделительной функции | 70 - 80 |
| 15.8 | | Врожденные аномалии (пороки развития) и деформации костно-мышечной системы | | Q65 - Q79 | | | |
| 15.8.1 | | | Врожденный вывих бедра односторонний | Q65.0 | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------|---|--|---------|
| | | | Врожденный вывих бедра двусторонний | Q65.1 | | | |
| | | | Врожденный подвывих бедра односторонний | Q65.3 | | | |
| | | | Врожденный подвывих бедра двусторонний | Q65.4 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 15.8.1 Количественная оценка степени выраженности нарушений статодинамических функций у детей с врожденными аномалиями развития тазобедренного сустава зависит от формы аномалии (врожденный вывих бедра, врожденный подвывих бедра, дисплазия: одно- или двустороннее поражение), степени выраженности морфологических и структурных изменений в суставе (по результатам УЗИ и Rg-исследования), своевременности диагностики, длительности, метода и эффективности лечения, наличия осложнений, возникающих в период лечения (аваскулярный некроз головки бедра), наличия рецидива, состояния компенсаторных механизмов опорно-двигательной системы, наличия и характера сопутствующей патологии.</p> | | | | | | | |
| 15.8.1.1 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Для детей в возрасте 0 - 3 года: и при своевременной диагностике и адекватном лечении: на весь период лечения (при одностороннем вывихе, одно- и двустороннем подвывихе и дисплазии тазобедренных суставов) и при сохранении достигнутого результата (вправление вывиха или подвывиха). | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | | Для детей в возрасте 4 - 17 лет: при эффективном оперативном лечении вывиха бедра (одно- и двухстороннего); полное восстановление опороспособности конечности(ей); при сохранной структуре сустава(ов); отсутствии или незначительном ограничении объема движений в тазобедренном(ых) суставе(ах) | |
| 15.8.1.2 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Для детей в возрасте 0 - 3 года: при наличии осложнений на фоне проводимого лечения, рецидив патологии после начала самостоятельной ходьбы; Для детей в возрасте 4 - 17 лет: при поздней диагностике врожденного вывиха бедра на весь период лечения; наличие осложнений на фоне | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | | проводимого лечения (кроме аваскулярного некроза головки бедренной кости); наличие вторичных изменений в суставах нижних конечностей, позвоночнике (артроз, остеохондроз, спондилоартроз) с умеренным нарушением их функции; рецидив вывиха. Последствия проведенного оперативного лечения с умеренными нарушениями статодинамических функций | |
| 15.8.1.3 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Для детей в возрасте 4 - 17 лет: при наличии осложнений в виде аваскулярного некроза головки бедренной кости на весь период иммобилизации; При двустороннем вывихе бедра после неэффективного лечения (отсутствие | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|-------|--|--|--|
| | | | | | | центрации головок бедренных костей в вертлужных впадинах, формирование неоартрозов) с нарушением опороспособности конечностей | |
| 15.8.2 | | | Конско-варусная косолапость | Q66.0 | | | |
| | | | Пяточно-варусная косолапость | Q66.1 | | | |
| | | | Пяточно-вальгусная косолапость | Q66.4 | | | |
| | | | Врожденная плоская стопа (pes planus). | Q66.5 | | | |
| | | | Другие врожденные деформации стопы | Q66.8 | | | |

Примечание к подпункту 15.8.2.

Количественная оценка степени нарушений функций опорно-двигательной системы при одно- и двусторонней врожденной косолапости (эквино-кава-варусная деформация стопы с изменениями на уровне голеностопного, подтаранного, Шопарова и Лисфранкова суставов) зависит от вида деформации (типичная и атипичная, изолированная или в структуре системных заболеваний), от степени выраженности и тяжести деформации. Также оценивается эффективность лечения, стойкость достигнутого эффекта (наличие или отсутствие рецидива, наличие патологических установок стопы), объем движений в голеностопных суставах, наличие рентгенологических изменений в костях и суставах стопы голеностопных суставах, опороспособность (патологические изменения на подошвенной поверхности стоп(пы) в виде гиперкератоза, натоптышей); сопутствующая патология.

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 15.8.2.1 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Для детей в возрасте 0 - 3 года: косопласть легкой и средней степени (одно- и двухсторонняя) на этапе консервативного лечения. Для детей в возрасте 4 - 17 лет: при условии удовлетворительного результата лечения и при сохранении достигнутого результата по мере роста и развития ребенка | 10 - 30 |
| 15.8.2.2 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: неудовлетворительный результат лечения (рецидив и прогрессирование деформации); нуждаемость в повторных реконструктивных операциях. Врожденная двусторонняя плоско-вальгусная стопа тяжелой степени ("стопа-качалка") | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|-------------|-----|---|--|---------|
| 15.8.3 | | | Синдактилия | Q70 | | | |
| 15.8.3.1 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: неполная простая форма синдактилии II - V пальцев обеих кистей. Полная простая форма синдактилии всех пальцев одной или обеих кистей после завершения реконструктивного оперативного лечения. Другие (сложные) формы синдактилии после завершения реконструктивного оперативного лечения при условии полного восстановления или при незначительном нарушении функции кисти/кистей (схвата и удержания) | 10 - 30 |
| 15.8.3.2 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: полная простая форма синдактилии всех пальцев одной или обеих кистей на весь период | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|---|--|-----|---|---|---------|
| | | | | | МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | реконструктивного оперативного лечения. Другие (сложные) формы синдактилии на весь период реконструктивного оперативного лечения или при нарушениях основных функций кисти (схвата и удержания) | |
| 15.8.3.3 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: другие (сложные) формы синдактилии, в том числе в сочетании с другими пороками развития кисти(ей) с выраженным нарушением функций кисти (схвата и удержания) | 70 - 80 |
| 15.8.4 | | Дефекты, укорачивающие верхнюю конечность | | Q71 | | | |

Примечание к подпункту 15.8.4.

Количественная оценка нарушенных функций при врожденных аномалиях верхних и нижних конечностей зависит от вида порока (фокомелия - отсутствие или значительное недоразвитие проксимальных отделов конечностей, вследствие чего кисти и стопы кажутся прикрепленными непосредственно к туловищу; перомелия - отсутствует конечность, от туловища отходит рудимент пальца; эктромелия - отсутствие одной конечности, двух верхних или всех конечностей; гемимелия - отсутствие дистального

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|---------------------------------|---|---|---------|
| отдела конечности при нормальном развитии проксимального), тяжести и распространенности патологии (изолированный порок развития конечности или порок в структуре наследственного синдрома), возможности протезирования и эффективности его, степени адаптации ребенка к пороку, а при последующем протезировании - к протезу(ам). Также учитывается возраст, в котором выполнено первичное протезирование, а в последующем - репротезирование. | | | | | | | |
| 15.8.4.1 | | | Врожденное полное отсутствие верхней(их) конечности(ей) Врожденное отсутствие плеча и предплечья при наличии кисти Врожденное отсутствие предплечья и кисти | Q71.0 Q71.1 Q71.2 | | | |
| 15.8.4.1.1 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789: В 798, В 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии грубой аномалии развития одной конечности или при отсутствии кисти; при наличии культы предплечья, плеча на границе верхней и средней трети, при сохранной функции локтевого и плечевого суставов | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|-------|--|--|----------|
| 15.8.4.1 .2 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: полное отсутствие одной верхней конечности; короткая культя плеча. Экзартикуляция плечевой кости с резекцией части ключицы и/или лопатки | 70 - 80 |
| 15.8.4.1 .3 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: полное отсутствие обеих верхних конечностей на любом уровне (кистей, предплечий, плеч); полное отсутствие одной и недоразвитие другой верхней конечности с выраженным или значительно выраженным нарушением ее функции | 90 - 100 |
| 15.8.4.2 | | | Врожденное отсутствие кисти и пальца(ев) | Q71.3 | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|---|---------|
| 15.8.4.2 .1 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствие одного пальца (II, III, IV или V) кисти, в том числе с соответствующей пястной костью. Сочетание двух отсутствующих пальцев (исключая I) при сохранных пястных костях. Отсутствие I пальца одной кисти. Отсутствие дистальных фаланг пальцев кисти: I, II, III, IV, V | 10 - 30 |
| 15.8.4.2 .2 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствие всех фаланг I пальца обеих кистей. Отсутствие всех фаланг двух пальцев, включая I палец, вместе с пястными костями на одной кисти. Отсутствие всех фаланг трех пальцев, исключая I палец, вместе с пястными костями на одной кисти. Отсутствие всех фаланг трех любых пальцев, | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|-------|--|--|----------|
| | | | | | | оперативного лечения. Отсутствие трех любых пальцев, включая I палец, на обеих кистях | |
| 15.8.4.2 .4 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствие всех 10 с пальцев | 90 - 100 |
| 15.8.4.3 | | | Продольное укорочение лучевой кости (врожденная косорукость, лучевая косорукость) | Q71.4 | | | |
| | | | Продольное укорочение локтевой кости Локтевая косорукость | Q71.5 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 15.8.4.3. Количественная оценка нарушений функций верхней(их) конечности(ей) при косорукости зависит от варианта косорукости (полное или частичное отсутствие лучевой или локтевой кости на одной или двух конечностях), сохранности кисти, ее положения и функции, степени отклонения кисти в лучевую или локтевую сторону, функции локтевого сустава, а также величины анатомического укорочения сегмента конечности.</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 15.8.4.3 .1 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при одностороннем и двустороннем поражении: лучевая косорукость I степени, I тип кисти; локтевая косорукость I степени; незначительное нарушение функции кисти и суставов верхней конечности | 10 - 30 |
| 15.8.4.3 .2 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при одностороннем и двустороннем поражении: лучевая косорукость II степени, II тип кисти; локтевая косорукость II степени; умеренное нарушение функции кисти и суставов верхней конечности. Сочетание косорукости I степени с нормальной кистью на доминантной конечности и лучевой косорукости II степени со II типом кисти или локтевой косорукостью | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--------------------|---|--|---------|
| | | | | | | II степени на контрлатеральной конечности. Лучевая косорукость III степени, III тип кисти; локтевая косорукость III степени, выраженное нарушение функции кисти и суставов верхней конечности | |
| 15.8.4.3 .3 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: Двусторонняя лучевая косорукость III степени, III тип кисти; локтевая косорукость III степени, выраженное нарушение функции кистей и суставов верхней конечности | 70 - 80 |
| 15.8.4.3 .4 | | | Клешнеобразная кисть Врожденное расщепление стопы | Q71.6 Q72.7 | | | |
| 15.8.4.4 .1 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: Клешнеобразные кисти. Клешнеобразные стопы при отсутствии опороспособности на период ортезирования и | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|--|-------|--|---|---------|
| | | | | | МКФ: В 710 - 78, В 798, В 799 | приобретения навыков стояния и ходьбы | |
| 15.8.4.4.2 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 78, В 798, В 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: сочетание двух клепнеобразных кистей с выраженным нарушением функции схвата и удержания предметов с двумя клепнеобразными стопами с нарушением опороспособности | 70 - 80 |
| 15.8.5 | | Дефекты, укорачивающие нижнюю конечность | | Q72 | | | |
| 15.8.5.1 | | | Врожденное полное отсутствие нижней(их) конечности(ей) | Q72.0 | | | |
| | | | Врожденное отсутствие бедра и голени при наличии стопы (фокомелия) | Q72.1 | | | |
| | | | Врожденное отсутствие голени и стопы | Q72.2 | | | |
| | | | Продольное | Q72.4 | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|---|-------|--|--|---------|
| | | | укорочение бедренной кости | | | | |
| | | | Продольное укорочение большеберцовой кости | Q72.5 | | | |
| | | | Продольное укорочение малоберцовой кости | Q72.6 | | | |
| 15.8.5.1 .1 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Для детей в возрасте 0 - 5 лет: врожденное укорочение любого сегмента и всей нижней конечности в целом до 3 см (по сравнению со здоровой) при отсутствии других аномалий конечности. Дети в возрасте 6 - 17 лет: при анатомическом укорочении до 6 см., функциональном - до 4 см. | 10 - 30 |
| 15.8.5.1 .2 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии аномалии развития одной конечности (отсутствие стопы, культя голени на границе верхней и средней трети при | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------|---|--|
| | | | | | 798, В 799 | <p>сохранной функции коленного и тазобедренного суставов).</p> <p>Протезированная культя бедра одной конечности на границе верхней и средней трети. Отсутствие обеих стоп на уровне костей предплюсны (уровень сустава Шопара).</p> <p>Врожденное укорочение любого сегмента и всей нижней конечности в целом более чем на 3 см в возрасте 0 - 3 года, более чем на 6 см в возрастном периоде 6 - 17 лет (по сравнению со здоровой) при отсутствии других аномалий конечности.</p> <p>Иное сочетание аномалий развития конечностей с умеренным нарушением статодинамических функций</p> | |
|--|--|--|--|--|------------|---|--|

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 15.8.5.1 .3 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: при наличии аномалии развития двух конечностей: отсутствие стоп с костями предплюсны, культи голени на границе верхней и средней трети при сохранной функции коленного и тазобедренного суставов после эффективного протезирования и приобретения навыков стояния и ходьбы на протеза. Культы обеих голени при двустороннем порочном положении культы на период реконструктивного лечения и протезирования Культя бедра одной конечности на границе верхней и средней трети при сохранной функции тазобедренного сустава на период протезирования либо | 70 - 80 |
|----------------|--|--|--|--|--|--|---------|

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|---|----------|
| | | | | | | при наличии медицинских противопоказаний к протезированию. Аномалия развития одной верхней и одной нижней конечности до уровня верхней трети плеча и до границы верхней трети бедра. Аплазия одного из сегментов конечности с нарушением функции смежных суставов на период реконструктивного оперативного лечения и протезирования. Иное сочетание аномалий развития конечностей с выраженным нарушением статодинамических функций | |
| 15.8.5.1 .4 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: культя обеих бедер и голеней на любом уровне на период протезирования и адаптации к протезам. Короткая культя обеих | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|--|-------|---|--|---------|
| | | | | | 798, В 799 | бедер при наличии медицинских противопоказаний к протезированию. Сочетание с другими аномалиями развития конечностей со значительно выраженным нарушением статодинамических функций | |
| 15.8.5.2 | | | Врожденное отсутствие стопы и пальца(ев) стопы | Q72.3 | | | |
| 15.8.5.2.1 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789: В 798, В 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствие всех фаланг пальцев обеих стоп или одной стопы с сохранными плюсневыми костями. Отсутствие пальцев до уровня нижней трети плюсневых костей с одной стороны | 10 - 30 |
| 15.8.5.2.2 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствие пальцев вместе с плюсневыми костями с одной | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|-------|---|--|---------|
| | | | | | (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | стороны у детей раннего возраста на период формирования ходьбы как сложного стереотипа (до возраста 7 лет). Отсутствие пальцев вместе с плюсневыми костями с обеих сторон у детей любого возраста | |
| 15.8.5.3 | | | Другие врожденные аномалии верхней конечности(ей) (врожденный лучелоктевой синостоз) | Q74.0 | | | |
| 15.8.5.3 .1 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: одно- или двустороннее поражение при супинации-пронации в функционально выгодном диапазоне (от 50 - 60° до 150 - 160°) либо анкилоз в среднем положении между пронацией и супинацией (около 90 градусов) | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|---|-------|--|--|---------|
| 15.8.5.3 .2 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789: В 798, В 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: одно- или двустороннее поражение при супинации менее 50 - 60°; либо анкилоз в функционально невыгодном положении | 40 - 60 |
| 15.8.5.4 | | | Другие врожденные аномалии верхней конечности(ей). Деформация Шпренгеля | Q74.0 | | | |
| 15.8.5.4 .1 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: мышечная форма болезни с незначительным нарушением функции плечевого сустава при эффективности консервативного лечения; отсутствие сочетания с другими аномалиями развития конечностей или их наличие с незначительным нарушением функции пораженного сегмента(ов) | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--------|--|---|---------|
| 15.8.5.4 .2 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: после проведенного оперативного лечения с умеренным нарушением функции плечевого сустава в сочетании с другими аномалиями развития конечностей с умеренным нарушением функции пораженного сегмента(ов). После проведенного оперативного лечения с выраженным нарушением функции плечевого сустава. При наличии осложнений оперативного лечения, в том числе с повреждением плечевого сплетения | 40 - 60 |
| 15.8.5.5 | | | Врожденные аномалии позвоночника и костей грудной клетки (врожденный спондилолистез) | Q76.2. | | | |

Примечание к подпункту 15.8.5.5

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при спондилолистезе основывается на степени спондилолистеза, оценке его стабильности, наличии неврологических осложнений, а также нуждаемости в оперативном лечении и оценке его эффективности.

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 15.8.5.5 .1 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: спондилолистез I и II степени, стабильный, без неврологической симптоматики. Отсутствие сочетания со спондилолизом. Спондилолистез III и IV степени после эффективного оперативного лечения с незначительным ограничением подвижности позвоночника | 10 - 30 |
| 15.8.5.5 .2 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 789, В | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: спондилолистез любой степени с наличием неврологических осложнений с умеренными нарушениями функций организма при неэффективности консервативного лечения | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--|--|-------|---|--|---------|
| | | | | | 798, В 799, В 510 - 539, В 610 - 639 | | |
| 15.8.5.5 .3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799, В 510 - 539, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: спондилолистез любой степени с наличием неврологических осложнений с выраженными нарушениями функций организма при неэффективности консервативного лечения | 70 - 80 |
| 15.8.5.6 | | | Другие пороки развития костно-мышечной системы (синдром Поланда) | Q79.8 | | | |
| 15.8.5.6 .1 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: гипоплазия и аплазия большой грудной мышцы, отсутствие деформации или незначительная деформация грудной клетки, отсутствие нарушений или | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|--------------------------------------|-------|---|---|---------|
| | | | | | | незначительные нарушения функции органов грудной клетки | |
| 15.8.5.6.2 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: левосторонняя аплазия большой грудной мышцы, отсутствие ребер слева со значительной деформацией грудной клетки с умеренными нарушениями функции органов грудной клетки. Сочетание с другими аномалиями развития конечности с нарушением функции схвата и удержания предметов | 40 - 60 |
| 15.8.6 | | | Врожденный множественный артрогрипоз | Q74.3 | | | |

Примечание к подпункту 15.8.6.

Количественная оценка нарушенных функций при артрогрипозе определяется степенью деформаций и укорочений верхних и нижних конечностей, выраженностью контрактур крупных суставов, приводящих к нарушению опоры и передвижения, нарушению основных функций кисти. Учитываются другие аномалии развития или метаболические нарушения, симптомы поражения ЦНС.

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---|---------|
| 15.8.6.1 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: дистальная форма артрогрипоза с умеренным нарушением функции схвата и удержания обеих кистей, с умеренным нарушением функции стояния и ходьбы. Генерализованная форма артрогрипоза с наличием умеренных контрактур суставов конечностей | 40 - 60 |
| 15.8.6.2 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: формирование выраженных контрактур крупных суставов верхних и нижних конечностей в функционально невыгодном положении; двусторонняя косолапость, косорукость, полный высокий двусторонний вывих бедра с выраженными нарушениями | 70 - 80 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|---|---|---|----------|
| | | | | | статодинамических функций. Генерализованная форма артрогрипоза с выраженными нарушениями статодинамических функций | |
| 15.8.6.3 | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 789, В 798, В 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: формирование анкилозов в крупных суставах верхних и нижних конечностей в функционально невыгодном положении со значительно выраженными нарушениями статодинамических функций. Генерализованная форма артрогрипоза со значительно выраженными нарушениями статодинамических функций | 90 - 100 |
| 15.8.7 | | | Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и | Q78.0 | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-------|--|--|
| | | | позвоночника | | | |
| | | | Ахондрогенезия | Q77.0 | | |
| | | | Точечная хондродисплазия | Q77.3 | | |
| | | | Ахондроплазия | Q77.4 | | |
| | | | Дистрофическая дисплазия | Q77.5 | | |
| | | | Хондрэктодермаль ная дисплазия | Q77.6 | | |
| | | | Спондилоэпифизарн ая дисплазия | Q77.7 | | |
| | | | Другая остеохондродисплаз ия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночного столба | Q77.8 | | |
| | | | Остеохондродиспла зия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночного столба неуточненная | Q77.9 | | |

Примечание к подпункту 15.8.7

Количественная оценка степени выраженности стойких нарушенных функций организма, обусловленных группой врожденных наследственных заболеваний костно-мышечной системы, сопровождающиеся системным поражением скелета - остеохондродисплазиями, включая формы с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника проводится с учетом:

- множественности\комбинации поражения костно-мышечной системы, включая выраженность черепно-лицевого дисморфизма; наличия стойкого болевого синдрома; нарушение походки; ограничения движений в суставах вследствие контрактур (от умеренной до выраженной степени); степень выраженности укорочения; наличия прогрессирующих деформаций с нарушением функциональности конечности с формированием ее функционально невыгодного положения; быстрота прогрессирования деформаций костной системы, мобильность\фиксированность; наличие неврологических осложнений, сенсорных нарушений; заинтересованности зон роста, риски патологических переломов или их наличие с учетом частоты за календарный год; частота хирургического лечения при прогрессирующем пролиферативном процессе костной ткани.

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|---|---|---------|
| 15.8.7.1 | | | | <p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 710 - 799, В 540 - 559, В 430 - 439</p> | <p>Для детей в возрасте 0 - 17 лет: медленно прогрессирующая деформация костной системы, отставание в росте (SDS роста - 1 - 3); укорочение длины конечности до 30% от длины сегмента у детей раннего возраста, у детей школьного возраста - до 4,0 см; ограничение объема активных движений в суставах конечностей без нарушения функции схвата и удержания предметов незначительной степени с функционально выгодным положением</p> | 10 - 30 |
|----------|--|--|--|---|---|---------|

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | <p>конечности с возможностью коррекции деформации/укорочени я с помощью малосложной ортопедической обуви; незначительное ограничение подвижности без стойкого болевого синдрома, с незначительным нарушением функций конечностей.</p> | |
| 15.8.7.2 | | | | <p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 710 - 799, В 540 - 559, В 430 - 439</p> | <p>Для детей в возрасте 0 - 17 лет: прогрессирующая деформация костной системы, отставание в росте (SDS роста - 4); укорочение длины конечности более 30% (до 50%) от длины сегмента конечности у детей раннего возраста, у детей школьного возраста - на 4,0 - 7,0 см; ограничение объема активных движений в суставах верхних и/или нижних конечностях умеренной степени при</p> | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | | наличии патологической деформации конечности, затрудняющих схват и удержание предметов, опору и передвижение при невозможности коррекции деформации/укорочения с помощью малосложной ортопедической обуви; ограничение подвижности позвоночника с быстрым прогрессированием деформации (более 7 градусов за год), ее мобильность, со стойким болевым синдромом, возможно, с умеренным парезом конечности (3 балла). | |
| 15.8.7.3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной систем и | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: быстро прогрессирующая деформация костной системы, отставание в росте (SDS роста - более 4); укорочение | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---|----------|
| | | | | | метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы; МКФ: В 710 - 799, В 540 - 559, В 430 - 439 | длины конечности более 50% от длины сегмента, у детей школьного возраста укорочение конечности более 7,0 см; ограничение объема активных движений в суставах верхних и/или нижних конечностях выраженной степени, наличие стойких контрактур, затрудняющих схват и удержание предметов, опору и передвижение (при двустороннем поражении), выраженная деформация позвоночника со стойким болевым синдромом. | |
| 15.8.7.4 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: множественные грубые деформации скелета со стойкими выраженными контрактурами в порочном положении конечностей с невозможностью | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|-------|--|--|--|
| | | | | | системы крови и иммунной системы; МКФ: В 710 - 799, В 540 - 559, В 430 - 439 | самостоятельного схвата и удержания предметов, опоры и передвижения. | |
| 15.8.8 | | | Другие остеохондродисплазии | Q78.0 | | | |
| | | | Незавершенный остеогенез | Q78.0 | | | |
| | | | Полиостозная фиброзная дисплазия | Q78.1 | | | |
| | | | Остеопетроз | Q78.2 | | | |
| | | | Прогрессирующая диафизарная дисплазия | Q78.3 | | | |
| | | | Энхондроматоз | Q78.4 | | | |
| | | | Метафизарная дисплазия | Q78.5 | | | |
| | | | Множественные врожденные экзостозы | Q78.6 | | | |
| | | | Другие уточненные остеохондродисплазии | Q78.8 | | | |
| | | | Остеохондродиспла | Q78.9 | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | зия неуточненная | | |
| <p>Примечание к подпункту 15.8.8 Количественная оценка нарушенных функций при незавершенном остеогенезе зависит от частоты и тяжести переломов костей различной локализации, от наличия и степени деформации длинных трубчатых костей и позвоночника; от нарушения функции суставов (нестабильность, наличие контрактур), наличия и степени снижения слуха; от нарушения функции органов брюшной полости при наличии грыж передней брюшной стенки.</p> | | | | | | | |
| 15.8.8.1 | | | | | <p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой системы, пищеварительной, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 799, В 210 - 299, В 410 - 429, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639</p> | <p>Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствие переломов длинных трубчатых костей. Отсутствие деформаций или незначительные (менее 10 градусов) деформации оси конечности или позвоночника, без нарушения или с незначительным нарушением их функций. Отсутствие или незначительное отставание в физическом развитии. Z критерий по данным денситометрии -1,0. Отсутствие или незначительные нарушения функций организма</p> | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|--|---------|
| 15.8.8.2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой системы, пищеварительной, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 799, В 210 - 299, В 410 - 429, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: переломы длинных трубчатых костей. Консолидация перелома(ов) с деформацией оси конечности более 10°, но менее 20°, с укорочением конечности; деформация оси позвоночника (сколиоз или кифоз 2 или 3 ст) с умеренным нарушением их функций. Умеренное отставание в физическом развитии. Z критерий по данным денситометрии - 1,0 - 2,5 Умеренные нарушения функции организма | 40 - 60 |
| 15.8.8.3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: последствия повторных переломов длинных трубчатых костей с выраженными нарушениями статодинамических функций. | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|---|----------|
| | | | | | <p>системы, пищеварительной, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 799, В 210 - 299, В 410 - 429, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639</p> | <p>Выраженная (20° и более) деформация оси конечности, деформация оси позвоночника с выраженным нарушением его функции. Выраженное отставание в физическом развитии. Выраженные нарушения функций организма. Z критерий по данным денситометрии < -2,5 с наличием повторных переломов длинных трубчатых костей</p> | |
| 15.8.8.4 | | | | | <p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой системы, пищеварительной, функций эндокринной систем и метаболизма, нарушение функций</p> | <p>Для детей в возрасте 0 - 17 лет: повторные переломы длинных трубчатых костей при незначительных двигательных и физических нагрузках. Наличие множественных металлических конструкций после проведенных операций. Выраженные деформации</p> | 90 - 100 |

| | | | | | | |
|------|--|--|--|---|---|---|
| | | | | | <p>системы крови и иммунной системы, мочевыделительной функции; МКФ: В 710 - 799, В 210 - 299, В 410 - 429, В 510 - 539, В 540 - 559, В 430 - 439, В 610 - 639</p> | <p>конечностей, требующие оперативного лечения. Значительно выраженные нарушения функции суставов конечностей (нестабильность до степени разболтанности, контрактуры). Значительно выраженная задержка физического развития. Значительно выраженные нарушения функции организма. Z критерий по данным денситометрии < -2,5</p> |
| 15.9 | | <p>Другие врожденные аномалии</p> <p>Хромосомные аномалии, не классифицированные в других рубриках</p> | | <p>Q80 - Q89</p> <p>Q90 - Q99</p> | | |

Примечание к [подпункту 15.9](#).

Количественная оценка нарушенных функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при других врожденных и хромосомных аномалиях, не классифицированных в других рубриках, зависит от характера аномалии, клинико-функциональных проявлений (клинического полиморфизма симптоматики) - нарушение зрения, слуха, опорно-двигательной, сердечно-сосудистой и других

систем, от степени выраженности неврологического дефицита; наличия когнитивного и интеллектуального снижения, судорожных пароксизмов (их вида, частоты, тяжести) и других нарушений, прогрессивности течения заболевания. Учитываются также клинический прогноз, возможность компенсации нарушенных функций организма патогенетическим лечением, наличие осложнений.

| | | | | | | | |
|--------|--|--|---|-----------------------|--|--|--|
| 15.9.1 | | | <p>Факоматозы, не классифицированные в других рубриках (болезнь Реклингхаузена, туберозный склероз, болезнь Бурневилля, эпилепсия; болезнь Пейтца-Егерса, Страджа-Вебера, Гипшеля-Ландау)</p> <p>Другие уточненные синдромы врожденных аномалий (пороков развития), затрагивающих несколько систем (синдром Аперта, синдром Гольденхара; Мебиуса; Робена; синдром Прадера-Вилли; Рассела-Сильвера; синдром Холта-Орама,</p> | <p>Q85</p> <p>Q87</p> | | | |
|--------|--|--|---|-----------------------|--|--|--|

| | |
|---|-----|
| Рубинштейна-Тейби ; Беквита-Видемана; Сотоса, Уивера, Синдром Марфана, синдром Альпорта, Лоренса-Муна-Бидля, Зелвегера и другие синдромы) | |
| Синдром Дауна | Q90 |
| Синдром Эдвардса и синдром Патау | Q91 |
| Другие трисомии и частичные трисомии аутосом, не классифицированные в других рубриках (несбалансированные транслокации и инсерции) | Q92 |
| Моносомии и утраты части аутосом, не классифицированные в других рубриках | Q93 |
| Сбалансированные перестройки и структурные маркеры, не классифицированные | Q95 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|-----|--|--|---------|
| | | | е в других рубриках Другие аномалии хромосом, не классифицированные в других рубриках | Q99 | | | |
| 15.9.1.1 | | | | | Нарушения психических функций, языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 899 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: прогрессивное течение заболевания, компенсируемое патогенетической терапией при наличии незначительных нарушений функций организма, в том числе: 0 - 3 года - незначительная задержка физического, психомоторного, речевого развития, формирования социальных навыков; 4 - 17 лет - незначительное когнитивное снижение, отсутствие снижения или незначительное снижение интеллекта - 4 - 15 лет: IQ = 70 - 79 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 65 - 69 баллов; незначительные | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|---|---------|
| | | | | | нарушения устной и письменной речи | | |
| 15.9.1.2 | | | | | Нарушения психических функций, языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 899 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: прогредиентное течение заболевания, не компенсируемое патогенетической терапией при наличии умеренных нарушений функций организма, в том числе: 0 - 3 года - умеренная задержка физического, психомоторного, речевого развития, формирования социальных навыков; 4 - 17 лет - умеренное когнитивное снижение, умеренное снижение интеллекта - 4 - 15 лет: IQ = 50 - 69 баллов; 16 - 17 лет: IQ = 50 - 64 баллов; умеренные нарушения устной и письменной речи | 40 - 60 |
| 15.9.1.3 | | | | | Нарушения психических функций, языковых и речевых функций, | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: прогредиентное течение заболевания с | 70 - 80 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|---|--|----------|
| | | | | сенсорных, нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 899 | неблагоприятным прогнозом, не компенсируемое с патогенетической терапией при наличии выраженных нарушений функций организма, в том числе: 0 - 3 года - выраженная задержка физического, психомоторного, речевого развития, формирования социальных навыков; 4 - 17 лет - наличие выраженного когнитивного снижения, выраженного снижения интеллекта (IQ = 35 - 49 баллов); выраженные нарушения устной и письменной речи. Нарушение контроля функции тазовых органов | |
| 15.9.1.4 | | | | Нарушения психических функций, языковых и речевых функций, сенсорных, нейромышечных, скелетных и | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: прогрессивное течение заболевания с неблагоприятным прогнозом, не компенсируемое | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|-----------|---|--|--|
| | | | | | связанных с движением (статодинамических) функций, функций пищеварительной, сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем и метаболизма, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 110 - 199, В 210 - 299, В 710 - 799, В 510 - 539, В 410 - 429, В 440 - 450, В 540 - 559, В 610 - 639, В 810 - 899 | с патогенетической терапией при наличии значительно выраженных нарушений функций организма: 0 - 3 года - значительно выраженная задержка физического, психомоторного, речевого развития, отсутствие формирования социальных навыков; 4 - 17 лет - значительно выраженное снижение интеллекта (IQ < 34 баллов); отсутствие устной и письменной речи. Отсутствие контроля функции тазовых органов | |
| 16 | Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (класс XIX), а также | | | S00 - T98 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------------|---|---|---------|
| | отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде (Болезни класса XVI) | | | | | | |
| 16.1 | | Термические и химические ожоги глаза и других внутренних органов | | T26 - T28 | | | |
| 16.1.1 | | Термический ожог пищевода Химический ожог пищевода | | T28.1 T28.6 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 16.1.1. При определении количественной оценки степени выраженности нарушений функций при ожогах пищевода необходимо учитывать вид ожога (термический, химический: кислотой, щелочью - более тяжелые), степень ожога, распространенность ожога, длительность и эффективность бужирования и его результаты (степень рубцового сужения пищевода), необходимость оперативного лечения, объем его, исход, наличие осложнений.</p> | | | | | | | |
| 16.1.1.1 | | | | | Нарушения функции пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: последствия ожога пищевода с рубцовым сужением пищевода I или II степени после проведенного лечения с | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|---|---|---------|
| | | | | | затруднением прохождения только твердой пищи, без потери массы тела | |
| 16.1.1.2 | | | | Нарушения функции пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: последствия ожога пищевода с рубцовым сужением пищевода III степени (субкомпенсация) с необходимостью планового бужирования. Наличие искусственного пищевода с умеренным нарушением функций пищеварительной системы | 40 - 60 |
| 16.1.1.3 | | | | Нарушения функции пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, дыхательной системы; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 440 - 449 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: последствия ожога пищевода с рубцовым сужением пищевода III степени и выше (декомпенсация) с нарушением приема пищи (зондовое питание, наличие гастростомы и питание через нее); наличие | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---|-------|--|--|----------|
| | | | | | | осложнений (свищи) с выраженными нарушениями функций организма | |
| 16.1.1.4 | | | | | Нарушения функции пищеварительной, эндокринной систем и метаболизма, дыхательной системы; МКФ: В 510 - 539, В 540 - 559, В 440 - 449 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: декомпенсация пищеварения (кахексия); неустранимые тяжелые последствия болезни; неэффективность многоэтапных реконструктивно-восстановительных хирургических вмешательств | 90 - 100 |
| 16.1.2 | | Последствия термических и химических ожогов и отморожений | | T95 | | | |
| 16.1.2.1 | | | Последствия термического и химического ожога и отморожения головы и шеи | T95.0 | | | |
| | | | Последствия термического и химического ожога и отморожения | T95.1 | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------|--|---|---------|
| | | | туловища | | | | |
| | | | Последствия термического и химического ожога и отморожения верхней конечности | T95.2 | | | |
| | | | Последствия термического и химического ожога и отморожения нижней конечности | T95.3 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 16.1.2.1. При определении количественной оценки степени выраженности нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при термических травмах любой локализации необходимо учитывать степень, площадь и локализацию ожога (отморожения); поражение других органов - верхних дыхательных путей, глаз; вид и объем лечения (консервативное, реконструктивное хирургическое, косметические операции) и его эффективность (приживление трансплантатов, площадь восстановленного кожного покрова), качество образовавшихся рубцов (поверхностные, глубокие, плоские, келлоидные, их растяжимость или ригидность), формирование контрактур суставов, кисти и их степень, наличие косметического дефекта, показания для реконструктивно-пластических операций. Степени нарушения функций организма подробно изложены в соответствующих разделах.</p> | | | | | | | |
| 16.1.2.1.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций, сердечно-сосудистой, дыхательной, | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: последствия термических поражений III степени на ограниченных участках туловища и конечностей с вовлечением одного-двух смежных суставов ("стягивающие | 10 - 30 |

| | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 799, В 210 - 299, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639, В 810 - 899 | рубцы") и формированием умеренной контрактуры в функционально выгодном положении | |
| 16.1.2.1.2 | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 799, В 210 - 299, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639, В 810 - 899 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: последствия термических поражений III степени с вовлечением одного-двух смежных суставов ("стягивающие рубцы") и формированием выраженной контрактуры в функционально невыгодном положении. Наличие осложнений с умеренными нарушениями функций организма | 40 - 60 |

| | | | | | | |
|----------------|--|--|--|--|---|----------|
| 16.1.2.1 .3 | | | | <p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 799, В 210 - 299, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639, В 810 - 899</p> | <p>Для детей в возрасте 0 - 17 лет: последствия термических поражений III степени с вовлечением 2 и более суставов ("стягивающие рубцы") и формированием резко выраженных контрактур и/или анкилозов в функционально невыгодном положении. Наличие осложнений с выраженными нарушениями функций организма</p> | 70 - 80 |
| 16.1.2.1 .4 | | | | <p>Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения сенсорных функций, функций сердечно-сосудистой, дыхательной,</p> | <p>Для детей в возрасте 0 - 17 лет: последствия распространенных термических поражений III степени и виде множественных порочных установок крупных суставов и ригидных деформаций скелета.</p> | 90 - 100 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---|--------------------|---|--|---------|
| | | | | | пищеварительной систем, мочевыделительной функции, функции кожи и связанных с ней систем; МКФ: В 710 - 799, В 210 - 299, В 410 - 429, В 440 - 450, В 510 - 539, В 610 - 639, В 810 - 899 | Наличие осложнений со значительно выраженными нарушениями функций организма | |
| 16.2 | | Последствия травм головы | | T90 | | | |
| 16.2.1 | | | Последствия открытого ранения головы Последствия перелома черепа и костей лица | T90.1 T90.2 | | | |
| 16.2.1.1 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: дефект костей черепа размером 3 x 3 см и менее с пластикой и без нее | 10 - 30 |
| 16.2.1.2 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: дефект костей черепа | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|----------------------------------|--|-----|---|---|---------|
| | | | | | связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799 | с размером более 3 x 3 см при наличии пульсации ТМО в области дефекта | |
| 16.2.1.3 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: значительный дефект костей черепа размером 10 x 10 см и более | 70 - 80 |
| 16.3 | | Последствия травм шеи и туловища | | T91 | | | |
| 16.3.1 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения мочевыделительной функции, функций пищеварительной системы; МКФ: В 710 - 799, В 610 - 639, В 510 - 539 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: последствия неосложненных переломов позвоночника с незначительным или умеренным ограничением объема движений позвоночника, без неврологической симптоматики. Наличие стабильной металлоконструкции | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|---------|
| | | | | | | небольшой протяженности (в пределах одного отдела позвоночника) | |
| 16.3.2 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения мочевыделительной функции, функций пищеварительной системы; МКФ: В 710 - 799, В 610 - 639, В 510 - 539 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: последствия осложненных переломов позвоночника с наличием неврологической симптоматики, достигающей умеренной степени. Нестабильность металлоконструкции любой протяженности после проведенного оперативного лечения | 40 - 60 |
| 16.3.3 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций, нарушения мочевыделительной функции, функций пищеварительной системы; МКФ: В 710 - 799, В | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: последствия осложненных переломов позвоночника с выраженной неврологической симптоматикой | 70 - 80 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------|---|---|----------|
| | | | | | 610 - 639, В 510 - 539 | | |
| 16.3.4 | | | | | Нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; нарушения мочевыделительной функции, функций пищеварительной системы; МКФ: В 710 - 799, В 610 - 639, В 510 - 539 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: последствия осложненных переломов позвоночника с полным анатомическим прерыванием спинного мозга, со значительно выраженной неврологической симптоматикой, нарушением функции тазовых органов | 90 - 100 |
| 16.4 | | Родовая травма периферическо й нервной системы | | P14 | | | |
| <p>Примечание к подпункту 16.4. При определении количественной оценки степени выраженности нарушений функций организма ребенка в возрасте до 18 лет при родовых травмах периферической нервной системы необходимо учитывать вид пареза (Эрба-Дюшена - проксимальный паралич верхней конечности, Дежерин-Клюмпке - дистальный парез верхней конечности, тотальный парез), степень двигательных нарушений (преимущественно при параличе Эрба-Дюшена); наличие патологической установки; степень нарушения функции кисти (схват и удержание предметов)</p> | | | | | | | |
| 16.4.1 | | | Паралич Эрба-Дюшена при родовой травме | P14.1 | | | |
| | | | Паралич | P14.2 | | | |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|------------------------------------|--|---|---|---------|
| | | | Дежерин-Клюмпке при родовой травме | | | | |
| 16.4.1.1 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствие патологических установок конечности, незначительное ограничение движений в плечевом и в локтевом суставах, вследствие контрактуры или пареза (снижение силы мышц до 4 баллов), сохранной основной функции кисти | 10 - 30 |
| 16.4.1.2 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: умеренный вялый парез доминантной конечности (снижение силы мышц до 2 баллов в проксимальном, до 3 баллов в дистальном отделах), с ограничением объема активных движений, укорочением конечности (более 7 см) с нарушением схвата и удержания предметов | 40 - 60 |

| | | | | | | | |
|----------|--|--|---|---|---|--|---------|
| 16.4.1.3 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствие движений в любой верхней конечности (плегия) с полным отсутствием функции конечности | 70 - 80 |
| 16.5 | | | Травмы, захватывающие несколько областей тела. Последствия травм верхней конечности Последствия травм нижней конечности Последствия травм, захватывающие несколько областей тела | T00 - T07 T92 T93 T94 | | | |
| 16.5.1 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствие одного или двух пальцев (любых, включая I) на одной кисти. Отсутствие I пальца одной кисти на любом уровне; в том числе с пястной костью. | 10 - 30 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | <p>Функциональное укорочение верхней конечности до 7 см (по сравнению со здоровой) вследствие различных причин, без нарушения функции крупных суставов конечностей, без нарушения функции кисти (схвата и удержания).</p> <p>Функциональное укорочение любого сегмента или всей нижней конечности в целом до 3 см (по сравнению со здоровой) в результате неправильно сросшихся переломов.</p> <p>Незначительные (менее 10°) деформации оси конечности в результате неправильно сросшегося перелома длинных трубчатых костей без нарушения или с незначительным нарушением их функций.</p> <p>Отсутствие одного или двух пальцев (любых) одной стопы или обеих стоп на любом уровне.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | <p>Отсутствие пальцев обеих стоп или одной стопы с сохранными плюсневыми костями.</p> <p>Отсутствие всех пальцев до уровня нижней трети плюсневых костей с одной стороны.</p> <p>Анкилоз одного сустава в функционально выгодном положении.</p> <p>Эндопротез одного тазобедренного или одного коленного сустава (при правильном его положении и стабильности всех компонентов).</p> <p>Последствия изолированных переломов костей таза без нарушения целостности тазового кольца.</p> <p>Любые иные последствия травм конечностей в различном их сочетании с незначительными нарушениями статодинамических функций организма</p> | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|---|--|---------|
| 16.5.2 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: Отсутствие I пальца на обеих кистях Отсутствие двух пальцев, включая I палец, вместе с пястными костями. Отсутствие трех пальцев, исключая I палец, вместе с пястными костями. Отсутствие трех любых пальцев, включая I палец, при наличии пястных костей на одной кисти. Отсутствие всех четырёх пальцев на любом уровне на одной кисти при сохраненных пястных костях и наличии анатомически и функционально полноценного I пальца. Отсутствие сегмента(ов) верхней конечности (кисти, предплечья на границе верхней и средней трети) при сохранной функции локтевого и плечевого суставов. Отсутствие | 40 - 60 |
|--------|--|--|--|--|---|--|---------|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | <p>сегмента(ов) нижней конечности (стопы, голени на границе верхней и средней трети) при сохранной функции коленного и тазобедренного суставов.</p> <p>Отсутствие стопы на уровне костей предплюсны с обеих сторон у детей любого возраста.</p> <p>Отсутствие стопы на уровне костей предплюсны или на уровне нижней трети плюсневых костей с одной стороны у детей раннего возраста на период формирования ходьбы как сложного стереотипа.</p> <p>Протезированная культя бедра одной конечности при сохранной функции тазобедренного сустава (при хорошей адаптации к протезу и приобретении навыков ходьбы на нем) с уровнем двигательной активности 2 или выше.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | | <p>Укорочение нижней конечности в целом на 4 см и более (по сравнению со здоровой) или деформация оси конечности более 10°, но менее 20° с умеренным нарушением их функций в результате неправильно сросшихся переломов.</p> <p>Анкилоз одного сустава в функционально невыгодном положении.</p> <p>Эндопротез двух тазобедренных или двух коленных суставов, эндопротез тазобедренного сустава на одной конечности и эндопротез коленного сустава на другой конечности (при правильном их положении и стабильности всех компонентов).</p> <p>Последствия переломов костей таза с нарушением целостности тазового кольца и повреждением</p> | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|---|--|---------|
| | | | | | | крестцово-подвздошног о сочленения с неврологическими осложнениями (с умеренным парапарезом, монопарезом, выраженным в проксимальных, умеренным в дистальных отделах нижней конечности); Любые иные последствия травм конечностей в различном их сочетании с умеренным нарушением статодинамических функций организма | |
| 16.5.3 | | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: Отсутствие двух пальцев, включая I палец, вместе с пястными костями на обеих кистях. Отсутствие трех пальцев, исключая I палец, вместе с пястными костями на обеих кистях. Отсутствие четырех | 70 - 80 |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|---|--|----------|
| | | | | | нарушением статодинамических функций организма | |
| 16.5.4 | | | | Нарушение нейромышечных, скелетных и связанных с движением (статодинамических) функций; МКФ: В 710 - 799 | Для детей в возрасте 0 - 17 лет: отсутствие трех пальцев с пястными костями, включая I палец, на обеих кистях. Отсутствие всех пальцев на обеих кистях. Отсутствие обеих верхних конечностей на любом уровне (обеих кистей, предплечий, обоих плеч); Отсутствие обеих голеней при двустороннем функционально невыгодном положении культи на период реконструктивного оперативного лечения и протезирования. Культы обеих бедер на любом уровне на период протезирования и адаптации к протезам. Короткая культя обеих бедер при наличии медицинских | 90 - 100 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | противопоказаний к протезированию. Отсутствие трех конечностей на любом уровне в различных сочетаниях. Любые иные последствия травм конечностей в различном их сочетании со значительно выраженным нарушением статодинамических функций организма |
|--|--|--|--|--|--|---|